

## Listado sistemático, sinonímico y biogeográfico de los ácaros oribátidos (Acari: Oribatida) mediterráneos

### Systematic, synonymic and biogeographical checklist of the mediterranean oribatid mites (Acari: Oribatida)

Luis S. Subías<sup>1</sup> y Umukusum Ya. Shtanchaeva

1. Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. Universidad Complutense. Madrid 28040. España. subias@bio.ucm.es 2. Instituto de Recursos Biológicos del Cáucaso. Centro Científico de Daguestán. Academia de Ciencias de Rusia. Mahachkala 376000. Rusia. umukusum@mail.ru

Recibido: 13-septiembre-2011. Aceptado: 13-diciembre-2011. Publicado en formato electrónico: 23-enero-2012

**PALABRAS CLAVE:** Ácaros oribátidos, Listado sistemático, Biodiversidad, Taxonomía, Biogeografía, Nuevas citas, Nuevas sinonimias, Región mediterránea  
**KEY WORDS:** Oribatid mites, Systematic checklist, Biodiversity, Taxonomy, Biogeography, New records, New synonyms, Mediterranean region

#### RESUMEN

Se elabora un listado sistemático, sinonímico y biogeográfico en el que se recopilan todas las especies y subespecies de oribátidos conocidas actualmente en la Región Mediterránea, 1937 en total, destacándose la gran riqueza de esta fauna en comparación con la conocida en otras regiones biogeográficas. Se aportan cuatro nuevas citas para dicha región, dos de ellas, *Microzetes asiaticus* (Krivolutsky, 1975) y *Eremella pulchella* (Balogh, 1959) (también el género *Eremella* Berlese, 1913 es citado por primera vez), procedentes de España, otra de Marruecos, *Microzetes simplisetus* (Mahunka, 1998), y la cuarta, *Montizetes rarisetosus* Bayartogtokh, 1998, del Cáucaso, ampliándose notablemente la distribución de *Eupelops halophilus* Pérez-Iñigo, 1969 y de *Eupelops somalicus* (Berlese, 1916) también citadas por primera vez para el Cáucaso. Se aportan nuevas sinonimias de *Oribatula* (*Zygoribatula*) *lanceolata* (Grobler, Bayram y Cobanoglu, 2004) y de *Hemileius* (*Simkinia*) *ovalis* Kulijev, 1968.

#### ABSTRACT

A systematic, synonymic and biogeographical check-list of oribatid mites known in the Mediterranean Region is made. Comparing this fauna with that of the other biogeographical regions, its results highly rich, because include 1937 species and subspecies. Four new records for that region, two from Spain, *Microzetes asiaticus* (Krivolutsky, 1975) and *Eremella pulchella* (Balogh, 1959) (also the genus *Eremella* Berlese, 1913 is new record), other from Morocco, *Microzetes simplisetus* (Mahunka, 1998), and the fourth, *Montizetes rarisetosus* Bayartogtokh, 1998, from the Caucasus, are made. The distribution of *Eupelops halophilus* Pérez-Iñigo, 1969 and *Eupelops somalicus* (Berlese, 1916), also recorded for the first time for the Caucasus, is remarkably widered. New synonyms of *Oribatula* (*Zygoribatula*) *lanceolata* (Grobler, Bayram y Cobanoglu, 2004) and *Hemileius* (*Simkinia*) *ovalis* Kulijev, 1968 are

established.

#### 1. INTRODUCCIÓN

Como ponen de manifiesto SUBÍAS & SHTANCHAEVA (2011a), "los ácaros oribátidos constituyen el grupo más cosmopolita e importante de artrópodos de la fauna del suelo, tanto por su abundancia como por su diversidad en cualquier

ecosistema y, por lo tanto, de gran interés desde el punto de vista de estudios sobre la biodiversidad y su utilización como bioindicadores de impacto ambiental, degradación y contaminación humana, fertilidad de suelos, etc. Se trata de un grupo de animales muy antiguo, ya que se conocen fósiles suyos desde el Devónico (NORTON *et al.*, 1988), que no han abandonado el medio edáfico

en el que se originaron, de lenta evolución y amplias distribuciones geográficas. Todavía su conocimiento deja mucho que desear en extensas regiones de la Tierra, en parte porque sus hábitos de vida saprófagos no implican un interés económico directo sobre la economía humana, y en parte porque sus pequeñas dimensiones no los hacen atractivos al entomólogo aficionado y requieren unos métodos muy particulares de recolección, manipulación y estudio. Como consecuencia de esto hay una notable escasez de claves de identificación y catálogos faunísticos de muchas regiones, y se hace imprescindible su elaboración si queremos que progrese su conocimiento y se facilite el acceso a su estudio para nuevos investigadores, a pesar de lo cual son centenares las nuevas especies de oribátidos, y taxones de nivel superior, los que se describen todos los años. En esta línea se inscribe la reciente publicación del listado mundial de oribátidos (SUBÍAS, 2004)", que anualmente se actualiza en Internet (SUBÍAS, 2011).

Actualmente se conocen alrededor de 10000 especies y subespecies de Oribatidos (SUBÍAS, 2011), siendo la Región Mediterránea de las más diversas del mundo ya que se han recopilado 1937 especies y subespecies, motivo por el cual se hacía imprescindible la elaboración del presente Listado como ayuda y orientación para todos los oribatólogos que quieran trabajar sobre dicha Fauna.

## 2. MATERIAL Y MÉTODO

El presente listado está organizado sistemáticamente, siguiendo el modelo de SUBÍAS (2004), recogiendo a continuación de cada especie, si fuera necesario, el nombre genérico en el que fue descrita originalmente, así como sus sinonimias primarias y distribución reconocidos actualmente. En los taxones supraespecíficos de nivel familia y género se da también la distribución conocida actualmente. La delimitación de la zona de estudio, región Mediterránea, se ha realizado de una forma pragmática ya que se ha procurado que incluya países completos, para facilitar la elaboración del Listado, salvo alguna excepción, como es el caso de la inclusión sólo del Sureste de Francia y de Crimea en el caso de Ucrania, así como la del Sur de la Rusia europea (repúblicas y distritos autónomos caucásicos) en el caso de Rusia. Se incluye la región Macaronésica, toda la Península Ibérica e Italiana, Los Balcanes (no se incluye Rumanía), Bulgaria, Turquía, Cáucaso, Oriente Próximo, incluidos Iraq y Arabia Saudita, Egipto y los países de Norte de África.

Se han tomado como base de la elaboración del presente Listado de Oribatidos, el mundial de SUBÍAS (2004, 2011), el reciente iberocaucásico de SUBÍAS y SHTANCHAEVA (2011), el listado del Mediterráneo Occidental de SUBÍAS y GIL-MARTÍN (1997), el catálogo del Cáucaso de SHTANCHAEVA y

SUBÍAS (2010a), el listado de Azores de BORGES *et al.* (2005) y el de Canarias de BÁEZ *et al.* (2004), el listado de Italia de BERNINI *et al.* (1995) y los de Egipto, de ABDEL-HAMID *et al.* (1980), Arabia Saudita, de BAYOUMI Y AL-KHALIFA (1985), e Israel, de VASILIU & IVAN (1995), además de los catálogos de Grecia (FLOGAITIS, 1992) y la antigua Yugoslavia (TARMAN, 1983) así como la fauna de oribátidos búlgaros de KUNST (1958a, 1958b, 1959 y 1961), completándose con otras publicaciones parciales de las que las más significativas se relacionan en la Bibliografía. También se han aportado cuatro nuevas citas de oribátidos para la región Mediterránea, tres de las cuales proceden de la colección de oribátidos depositados en Cátedra de Artrópodos de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid (UCME)

## 3. RESULTADOS

El presente listado recoge un total de 1.936 especies y subespecies de las que cuatro son nuevas citas para la región Mediterránea (marcadas con un \*), *Microzetes asiaticus* (Krivolutsky, 1975), *Microzetes simplisetus* (Mahunka, 1998), *Eremella pulchella* (Balogh, 1959) (también el género *Eremella* Berlese, 1913 es citado por primera vez para esta región) y *Montizetes rarisetosus* Bayartogtokh, 1998. *M. asiaticus* es una especie conocida del Asia centrooccidental y de Ucrania (SUBÍAS, 2004) y la nueva cita procede de España, de la localidad de Pont de Suert en los Pirineos de Lérida, y se trata de una muestra de hojarasca de avellano y boj cerca de un arroyo recolectada por R. Outerelo (7 de agosto de 1977). *M. simplisetus* fue descrita por Mahunka (1998) de Uganda y la nueva cita para la región Mediterránea procede de una muestra recolectada por J. Zaballos en Marruecos, en un cardonal en una ladera cultivada de MEKNÈS-SIDI-KACEM (20 de febrero de 1999). *E. pulchella* es una especie conocida de Europa central (SUBÍAS, 2004) y la nueva cita procede de España, de una muestra de musgo sobre troncos de quejigo y chaparro recolectada por L. S. Subías el 30 de noviembre de 1983 en Torre del Vinagre (Jaén). Por último, Djaparidze (1986) cita del Cáucaso, de Georgia, a *Amazoppia tricuspida* Balogh y Mahunka 1969, especie Neotropical (SUBÍAS, 2004), pero la descripción que da se corresponde con *M. rarisetosus*, especie descrita por Bayartogtokh (1998) de Mongolia. Además se amplía notablemente la distribución de dos especies, *Eupelops halophilus* Pérez-Íñigo, 1969 y *Eupelops somalicus* (Berlese, 1916), ambas citadas del Cáucaso (SHTANCHAEVA y SUBÍAS, 2010a), la primera como *Eupelops* sp. 1 y sp. 2, y la segunda como *Eupelops sulcatus* (Oudemans, 1914) de Lagonaki (Adigüeya).

Por otra parte, se considera que la especie descrita de Grecia por MAHUNKA y MAHUNKA-PAPP (2010), *Zygoribatula longa* Mahunka y Mahunka-Papp, 2010, es coespecífica con *Oribatula*

(*Zygoribatula lanceolata* (Grobler, Bayram y Cobanoglu, 2004), especie descrita de Turquía y que también presenta grandes similitudes con la especie del Mediterránea oriental *Oribatula (Zygoribatula) longisensilla* Djaparidze, 1985. También se considera que las especies descritas como *Turcibates parvus* Ayyildiz y Luxton, 1989, descrita de Turquía, *Hemileius lanceolatus* Bayartogtokh y Aoki, 1997, descrita de Mongolia, y *Urubambates xerophilus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2007, descrita de Hungría, presentan grandes similitudes y se podrían corresponder con la especie del Cáucaso *Hemileius (Simkinia) ovalis* Kulijev, 1968, siendo también posible su sinonimia con *Dometorina rossica* Bashkirova, 1958, *species inquirenda*. Otra consideración que conviene hacer es que, según MAHUNKA Y MAHUNKA-PAPP (2007), las especies *Oppia hungarica* Bayoumi, 1979 y *Microppia minus longisetosa* Subías y Rodríguez, 1998 son sinónimos, pero eso es prácticamente imposible ya que según la descripción de Bayoumi (1999) se trata claramente de una *Berniniella* Balogh, 1983, y lo que ha debido de ocurrir es una equivocación al guardar o etiquetar el vial.

A continuación se da el listado sistemático, sinonímico y biogeográfico que incluye todas las especies de ácaros oribátidos citados en la Región Mediterránea.

### 3.1. Listado taxonómico

Los diferentes rangos taxones están representados por los siguientes símbolos:

- : Suborden;
- ▲ : Superfamilia;
- ◆ : Familia;
- ♣ : Género;
- : Especie
- \*: Citas nuevas, Mediterráneo

Orden **ORIBATIDA** Dugès, 1834

- Suborden PALAEOSOMATA Grandjean, 1969

▲ **Acaronychoidea** Grandjean, 1932

- ◆ **Acaronychidae** Grandjean, 1932  
Distribución: Cosmopolita (excepto Oriental).

♣ **Acaronychus** Grandjean, 1932  
Especie tipo: *Acaronychus traegardhi* Grandjean, 1932

Distribución: Neotropical, Oriental y subtropical (Holártica meridional).

- *Acaronychus grandjeani* Lange, 1975  
Distribución: Cáucaso.
- *Acaronychus traegardhi* Grandjean, 1932  
Distribución: Holártica meridional (Mediterránea occidental, Paleártica oriental meridional y U.S.A. meridional), China

suroriental e I. Galápagos.

♣ **Zachvatkinella** Lange, 1954  
(=*Himalacarus* Sheals, 1965)  
Especie tipo: *Zachvatkinella belbiformis* Lange, 1954

Distribución: Holártica.

- *Zachvatkinella caucasica* Lange, 1972  
Distribución: Cáucaso.

▲ **Palaeacaroida** Grandjean, 1932

◆ **Palaeacaridae** Grandjean, 1932

Distribución: Holártica.

♣ **Palaeacarus** Trägårdh, 1932  
(=*Traegardhacarus* Zachvatkin, 1945)

Especie tipo: *Palaeacarus hystricinus*

Trägårdh, 1932

Distribución: Holártica y Oriental.

- *Palaeacarus caucasicus* Lange, 1972  
Distribución: Paleártica (Cáucaso e Islas del Este de Rusia asiática).

• *Palaeacarus hystricinus* Trägårdh, 1932  
(=*Palaeacarus appalachicus* Jacot, 1938)

Distribución: Holártica (menos frecuente en el Sur) y China suroriental.

- *Palaeacarus kamenskii* (Zachvatkin, 1945)  
(=*Traegardhacarus*)  
(=*Palaeacarus hystricinus vaesterbottensis* Grandjean, 1954)

Distribución: Paleártica: Paleártica occidental (Norte de Europa y Ucrania: Crimea) y Paleártica oriental.

◆ **Ctenacaridae** Grandjean, 1954

Distribución: Pantropical y subtropical.

♣ **Beklemishevia** Zachvatkin, 1945  
Especie tipo: *Beklemishevia galeodula* Zachvatkin, 1945

Distribución: Tropical (Etiópica y Neotropical) y Holártica meridional.

- *Beklemishevia galeodula* Zachvatkin, 1945  
Distribución: Holártica meridional (Mediterránea oriental, Asia centrooccidental y U.S.A.: California).

• *Beklemishevia hispaniola* Pérez-Íñigo, 1997  
Distribución: Mediterránea occidental.

♣ **Ctenacarus** Grandjean, 1939  
(=*Grandjeanacarus* Zachvatkin, 1945)

Especie tipo: *Palaeacarus araneola*

Grandjean, 1932

Distribución: Pantropical y subtropical.

- *Ctenacarus araneola* (Grandjean, 1932)  
(=*Palaeacarus*)

Distribución: Pantropical y subtropical.

♣ **Gilarovella** Lange, 1974

Especie tipo: *Gilarovella demetrii* Lange, 1974

Distribución: Holártica.

- *Gilarovella demetrii* Lange, 1974  
Distribución: Holártica meridional (Mediterránea, Asia centrooccidental y U.S.A.: Nuevo México).
- ♣ *Neoctenacarus* Moritz, 1974  
Especie tipo: *Neoctenacarus hastilis* Moritz, 1974  
Distribución: Paleártica.
- *Neoctenacarus hastilis* Moritz, 1974  
Distribución: Europa centromeridional.
- ♦ **Aphelacaridae** Grandjean, 1954  
Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).
- ♣ *Adelphacarus* Grandjean, 1952  
Especie tipo: *Adelphacarus sellnicki* Grandjean, 1952  
Distribución: Paleártica y Neotropical.
- *Adelphacarus sellnicki* Grandjean, 1952  
Distribución: Europea y Brasil.
- ♣ *Aphelacarus* Grandjean, 1932  
Especie tipo: *Parhypochthonius acarinus* Berlese, 1910  
Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).
- *Aphelacarus acarinus* (Berlese, 1910) (*Parhypochthonius*)
- *Aphelacarus acarinus acarinus* (Berlese, 1910) (= *Aphelacarus rossicus* Zachvatkin, 1945)  
Distribución: Semicosmopolita (Holártica: menos frecuente en el Norte, Etiópica y Neotropical).
- *Aphelacarus acarinus sahariensis* Gil-Martín, Subías y Arillo, 1992  
Distribución: Sahara occidental.
- Suborden PARHYPOSOMATA Balogh y Mahunka, 1979
- ▲ **Parhypochthonioidea** Grandjean, 1932
- ♦ **Parhypochthoniidae** Grandjean, 1932  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- ♣ *Parhypochthonius* Berlese, 1904  
Especie tipo: *Parhypochthonius aphidinus* Berlese, 1904  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Parhypochthonius aphidinus* Berlese, 1904 (= *Parhypochthonius aphidinus germanicus* Willmann, 1931) (= *Parhypochthonius aphidinus octofilamentis* Jacot, 1938)  
Distribución: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Australiana e I. Galápagos).
- *Parhypochthonius pilosus* Mahunka, 1991  
Distribución: Macaronésica (Cabo Verde).
- ♦ **Gehypochthoniidae** Strenzke, 1963  
Distribución: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
- ♣ *Gehypochthonius* Jacot, 1936  
Especie tipo: *Gehypochthonius rhadamanthus* Jacot, 1936  
Distribución: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
- *Gehypochthonius antonii* Lombardini, 1962 “*sp. inq.*”  
Distribución: Italia.
- *Gehypochthonius rhadamanthus* Jacot, 1936  
Distribución: Semicosmopolita (Holártica: Europa, Japón y Neártica, Norte de Oriental, Australia y Panamá).
- Suborden ENARTHRONOTA Grandjean, 1947
- ▲ **Hypochthonioidea** Berlese, 1910
- ♦ **Hypochthoniidae** Berlese, 1910  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- ♣ *Eohypochthonius* Jacot, 1938 (= *Afrhypochthonius* Balogh, 1958)  
Especie tipo: *Hypochthonius gracilis* Jacot, 1936  
Distribución: Pantropical y subtropical.
- *Eohypochthonius benacensis* Schatz, 2009  
Distribución: Italia.
- *Eohypochthonius crassisetiger* Aoki, 1959 (*E. gracilis* c.)  
Distribución: Paleártica meridional: Cáucaso y Paleártica oriental (excepto Norte), y Australianooriental.
- *Eohypochthonius parvus* Aoki, 1977  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea occidental y Este de Paleártica oriental).
- ♣ *Hypochthonius* Koch, 1835  
Especie tipo: *Hypochthonius rufulus* Koch, 1835  
Distribución: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
- *Hypochthonius luteus* Oudemans, 1917 (= *Hypochthonius luteus rectosetosus* Krivolutsky, 1965)  
Distribución: Holártica (frecuente), Noreste de Oriental y Nueva Zelanda.
- Hypochthonius rufulus* Koch, 1835
- *Hypochthonius rufulus rufulus* Koch, 1835 (= *Hypochthonius rufulus brevisetosus* Krivolutsky, 1965) (= *Hypochthonius pallidulus* Koch, 1835)  
Distribución: Semicosmopolita: Holártica (frecuente), Oriental (China suroriental e India: Bengala Occidental), I. Seychelles y Méjico.
- *Hypochthonius rufulus europaeus* Krivolutsky, 1965  
Distribución: Europa oriental.

♦ **Eniochthoniidae** Grandjean, 1947

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

♣ **Hypochthoniella** Berlese, 1910

(=**Arthrochthonius** Ewing, 1917)

(=**Eniochthonius** Grandjean, 1933)

Especie tipo: *Hypochthonius minutissimus* Berlese, 1904

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• *Hypochthoniella minutissima* (Berlese, 1904) (*Hypochthonius*)

(=**Eniochthonius grandjeani** Hammen, 1952)

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

▲ **Brachychthonioidea** Thor, 1934♦ **Brachychthoniidae** Thor, 1934

Distribución: Cosmopolita.

♣ **Brachychthonius** Berlese, 1910

(=**Brachychochthonius** Jacot, 1938)

Especie tipo: (*Hypochthonius brevis* Michael “sensu” Berlese, 1910)

=*Brachychthonius berlese* Willmann, 1928

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Australiana).

• *Brachychthonius amicabilis* Gil-Martín y Subías, 1997

Distribución: España.

• *Brachychthonius berlese* Willmann, 1928 (=**Brachychochthonius jugatus** Jacot, 1938)

Distribución: Holártica (frecuente).

• *Brachychthonius bimaculatus* Willmann, 1936 (=**Brachychthonius helveticus** Schweizer, 1956)

Distribución: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Canadá).

• *Brachychthonius hauserorum* (Mahunka, 1979) (**Brachychochthonius**)

Distribución: Mediterránea (Grecia y Túnez).

• *Brachychthonius hirtus* Moritz, 1976

Distribución: Europa centromeridional y Mongolia.

• *Brachychthonius impressus* Moritz, 1976 (=**Brachychochthonius subcrucoides** Balogh y Mahunka, 1979)

Distribución: Paleártica.

• *Brachychthonius parahirtus* Subías y Gil-Martín, 1991

Distribución: Ibérica.

• *Brachychthonius pius* Moritz, 1976

Distribución: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, y Canadá).

• *Brachychthonius pseudoimmaculatus* Subías y Gil-Martín, 1991

Distribución: Mediterránea.

♣ **Eobrachychthonius** Jacot, 1936

Especie tipo: (*Eobrachychthonius sexnotatus* Jacot, 1936) =*Brachychthonius latior* Berlese, 1910

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Neotropical y Antártica).

• *Eobrachychthonius borealis* Forsslund, 1942

Distribución: Holártica (menos frecuente en el Sur).

• *Eobrachychthonius latior* (Berlese, 1910) (*Brachychthonius*)

(=**Brachychthonius brevis glabra** Thor, 1930)

(=**Eobrachychthonius grandis** Sellnick, 1944)

(=**Eobrachychthonius latior strictior** Lombardini, 1963)

(=**Brachychthonius mooseri** Hammen, 1951)

(=**Eobrachychthonius sexnotatus** Jacot, 1936)

Distribución: Holártica (frecuente).

• *Eobrachychthonius longisetosus* Csiszár, 1960

Distribución: Europa centromeridional.

• *Eobrachychthonius oudemansi* Hammen, 1952

(=**Eobrachychthonius argentinensis** Hammer, 1958)

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, China suroriental, Neotropical y Antártica:

I. Georgia del Sur).

• *Eobrachychthonius similis* Mahunka, 1979

Distribución: Europa meridional.

♣ **Liochthonius** Hammen, 1959

Especie tipo: (*Brachychthonius perpusillus* Berlese, 1910) =*Hypochthonius brevis* Michael, 1888

Distribución: Cosmopolita.

• *Liochthonius alpestris* (Forsslund, 1958) (*Brachychthonius*)

Distribución: Paleártica.

• *Liochthonius asper* Chinone, 1978

Distribución: Holártica meridional (Cáucaso, Este de Paleártica oriental y U.S.A.: Luisiana) y China suroriental.

• *Liochthonius brevis* (Michael, 1888) (*Hypochthonius*)

(=**Brachychthonius perpusillus** Berlese, 1910)

Distribución: Holártica (frecuente).

• *Liochthonius clavatus* (Forsslund, 1942)

(*Brachychthonius*)

Distribución: Paleártica (menos frecuente en el Sur).

• *Liochthonius dilutus* Moritz, 1976

Distribución: Paleártica occidental.

• *Liochthonius evansi* (Forsslund, 1958)

(*Brachychthonius*)

(=**Liochthonius asothalomensis** Marshall, Reeves y Norton, 1987)

(=**Liochthonius forsslundi** Mahunka, 1969, “*nom. praeoc.*” por Hammer, 1952)

(=**Liochthonius forsslundi levis** Chinone, 1974)

Distribución: Holártica (Paleártica y U.S.A.: Carolina del Norte) y China suroriental.

• *Liochthonius furcillatus* (Willmann, 1942) (*Brachychthonius*)

(=**Brachychthonius ensifer** Strenzke, 1951)

Distribución: Paleártica (menos frecuente en

el Sur).

- *Liochthonius horridus* (Sellnick, 1928)  
(*Brachychthonius*)  
Distribución: Paleártica (frecuente).
- *Liochthonius hystricinus* (Forsslund, 1942)  
(*Brachychthonius*)  
(=*Brachychthonius ocellatus* Hammer, 1952)  
Distribución: Holártica (frecuente).
- *Liochthonius laetepictus* (Berlese, 1910)  
(*Brachychthonius*) “*sp. inq.*”  
Distribución: Italia.
- *Liochthonius lapponicus* (Trägårdh, 1910)  
(*Hypochthonius brevis l.*)  
Distribución: Holártica (frecuente).
- *Liochthonius leptaleus* Moritz, 1976  
Distribución: Europa centromeridional.
- *Liochthonius moritzi* Balogh y Mahunka, 1983  
(=*Liochthonius hystricinus tuxeni* Chinone, 1974,  
“*nom. praeoc.*” por Forsslund, 1957)  
Distribución: Paleártica meridional.
- *Liochthonius muscorum* Forsslund, 1964  
Distribución: Paleártica.
- *Liochthonius neglectus* Moritz, 1976  
Distribución: Paleártica occidental.
- *Liochthonius peduncularius* (Strenzke, 1951)  
(*Brachychthonius*)  
Distribución: Europea.
- *Liochthonius perelegans* Moritz, 1976  
Distribución: Europa centrooccidental.
- *Liochthonius perfusorius* Moritz, 1976  
Distribución: Europea.
- *Liochthonius phitosi* Mahunka, 1982  
Distribución: Grecia.
- *Liochthonius propinquus* Niedbała, 1972  
Distribución: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Liochthonius sellnicki* (Thor, 1930)  
(*Brachychthonius*)  
(?=*Brachychthonius brevis expolitus* Berlese,  
1910 “*sp. inq.*”)  
(=*Brachychthonius nodosus* Willmann, 1952)  
(=*Brachychthonius scalaris* Forsslund, 1942)  
Distribución: Holártica (frecuente) y China  
suroriental.
- *Liochthonius simplex* (Forsslund, 1942)  
(*Brachychthonius*)  
Distribución: Semicosmopolita: Paleártica,  
Groenlandia, Oriental (Filipinas e India: Tripura)  
y Australia.
- *Liochthonius strenzkei* Forsslund, 1963  
Distribución: Holártica y China suroriental.
- *Liochthonius tuxeni* (Forsslund, 1957)  
(*Brachychthonius hystricinus t.*)  
Distribución: Europa occidental.
- *Liochthonius tyrrhenicus* Bernini, 1985  
Distribución: Mediterránea occidental.
- ♣ ***Mixochthonius*** Niedbała, 1972  
Especie tipo: *Brachychthonius pilosetosus*  
Forsslund, 1942  
Distribución: Holártica.
- *Mixochthonius pilosetosus* (Forsslund, 1942)  
(*Brachychthonius*)

(=*Mixochthonius moritzi* Evison, 1981)  
Distribución: Boreoalpina (Paleártica  
occidental y Canadá).

- ♣ ***Neobrachychthonius*** Moritz, 1976  
Especie tipo: *Brachychthonius marginatus*  
Forsslund, 1942  
Distribución: Paleártica.
- *Neobrachychthonius magnus* Moritz, 1976  
(*N. marginatus m.*)  
Distribución: Paleártica (Paleártica  
occidental y Japón).
- *Neobrachychthonius marginatus* (Forsslund,  
1942) (*Brachychthonius*)  
(=*Brachychthonius neosimplex* Schweizer, 1956)  
Distribución: Paleártica (menos frecuente en  
el Sur).
- ♣ ***Neolichthonius*** Lee, 1982  
(=***Moritzichthonius*** Pereda e Iturrondobeitia,  
1990)  
(=***Paralichthonius*** Moritz, 1976, “*nom.*  
*praeoc.*” por Beier, 1956)  
Especie tipo: *Brachychthonius piluliferus*  
Forsslund, 1942  
Distribución: Holártica.
- *Neolichthonius globuliferus* (Strenzke, 1951)  
(*Brachychthonius*)  
Distribución: Europa centromeridional.
- *Neolichthonius occultus* (Niedbała, 1971)  
(*Liochthonius*)  
Distribución: Euroatlántica.
- *Neolichthonius piluliferus* (Forsslund, 1942)  
(*Brachychthonius*)  
Distribución: Holártica (menos frecuente en  
el Sur).
- ♣ ***Papillochthonius*** Gil-Martín, Subías y Arillo,  
1992  
Especie tipo: *Papillochthonius astatus* Gil-  
Martín, Subías y Arillo, 1992  
Distribución: Paleártica.
- *Papillochthonius astatus* Gil-Martín, Subías y  
Arillo, 1992  
Distribución: Sahara occidental.
- ♣ ***Poecilochthonius*** Balogh, 1943  
Especie tipo: *Brachychthonius brevis*  
*italicus* Berlese, 1910  
Distribución: Cosmopolita (excepto Etiópica  
y Antártica).
- *Poecilochthonius italicus* (Berlese, 1910)  
(*Brachychthonius brevis i.*)  
Distribución: Holártica (menos frecuente en  
el Norte).
- *Poecilochthonius spiciger* (Berlese, 1910)  
(*Brachychthonius brevis s.*)  
(=*Brachychthonius rapoportii* Balogh y Mahunka,  
1968)  
Distribución: Holártica, China suroriental y  
Neotropical (Argentina e I. Galápagos).
- ♣ ***Sellnickochthonius*** Krivolutsky, 1964

Especie tipo: *Brachychthonius zelawaiensis* Sellnick, 1928

Distribución: Cosmopolita.

• *Sellnickochthonius anonymus* Ruiz, Subías y Kahwash, 1991

Distribución: España.

• *Sellnickochthonius chinonei* Subías y Shtanchaeva, 2011

Distribución: Paleártica meridional.

• *Sellnickochthonius cricoides* (Weis-Fogh, 1948) (*Brachychthonius* (*Brachychochthonius*))

Distribución: Paleártica, India y Australia.

• *Sellnickochthonius dolosus* Gil-Martín, Subías y Arillo, 1992

Distribución: Ibérica.

• *Sellnickochthonius formosus* (Cooreman, 1947) (*Eobrachychthonius*)

Distribución: Euroatlántica.

• *Sellnickochthonius fuentesi* Ruiz, Subías y Kahwash, 1991

Distribución: España.

• *Sellnickochthonius furcatus* (Weis-Fogh, 1948) (*Brachychthonius* (*Brachychochthonius*))

Distribución: Paleártica occidental.

• *Sellnickochthonius guanophilus* (Mahunka, 1979) (*Brachychochthonius*)

Distribución: Grecia.

• *Sellnickochthonius honestus* (Moritz, 1976) (*Brachychochthonius*)

Distribución: Europa occidental.

• *Sellnickochthonius immaculatus* (Forsslund, 1942) (*Brachychochthonius*) (= *Brachychochthonius arcticus* Hammer, 1952) (= *Brachychochthonius berlesei erosus* Jacot, 1938)

(= *Brachychthonius gygeri* Bader, 1963) (= *Brachychthonius obscurus* Krivolutsky, 1966)

(= *Brachychthonius semiornatus* Evans, 1952)

(= *Brachychthonius striatus* Willmann, 1956)

Distribución: Holártica (frecuente) y

Neotropical.

• *Sellnickochthonius jacoti* (Evans, 1952) (*Brachychthonius*)

Distribución: Holártica (Paleártica y U.S.A.: Carolina del Norte).

• *Sellnickochthonius maroccanus* (Mahunka, 1980) (*Brachychochthonius*)

Distribución: Marruecos.

• *Sellnickochthonius meridionalis* (Bernini, 1973) (*Brachychochthonius*)

Distribución: Mediterránea.

• *Sellnickochthonius niliacus* (Al-Assiuty, Bayoumi, Abdel-Hamid y El-Deeb, 1984) (*Brachychochthonius*)

Distribución: Egipto.

• *Sellnickochthonius phyllophorus* (Moritz, 1976) (*Brachychochthonius*)

Distribución: Europa centromeridional.

• *Sellnickochthonius plumosus* Subías y Gil-Martín, 1991

Distribución: Mediterránea.

• *Sellnickochthonius rostratus* (Jacot, 1936) (*Brachychthonius*)

• *Sellnickochthonius rostratus rostratus* (Jacot, 1936)

Distribución: Holártica.

• *Sellnickochthonius rostratus hungaricus* (Balogh, 1943) (*Poecilochthonius h.*)

Distribución: Paleártica meridional y China suroriental.

• *Sellnickochthonius suecicus* (Forsslund, 1942) (*Brachychochthonius jugatus s.*)

Distribución: Semicosmopolita (Paleártica, Neártica: Canadá, Australiana: Nueva Zelanda, y subantártica: I. Amsterdam).

• *Sellnickochthonius variabilis* (Mahunka, 1982) (*Brachychochthonius*)

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Sellnickochthonius zelawaiensis* (Sellnick, 1928) (*Brachychthonius*)

Distribución: Holártica (frecuente).

#### ♠ *Synchthonius* Hammen, 1952

Especie tipo: (*Synchthonius boschmai* Hammen, 1952) = *Brachychochthonius crenulatus* Jacot, 1938

Distribución: Holártica.

• *Synchthonius crenulatus* (Jacot, 1938) (*Brachychochthonius*)

(= *Synchthonius boschmai* Hammen, 1952)

Distribución: Holártica (frecuente).

• *Synchthonius elegans* Forsslund, 1956

Distribución: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional).

#### ♠ *Verachthonius* Moritz, 1976

Especie tipo: *Brachychthonius laticeps* Strenzke, 1951

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Australiana y Neotropical).

• *Verachthonius diversus* Moritz, 1976

Distribución: Europa centrooccidental.

• *Verachthonius laticeps* (Strenzke, 1951) (*Brachychthonius*)

Distribución: Paleártica (Europa y Japón).

• *Verachthonius pseudolaticeps* (Subías, 1977) (*Liochthonius*)

Distribución: España.

#### ▲ *Cosmochthonioidea* Grandjean, 1947

##### ◆ *Cosmochthoniidae* Grandjean, 1947

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

##### ♠ *Cosmochthonius* Berlese, 1910

Especie tipo: *Hypochochthonius lanatus* Michael, 1885

*Cosmochthonius* (*Cosmochthonius*) Berlese, 1910

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• *Cosmochthonius (C.) asiaticus* Gordeeva, 1980  
Distribución: Paleártica meridional (Asia centrooccidental y España).

• *Cosmochthonius (C.) foliatus* Subías, 1982

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán)

- *Cosmochthonius (C.) lanatus* (Michael, 1885) (*Hypochthonius*) (= *Cosmochthonius arctosus* Pankov, 2002) (= *Cosmochthonius domesticus* Grandjean, 1947) (= *Cosmochthonius novus* Sergienko, 1991) (= *Cosmochthonius wallworki* Lee, 1982)

Distribución: Cosmopolita (Holártica: frecuente, Etiópica, Oriental y Neotropical).

- *Cosmochthonius (C.) macrosetosus* Ayyildiz y Luxton, 1990

Distribución: Turquía.

- *Cosmochthonius (C.) maroccanus* Gil-Martín, Subías y Arillo, 1992

Distribución: Mediterránea occidental.

- *Cosmochthonius (C.) minifoveolatus* Gil-Martín, Subías y Candelas, 1991

Distribución: España.

- *Cosmochthonius (C.) monegrensis* Pérez-Íñigo jr., 1991

Distribución: España.

- *Cosmochthonius (C.) pallidus* Lombardini, 1961 “*sp. inq.*”

Distribución: Italia.

- *Cosmochthonius (C.) perezinigo* Morell, 1988

Distribución: España.

- *Cosmochthonius (C.) plumatus* Berlese, 1910

Distribución: Holártica meridional.

- *Cosmochthonius (C.) ponticus* Gordeeva, 1980

Distribución: Mediterránea oriental.

- *Cosmochthonius (C.) reticulatus* Grandjean, 1947 (= *Cosmochthonius trivialis* Sergienko, 1991)

Distribución: Mediterránea y Brasil.

- *Cosmochthonius (C.) semifoveolatus* Subías, 1982

Distribución: España.

- *Cosmochthonius (C.) signatus* Pérez-Íñigo, 1990

Distribución: España.

- *Cosmochthonius (C.) spinosus* Gil-Martín, Subías y Candelas, 1991

Distribución: Ibérica.

- *Cosmochthonius (C.) taurus* Niemi, Gordeeva y Ayyildiz, 2002

Distribución: Turquía.

- *Cosmochthonius (C.) tenuisetus* Gordeeva, 1980

Distribución: Ucrania (Crimea).

- *Cosmochthonius (C.) ugamaensis* Gordeeva, 1980

Distribución: Paleártica meridional (Asia centrooccidental y Grecia)

- *Cosmochthonius (C.) zanini* Penttinen y Gordeeva, 2003

Distribución: Mediterránea oriental.

***Cosmochthonius (Nanochthonius)*** Subías y Gil-Martín, 1995 (= *Microchthonius* Kahwash, Subías y Ruiz, 1989, “*nom. praec.*” por Hadzi, 1933)

Especie tipo: *Cosmochthonius (Microchthonius) ruizi* Kahwash, Subías y Ruiz, 1989

Distribución: Holártica.

- *Cosmochthonius (Nanochthonius) ruizi* Kahwash, Subías y Ruiz, 1989 (*C. (Microchthonius)*)

Distribución: Mediterránea occidental.

- ♠ ***Krivolutskiella*** Gordeeva, 1980

Especie tipo: *Krivolutskiella pubescens* Gordeeva, 1980

Distribución: Paleártica.

- *Krivolutskiella pennata* Gordeeva, Penttinen y Petrova, 2007

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).

- *Krivolutskiella pubescens* Gordeeva, 1980

Distribución: Mediterránea occidental.

- ♠ ***Phyllozetes*** Gordeeva, 1978

Especie tipo: *Cosmochthonius emmae* Berlese, 1910

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Phyllozetes emmae* (Berlese, 1910) (*Cosmochthonius*) (= *Trichthonius heterotrichus* Sanyal y Bhaduri, 1983)

Distribución: Pantropical (excepto Etiópica) y subtropical.

- *Phyllozetes latifolius* Gordeeva, 1980

Distribución: Mediterránea e Indonesia.

- *Phyllozetes osithchnjukovi* Gordeeva, 1980

Distribución: Mediterránea oriental.

- *Phyllozetes tauricus* Gordeeva, 1978

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).

- ♦ **Heterochthoniidae** Grandjean, 1954

Distribución: Paleártica.

- ♠ ***Heterochthonius*** Berlese, 1910

Especie tipo: *Cosmochthonius (Heterochthonius) gibbus* Berlese, 1910

Distribución: Paleártica.

- *Heterochthonius caucasicus* Krivolutsky, 1977

Distribución: Cáucaso.

- *Heterochthonius gibbus* (Berlese, 1910) (*Cosmochthonius (H.)*)

Distribución: Paleártica meridional.

- ♦ **Haplochthoniidae** Hammen, 1959

Distribución: Cosmopolita.

- ♠ ***Annemochthonius*** Grandjean, 1949

Especie tipo: *Annemochthonius taeniophorus* Grandjean, 1949

Distribución: Paleártica y Australiana.

- *Annemochthonius taeniophorus* Grandjean, 1949

Distribución: Mediterránea y Australia.

- ♠ ***Haplochthonius*** Willmann, 1930 (= *Tetrochthonius* Hammer, 1958)

Especie tipo: *Cosmochthonius*



(*Haplochthonius simplex* Willmann, 1930

Distribución: Cosmopolita (excepto Australiana).

• *Haplochthonius clavatus* (Hammer, 1958) (*Tetrochthonius*)

Distribución: Neotropical, India y España.

• *Haplochthonius crassisetosus* Gil-Martín, Subías y Arillo, 1992

Distribución: Mediterránea occidental.

• *Haplochthonius graecus* Mahunka, 1992

Distribución: Grecia.

• *Haplochthonius sanctaeluciae* Bernini, 1973

Distribución: Paleártica meridional

(Mediterránea occidental y Asia

centrooccidental), Senegal y Neotropical

(I. Galápagos y Chile).

• *Haplochthonius simplex* (Willmann, 1930)

(*Cosmochthonius* (H.))

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica: Senegal, y Oriental).

◆ **Pediculochelidae** Lavoipierre, 1946

Distribución: Pantropical (excepto Neotropical) y Holártica meridional.

♠ *Paralycus* Womersley, 1944

(=*Pediculochelus* Lavoipierre, 1946)

Especie tipo: *Alycus pyrigerus* Berlese, 1905

Distribución: Pantropical (excepto Neotropical) y Holártica meridional.

• *Paralycus pyrigerus* (Berlese, 1905) (*Alycus*)

Distribución: Mediterránea occidental.

◆ **Sphaerochthoniidae** Grandjean, 1947

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

♠ *Sphaerochthonius* Berlese, 1910

(=*Sphaerochthoniella* Mahunka, 1985)

Especie tipo: *Hypochothionius splendidus* Berlese, 1904

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• *Sphaerochthonius gemma* (Oudemans, 1909) (*Hypochothionius*)

(=*Sphaerochthonius elegans* Berlese, 1910)

(=*Sphaerochthonius elegans* Berlese, 1916,

“*nom. praeoc.*” por Berlese, 1910)

(=*Sphaerochthonius wallworki* Lee, 1982)

Distribución: Indonesia (Java y Komodo), Etiópica (Ghana y Somalia) y Sureste de Europa (Ucrania: Crimea).

• *Sphaerochthonius pallidus* Muñoz-Mingarro, 1987

Distribución: España.

• *Sphaerochthonius splendidus* (Berlese, 1904) (*Hypochothionius*)

(=*Sphaerochthonius dilutus* Sergienko, 1991)

(=*Sphaerochthonius ovatus* Sergienko, 1991)

Distribución: Tropical (Oriental: China suroriental, Australiana: Australia y Polinesia, y Neotropical: Chile e I. Galápagos) y subtropical

(Holártica meridional: frecuente).

• *Sphaerochthonius suzukii* Aoki, 1977

Distribución: Paleártica meridional

(Cáucaso y Japón) y Hawai.

• *Sphaerochthonius transversus* Wallwork, 1960

Distribución: Tropical (Ghana, India y

Cuba) y Paleártica meridional.

▲ **Atopochthonioidea** Grandjean, 1949

◆ **Atopochthoniidae** Grandjean, 1949

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Paleotropical y Australiana).

♠ **Atopochthonius** Grandjean, 1949

Especie tipo: *Atopochthonius artiodactylus* Grandjean, 1949

Distribución: Holártica y Oriental.

• *Atopochthonius artiodactylus* Grandjean, 1949

Distribución: Holártica y China suroriental.

• *Atopochthonius maimaensis* Grishina, 1971

Distribución: Paleártica meridional

(Cáucaso y Paleártica oriental meridional).

♠ **Pterochthonius** Berlese, 1913

Especie tipo: *Cosmochthonius angelus* Berlese, 1910

Distribución: Holártica, y Australianooriental.

• *Pterochthonius angelus* (Berlese, 1910) (*Cosmochthonius*)

Distribución: Holártica, China suroriental, Méjico y Hawai.

▲ **Protoplophoroidea** Ewing, 1917

◆ **Protoplophoridae** Ewing, 1917

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

♠ **Arthrophlophora** Berlese, 1910

(=*Neoprototritia* Shereef, 1978)

(=*Triplophora* Mahunka, 1977)

Especie tipo: *Arthrophlophora paradoxa* Berlese, 1910

Distribución: Paleotropical.

• *Arthrophlophora zachvatkini* (Shereef, 1978) (*Neoprototritia*)

Distribución: Egipto.

♠ **Bursoplophora** Subías y Pérez-Íñigo, 1978

(=*Csibiplophora* Mahunka, 1984)

Especie tipo: *Bursoplophora iberica* Subías y Pérez-Íñigo, 1978

Distribución: Tropical (Etiópica y Neotropical) y Paleártica meridional.

• *Bursoplophora bivaginata* (Grandjean, 1932) (*Protoplophora*)

Distribución: Mediterránea.

• *Bursoplophora iberica* Subías y Pérez-Íñigo, 1978

Distribución: España.

• *Bursoplophora insularis* Kahwash, Subías y

Ruiz, 1989

Distribución: Mediterránea occidental.

- *Bursoplophora meridionalis* Bernini, 1983  
Distribución: Italia (Sicilia).

- *Bursoplophora tyrrhenica* Bernini, 1983  
Distribución: Mediterránea occidental.

♣ ***Cryptoplophora*** Grandjean, 1932

Especie tipo: *Cryptoplophora abscondita*

Grandjean, 1932

Distribución: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).

- *Cryptoplophora abscondita* Grandjean, 1932  
Distribución: Tropical: Etiópica (Nigeria), Oriental (Java) y Neotropical, y subtropical: Paleártica (Mediterránea y Japón) y Neártica (U.S.A.: Tejas).

♣ ***Grandjeanoplophora*** Balogh y Mahunka, 1979

Especie tipo: *Cryptoplophora mauritanica*

Grandjean, 1932

Distribución: Paleártica.

- *Grandjeanoplophora mauritanica* (Grandjean, 1932) (*Cryptoplophora*)  
Distribución: Marruecos.

♣ ***Hauseroplophora*** Mahunka, 1977

Especie tipo: *Hauseroplophora soniae*

Mahunka, 1977

Distribución: Paleártica meridional y Etiópica.

- *Hauseroplophora phitosi* Mahunka, 1977  
Distribución: Grecia.

♣ ***Protoplophora*** Berlese, 1910

Especie tipo: *Protoplophora palpalis*

Berlese, 1910

Distribución: Holártica y Australiana.

- *Protoplophora oglasicola* Bernini, 1983  
Distribución: Italia.
- *Protoplophora palpalis* Berlese, 1910 (= *Protoplophora grandjeani* Bernini, 1983)  
Distribución: Holártica meridional (Paleártica meridional y U.S.A.: California) y Australia.

♣ ***Prototritia*** Berlese, 1916

Especie tipo: *Arthrophlophora (Prototritia)*

*armadillo* Berlese, 1916

***Prototritia (Siciliophora)*** Bernini, 1983

Especie tipo: *Prototritia (Siciliophora)*

*sicula* Bernini, 1983

Distribución: Paleártica.

- *Prototritia (Siciliophora) sicula* Bernini, 1983  
Distribución: Italia (Sicilia).

- Suborden MIXONOMATA Grandjean, 1969

Infraorden DICHOSOMATA Balogh y Mahunka, 1979

▲ **Perlohmannioidea** Grandjean, 1954

◆ **Perlohmanniidae** Grandjean, 1954

Distribución: Holártica y Australiana.

♣ ***Perlohmannia*** Berlese, 1916

(= *Neolohmannia* Bulanova-Zachvatkina, 1960)

Especie tipo: *Lohmannia insignis* Berlese, 1904

Distribución: Holártica y Australiana.

- *Perlohmannia altaica* Grishina, 1968  
Distribución: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).
- *Perlohmannia coiffaiti* Grandjean, 1961  
Distribución: Paleártica (Europa centromeridional y Este de Asia) y ¿Neártica septentrional?.
- *Perlohmannia dissimilis* (Hewitt, 1908) (*Lohmannia insignis d.*)  
Distribución: Paleártica (Europa centromeridional, Asia centrooccidental y Este de Rusia asiática) y Hawai.
- *Perlohmannia nasuta* Schuster, 1960  
Distribución: Europa centromeridional.
- *Perlohmannia zachvatkini* (Bulanova-Zachvatkina, 1960) (*Neolohmannia*)  
Distribución: Paleártica (Cáucaso e I. Sajalín).

◆ **Collohmanniidae** Grandjean, 1958

Distribución: Paleártica.

♣ ***Collohmannia*** Sellnick, 1922

(= *Phthiracaroides* Štorkán, 1923)

Especie tipo: *Collohmannia gigantea*

Sellnick, 1922

Distribución: Paleártica.

- *Collohmannia gigantea* Sellnick, 1922 (= *Phthiracaroides incertus* Štorkán, 1923) (= *Collohmannia nova* Sellnick, 1932)  
Distribución: Paleártica meridional (Europa centrooriental y Asia centrooccidental).

▲ **Eulohmannioidea** Grandjean, 1931

◆ **Eulohmanniidae** Grandjean, 1931

Distribución: Holártica y Oriental.

♣ ***Eulohmannia*** Berlese, 1910

(= *Arthronothrus* Trägårdh, 1910)

Especie tipo: *Lohmannia (Eulohmannia)*

*ribagai* Berlese, 1910

Distribución: Holártica y Oriental.

- *Eulohmannia ribagai* (Berlese, 1910) (*Lohmannia (E.)*) (= *Arthronothrus biunguiculatus* Trägårdh, 1910)  
Distribución: Holártica (frecuente) y China suroriental.

▲ **Epilohmannioidea** Oudemans, 1923

◆ **Epilohmanniidae** Oudemans, 1923

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

- ♣ **Epilohmannia** Berlese, 1910  
(=*Lesseria* Oudemans, 1917)  
(=*Neoepilohmannia* Bolen y McDaniel, 1989)  
(=*Sinolohmannia* Balogh y Mahunka, 1979)  
Especie tipo: *Lohmannia cylindrica* Berlese, 1904  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).  
*Epilohmannia cylindrica* (Berlese, 1904) (*Lohmannia*)
- *Epilohmannia cylindrica cylindrica* (Berlese, 1904)  
(=*Phthiracarus szanisloi* Oudemans, 1915)  
(=*Epilohmannia verrucosa* Jacot, 1934)  
Distribución: Cosmopolita (Paleártica: menos frecuente en el Norte, Neártica, Etiópica: Chad, Oriental, Australiana: Hawaii, y Neotropical: Cuba e I. Galápagos).
  - *Epilohmannia cylindrica minima* Schuster, 1960  
Distribución: Europa meridional (frecuente).
  - *Epilohmannia daghestanica* Karppinen y Shtanchaeva, 1987  
Distribución: Cáucaso.
  - *Epilohmannia gigantea* Berlese, 1916  
Distribución: Europa meridional.
  - *Epilohmannia heterotricha* Mahunka, 1966  
Distribución: Italia.
  - *Epilohmannia inexpectata* Schuster, 1960  
Distribución: Mediterránea e I. Santa Helena.
  - *Epilohmannia kulaginae* Shtanchaeva, 1993  
Distribución: Cáucaso.
- Epilohmannia minuta* Berlese, 1920
- *Epilohmannia minuta aegyptica* Bayoumi y Mahunka, 1976 (*E. pallida a.*)  
Distribución: Mediterránea oriental.
  - *Epilohmannia norberti* Moreno y Moraza, 1994  
Distribución: España.
  - *Epilohmannia ovata* Aoki, 1961  
Distribución: Paleártica meridional: Cáucaso y Paleártica oriental (excepto Norte), y China suroriental.
  - *Epilohmannia styriaca* Schuster, 1960  
Distribución: Europa meridional.
- ▲ **Lohmannioidea** Berlese, 1916
- ◆ **Lohmanniidae** Berlese, 1916  
Distribución: Pantropical y subtropical.
- ♣ **Cryptacarus** Grandjean, 1950  
Especie tipo: *Cryptacarus promecus* Grandjean, 1950  
Distribución: Pantropical (excepto Neotropical) y Paleártica meridional.
- *Cryptacarus promecus* Grandjean, 1950  
(=*Lohmannia valdemorica* Mihelčič, 1956)  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental) y Etiópica.
- ♣ **Heptacarus** Piffel, 1963 (10 spp.)  
(=*Neotrichacarus* Hammer, 1973)  
(=*Pseudocryptacarus* McDaniel, Norton y Bolen, 1979)  
Especie tipo: *Heptacarus notoneotrichus* Wallwork, 1963  
Distribución: Pantropical y subtropical (Holártica meridinal).
- *Heptacarus ornatus* Bayoumi y Al-Khalifa, 1985  
Distribución: Mediterránea oriental.
  - *Heptacarus supertrichus* Piffel, 1967  
Distribución: Iraq.
- ♣ **Javacarus** Balogh, 1961  
(=*Tongacarus* Hammer, 1973)  
Especie tipo: *Javacarus kuehnelti* Balogh, 1961  
Distribución: Pantropical.
- *Javacarus kuehnelti* Balogh, 1961  
Distribución: Tropical (Oriental: frecuente, y Australiana: Islas del Pacífico) y Egipto.
- ♣ **Lohmannia** Michael, 1898  
(=*Michaelia* Haller, 1884, “*nom. praeoc.*” por Roemer, 1852)  
Especie tipo: *Michaelia paradoxa* Haller, 1884  
Distribución: Pantropical y subtropical.
- *Lohmannia egyptica* (Elbadry y Nasr, 1977) (*Papillacarus*)  
Distribución: Egipto.
  - *Lohmannia hungarorum* Mahunka, 1980  
Distribución: Mediterránea occidental.
  - *Lohmannia paradoxa* (Haller, 1884) (*Michaelia*)  
(=*Lohmannia loebli* Mahunka, 1974)  
Distribución: Paleártica occidental (Mediterránea y Alemania).
  - *Lohmannia regalis* Berlese, 1923  
Distribución: Mediterránea.
  - *Lohmannia reticulata* Sellnick, 1931 (*L. regalis r.*)  
Distribución: Grecia.
  - *Lohmannia semibarbulata* Ruiz, Subías y Kahwash, 1991  
Distribución: España.
  - *Lohmannia turcmenica* Bulanova-Zachvatkina, 1960 (*L. lanceolata t.*)  
(=*Lohmannia hispaniola* Pérez-Íñigo, 1967)  
Distribución: Paleártica meridional, China suroriental y Argentina.
  - *Lohmannia vanharteni* Mahunka, 1987  
Distribución: Macaronésica (Cabo Verde).
- ♣ **Mixacarus** Balogh, 1958  
(=*Hamacarus* Hammer, 1977)  
Especie tipo: *Mixacarus integrus* Balogh, 1958  
Distribución: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical (Holártica meridional).
- *Mixacarus exilis* Aoki, 1970  
Distribución: Paleártica meridional (Este

de Paleártica oriental y Cáucaso) y China suroriental.

- *Mixacarus murcioides* (Berlese, 1896) (*Angelia*)  
Distribución: Italia.

♣ ***Papillacarus*** Kunst, 1959  
(=*Vepracarus* Aoki, 1965)

Especie tipo: *Lohmannia murcioides aciculata* Berlese, 1905

Distribución: Pantropical y subtropical.

- *Papillacarus abchasicus* Tarba, 1985  
Distribución: Cáucaso.
- *Papillacarus aciculatus* (Berlese, 1905) (*Lohmannia murcioides a.*)  
Distribución: Paleártica occidental (excepto Norte) y Vietnam.
- *Papillacarus aequalis* Mahunka, 1991  
Distribución: Macaronésica (Cabo Verde).
- *Papillacarus akimovi* Sergienko, 1992  
Distribución: Mediterránea oriental.
- *Papillacarus angulatus* Wallwork, 1962  
Distribución: África centrooccidental y Cáucaso.
- *Papillacarus chamartinensis* Pérez-Íñigo, 1967  
Distribución: España.
- *Papillacarus ondriasi* Mahunka, 1974  
Distribución: Sureste de Europa y China suroriental.
- *Papillacarus pavlovskii* (Bulanova-Zachvatkina, 1960) (*Thamnacarus*)  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).
- *Papillacarus pseudoaciculatus* Mahunka, 1980  
Distribución: Mediterránea occidental y Australia.
- *Papillacarus vitis* Elbadry y Nasr, 1977  
Distribución: Egipto.

♣ ***Reptacarus*** Pérez-Íñigo y Peña, 1995  
Especie tipo: *Reptacarus sagatus* Pérez-Íñigo y Peña, 1995  
Distribución: Paleártica.

- *Reptacarus sagatus* Pérez-Íñigo y Peña, 1995  
Distribución: Mediterránea occidental.

♣ ***Thamnacarus*** Grandjean, 1950  
(=*Asiacarus* Krivolutsky, 1971)  
Especie tipo: *Lohmannia deserticola* Grandjean, 1934

Distribución: Subtropical (Paleártica meridional).

- *Thamnacarus deserticola* (Grandjean, 1934) (*Lohmannia*)  
Distribución: Paleártica meridional.
- *Thamnacarus longisetosus* Bulanova-Zachvatkina, 1978  
Distribución: Paleártica meridional.

Infradorden EUPTYCTIMA Grandjean, 1967

▲ **Mesoplophoroidea** Ewing, 1917

◆ **Mesoplophoridae** Ewing, 1917

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• ***Archoplophora*** Hammen, 1959

Especie tipo: (*Phthiracarulus laevis* Jacot, 1938) =*Phthiracarulus rostralis* Willmann, 1930

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Oriental y Neotropical).

• *Archoplophora rostralis* (Willmann, 1930) (*Phthiracarulus*)

(=*Phthiracarulus laevis* Jacot, 1938)

(=*Archoplophora villosa* Aoki, 1980)

Distribución: Holártica (Neártica: menos frecuente en el Sur, Paleártica oriental meridional y Cáucaso), Oriental Neotropical (Centroamérica).

♣ ***Mesoplophora*** Berlese, 1904

Especie tipo: *Mesoplophora michaeliana* Berlese, 1904

***Mesoplophora (Mesoplophora)*** Berlese, 1904  
(=*Phthiracarulus* Berlese, 1920)

Distribución: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical.

• *Mesoplophora (M.) michaeliana* Berlese, 1904

(=*Mesoplophora caucasica* Krivolutsky, 1975)

(=*Mesoplophora graeca* Walzl, 1974)

(=*Mesoplophora pectinata* Mahunka, 1979)

(=*Phthiracarulus (Phthiracarulus) perexiguus* Berlese, 1920)

Distribución: Paleártica meridional y Noreste de India.

***Mesoplophora (Parplophora)*** Niedbała, 1985

Especie tipo: *Mesoplophora pulchra* Sellnick, 1928

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• *Mesoplophora (Parplophora) pulchra* Sellnick, 1928 (*M.*)

Distribución: Paleártica occidental (excepto Norte) e Irán.

▲ **Euphthiracaroidea** Jacot, 1930

◆ **Oribotritiidae** Grandjean, 1954

Distribución: Cosmopolita.

♣ ***Austrotritia*** Sellnick, 1959

(=*Macarotritia* Pérez-Íñigo, 1986)

Especie tipo: *Austrotritia quadricarinata* Sellnick, 1959

Distribución: Paleotropical y subtropical.

• *Austrotritia herenessica* (Pérez-Íñigo, 1986) (*Indotritia (Macarotritia)*)

Distribución: I. Canarias.

♣ ***Indotritia*** Jacot, 1929

Especie tipo: *Tritia krakatauensis* Sellnick, 1924

Distribución: Cosmopolita.

• *Indotritia consimilis* Märkel, 1964

(*I. krakatauensis c.*)

Distribución: Europa centromeridional.

• *Indotritia krakatauensis* (Sellnick, 1923)

(*Tritia*)

(=*Indotritia acanthophora* Märkel, 1964)

(=*Indotritia heterotricha* Mahunka, 1984)

(=*Indotritia sellnicki* Aoki, 1965)

(=*Indotritia septentrionalis* Mahunka, 1987)

(=*Indotritia tropica* Starý, 1993)

Distribución: Pantropical (frecuente) y subtropical.

• *Indotritia tricarinata* Niedbała, 2006

Distribución: Eslovenia.

• *Indotritia zangherii* Mahunka y Paoletti, 1984

Distribución: Italia.

♠ *Mesotritia* Forsslund, 1963

(=*Entomotritia* Märkel, 1964)

Especie tipo: (*Mesotritia testacea* Forsslund, 1963) =*Phthiracarus flagelliformis* Ewing, 1909

Distribución: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).

• *Mesotritia grandjeani* (Feider y Suciú, 1957)

(*Oribotritia*)

Distribución: Paleártica (Este de Paleártica occidental y Este de Rusia asiática) y Méjico.

• *Mesotritia nuda* (Berlese, 1887) (*Tritia*)

(=*Oribotritia brachythrix* Walker, 1965)

(=*Mesotritia elastica* Sergienko, 1988)

(=*Mesotritia (Entomotritia) piffli* Märkel, 1964)

Distribución: Semicosmopolita: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Neártica: frecuente), Etiópica (Sudáfrica) y Norte de Neotropical.

♠ *Oribotritia* Jacot, 1924

(=*Berndotritia* Mahunka, 1987)

(=*Philotritia* Mahunka, 1988)

(=*Plesiostritia* Walker, 1965)

(=*Tritia* Berlese, 1883, “*nom. praeoc.*” por Risso, 1826)

Especie tipo: (*Hoplophora decumana* Koch “*sensu*” Berlese, 1883) =*Phthiracarus berlesei* Michael, 1898

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• *Oribotritia berlesei* (Michael, 1898)

(*Phthiracarus*)

Distribución: Paleártica (frecuente).

• *Oribotritia hauseri* Mahunka, 1982

Distribución: Grecia.

• *Oribotritia hermanni* Grandjean, 1967

Distribución: Mediterránea.

• *Oribotritia rafalskii* Niedbała, 1997

Distribución: Argelia.

• *Oribotritia schusteri* Niedbała, 2006

Distribución: Europa meridional.

• *Oribotritia serrata* Feider y Suciú, 1958

Distribución: Europa suroriental.

• *Oribotritia storkani* Feider y Suciú, 1957

Distribución: Europa meridional.

• *Oribotritia turcica* Niedbała, 2006

Distribución: Turquía.

♠ *Paratritia* Moritz, 1966

Especie tipo: *Paratritia baloghi* Moritz,

1966

Distribución: Paleártica.

• *Paratritia baloghi* Moritz, 1966

Distribución: Paleártica (Europa centromeridional e Irán).

♠ *Protoribotritia* Jacot, 1938

Especie tipo: *Protoribotritia canadaris* Jacot, 1938

Distribución: Holártica y Etiópica.

• *Protoribotritia oligotricha* Märkel, 1963

Distribución: Holártica (Paleártica occidental y Neártica: menos frecuente en el Sur).

♦ *Euphthiracaridae* Jacot, 1930

Distribución: Cosmopolita.

♠ *Acrotritia* Jacot, 1923

(=*Rhysotritia* Märkel y Meyer, 1959)

Especie tipo: (*Phthiracarus americanus* Ewing, 1909) =*Hoplophora ardua* Koch, 1841

Distribución: Cosmopolita.

*Acrotritia ardua* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)

• *Acrotritia ardua ardua* (Koch, 1841)

(=*Phthiracarus americanus* Ewing, 1909)

(=*Hoplophora arctata* Riley, 1874)

(=*Pseudotritia ardua antetriheterodactylum* Jacot, 1933)

(=*Phthiracarus canestrinii* Michael, 1898)

(=*Phthiracarus pectinatus* Ewing, 1917)

Distribución: Cosmopolita (frecuente).

• *Acrotritia ardua affinis* (Sergienko, 1989)

(*Rhysotritia*)

Distribución: Paleártica (Mediterránea oriental y Oeste de Paleártica oriental).

• *Acrotritia ardua monodactyla* (Niedbała, 2002) (*Rhysotritia m.*)

Distribución: Norte de Neotropical y Mediterránea (Cáucaso y España).

• *Acrotritia clavata* (Märkel, 1964) (*Rhysotritia*)

• *Acrotritia clavata sextiana* (Lions, 1966)

(*Rhysotritia*)

(=*Rhysotritia riezuae* Moreno y Moraza, 1994)

Distribución: Oeste de Europa.

• *Acrotritia closteros* Niedbała, 2006

Distribución: Argelia.

• *Acrotritia duplicata* (Grandjean, 1953)

(*Pseudotritia*)

(=*Rhysotritia duplicata limbata* Märkel y Meyer, 1959)

Distribución: Paleártica (frecuente) y Vietnam.

• *Acrotritia hyeroglyphica* (Berlese, 1916) (*Tritia lentula h.*)

(=*Rhysotritia hauseri* Mahunka, 1991)

(=*Rhysotritia ardua penicillata* Pérez-Íñigo, 1969)

(=*Acrotritia sinensis triheterodactylis* Jacot, 1923)

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica: Somalia, Oriental y Neotropical: Panamá).

• *Acrotritia pirovaci* Niedbała, 2006

Distribución: Croacia.

- ♣ **Euphthiracarus** Ewing, 1917  
(?=*Hummelia* Oudemans, 1916 “gen. inq.”)  
(=*Niedbalaia* Mahunka, 1999)  
(=*Pseudotritia* Willmann, 1919)  
Especie tipo: *Phthiracarus flavus* Ewing, 1908  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Euphthiracarus cribrarius* (Berlese, 1904) (*Phthiracarus*)  
(=*Phthiracarus punctulatus* Berlese, 1913)  
Distribución: Holártica (frecuente).
- *Euphthiracarus excultus* Pérez-Iñigo, 1987  
Distribución: I. Azores.
- *Euphthiracarus monodactylus* (Willmann, 1919) (*Tritia* (*Pseudotritia*))  
(=*Tritia aequipunctata* Berlese, 1923)  
(=*Euphthiracarus mixtus* Mahunka, 1979)  
Distribución: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, y Neártica: excepto Sur) y Nueva Guinea.
- *Euphthiracarus reticulatus* (Berlese, 1913) (*Phthiracarus*)
- *Euphthiracarus reticulatus reticulatus* (Berlese, 1913)  
(=*Pseudotritia intermedia* Feider y Suciú, 1958)  
Distribución: Paleártica meridional.
- *Euphthiracarus reticulatus alpinus* Märkel, 1964  
Distribución: Paleártica (Europa centromeridional y Este de Rusia asiática).
- ♣ **Microtritia** Märkel, 1964  
Especie tipo: *Phthiracarus minimus* Berlese, 1904  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Microtritia minima* (Berlese, 1904) (*Phthiracarus*)  
(=*Tritia* (*Pseudotritia*) *minuta* Willmann, 1919)  
(=*Microtritia xilofila* Subías, 1977)  
Distribución: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, Neártica oriental, Oriental: Vietnam y China suroriental, Australiana: Hawái, y Neotropical: Centroamérica).
- ▲ **Phthiracaroida** Perty, 1841
- ◆ **Phthiracaridae** Perty, 1841  
Distribución: Cosmopolita.
- ♣ **Atropacarus** Ewing, 1917  
(=*Helvetacarus* Mahunka, 1993)  
Especie tipo: *Hoplophora stricula* Koch, 1835  
Distribución: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
- *Atropacarus bichei* Niedbala, 1986  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Atropacarus clavigerus* (Berlese, 1904) (*Hoplophora*)

- (=*Steganacarus serratus* Feider y Suciú, 1957)  
Distribución: Mediterránea.
- *Atropacarus csiszarae* (Balogh y Mahunka, 1979) (*Steganacarus*)  
Distribución: Europa centrooriental.
- *Atropacarus echinodiscus* (Mahunka, 1982) (*Steganacarus*)  
Distribución: Paleártica meridional (Grecia e Irán).
- *Atropacarus immundus* (Niedbala, 1983) (*Steganacarus* (*A.*))  
(=*Steganacarus* (*Atropacarus*) *decepiens* Niedbala, 1983)  
(=*Atropacarus papillatus* Gil-Martín, Subías y Arillo, 1992)  
Distribución: Mediterránea.
- *Atropacarus inculpatus* (Niedbala, 1984) (*Steganacarus* (*A.*))  
Distribución: Ibérica.
- *Atropacarus maculosus* (Niedbala, 1983) (*Steganacarus* (*A.*))  
Distribución: Cáucaso.
- *Atropacarus mirabilis* (Mahunka, 1979) (*Steganacarus*)  
Distribución: Mediterránea.
- *Atropacarus murciensis* Niedbala, 1986  
Distribución: España.
- *Atropacarus obesus* (Niedbala, 1983) (*Steganacarus* (*A.*))  
Distribución: Cáucaso.
- *Atropacarus ochraceus* (Niedbala, 1983) (*Steganacarus* (*A.*))  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental e Irán).
- *Atropacarus parainsularis* Niedbala y Starý, 2011  
Distribución: España.
- *Atropacarus parastriculus* Niedbala y Starý, 2011  
Distribución: España.
- *Atropacarus parvulus* (Niedbala, 1983) (*Steganacarus* (*A.*))  
Distribución: Cáucaso.
- *Atropacarus perversus* (Niedbala, 1983) (*Steganacarus* (*A.*))  
Distribución: Cáucaso.
- *Atropacarus phyllophorus* (Berlese, 1904) (*Hoplophora*)  
(=*Steganacarus ropalus* Feider y Suciú, 1957)  
Distribución: Europa centromeridional y Vietnam.
- *Atropacarus platakisi* (Mahunka, 1979) (*Steganacarus*)  
Distribución: Mediterránea.
- *Atropacarus punctulatus* Moraza, 1985  
Distribución: España.
- *Atropacarus striculus* (Koch, 1835) (*Hoplophora*)  
(=*Steganacarus diaphanus* Jacot, 1930)  
(=*Steganacarus senex* Aoki, 1958)  
(=*Steganacarus trichosus* Mahunka, 1982)  
Distribución: Semicosmopolita (Holártica:

frecuente, Oriental, Méjico y Australiana: Hawai).

- *Atropacarus striculus insularis* (Weigmann, 1976) (*Steganacarus*)

Distribución: I. Azores.

- *Atropacarus substrictus* (Niedbala, 1983) (*Steganacarus* (A.))

Distribución: Cáucaso.

- *Atropacarus wandae* (Niedbala, 1981) (*Steganacarus*) (= *Steganacarus navarrensis* Moraza, 1985)

Distribución: Europa occidental.

♣ ***Hoplophorella*** Berlese, 1923

Especie tipo: *Hoplophorella cucullatum* Ewing, 1909

Distribución: Pantropical y subtropical.

- *Hoplophorella brevipilis* (Balogh, 1958) (*Steganacarus*)

Distribución: África centrooriental y Cáucaso.

- *Hoplophorella hamata* (Ewing, 1909) (*Hoplophorella*) (= *Hoplophorella cochlearia* Pérez-Íñigo y Baggio, 1993)

(= *Hoplophorella cucullata curassensis* Willmann, 1936)

(= *Hoplophorella cucullata floridiae* Jacot, 1933)

(= *Phthiracarus* (*Hoplophorella*) *cucullatus obsoletior* Berlese, 1923)

(= *Hoplophorella cuneiseta* Mahunka, 1988)

(= *Hoplophorella glauca* Hammer, 1972)

(= *Hoplophorella ligulifera* Mahunka, 1987)

(= *Hoplophorella schauenbergi* Mahunka, 1978)

(= *Hoplophorella spatulata* Parry, 1980)

Distribución: Pantropical (frecuente) y subtropical.

- *Hoplophorella vitrina* (Berlese, 1913) (*Hoplophorella*)

(= *Hoplophorella africana* Wallwork, 1967)

(= *Steganacarus andrei* Balogh, 1958)

(= *Hoplophorella lienhardi* Mahunka, 1987)

(= *Hoplophorella raychaudhurii* Subías y Sarkar, 1984)

(= *Hoplophorella scapellata* Aoki, 1965)

Distribución: Pantropical (frecuente).

♣ ***Hoplophthiracarus*** Jacot, 1933

Especie tipo: *Hoplophthiracarus histricinus* Berlese, 1908

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Hoplophthiracarus cazanicus* Feider y Călugăr, 1970

Distribución: Mediterránea (Rumanía e I. Canarias).

- *Hoplophthiracarus histricinus* (Berlese, 1908) (*Hoplophthiracarus*)

(= *Phthiracarus* (*Trachyhoplophora*) *histricinus nitidior* Berlese, 1923)

(= *Hoplophthiracarus minus* Krivolutsky, 1966)

(= *Hoplophthiracarus robustior* Jacot, 1933)

Distribución: Holártica (menos frecuente en

el Norte).

- *Hoplophthiracarus illinoisensis* (Ewing, 1909) (*Hoplophthiracarus*)

(= *Hoplophthiracarus paludis* Jacot, 1938)

(= *Hoplophthiracarus vanderhammeni* Niedbala, 1991)

Distribución: Holártica (frecuente), Oriental (Filipinas) y Norte de Neotropical.

- *Hoplophthiracarus maritimus* (C. y C., jr. Pérez-Íñigo, 1996) (*Calyptophthiracarus*)

Distribución: I. Azores.

♣ ***Notophthiracarus*** Ramsay, 1966

***Notophthiracarus*** (*Calyptophthiracarus*) Aoki, 1980

(= *Hauserophthiracarus* Mahunka, 1982)

(= *Phrathiracarus* Niedbala, 1994)

Especie tipo: *Calyptophthiracarus mitratus* Aoki, 1980

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Notophthiracarus* (*Calyptophthiracarus*) *canariensis* (Pérez-Íñigo y Peña, 1996) (C.)

Distribución: I. Canarias.

- *Notophthiracarus* (*Calyptophthiracarus*) *candidulus* (Niedbala, 1983) (*Hoplophthiracarus*)

Distribución: Cáucaso.

- *Notophthiracarus* (*Calyptophthiracarus*) *costai* (Macfarlane y Sheals, 1965) (*Hoplophthiracarus*)

Distribución: Israel.

- *Notophthiracarus* (*Calyptophthiracarus*) *gomerensis* (Niedbala, 2008)

(*Austrophthiracarus*)

Distribución: I. Canarias.

- *Notophthiracarus* (*Calyptophthiracarus*) *heterotrichus* (Mahunka, 1979) (*Hoplophthiracarus*)

Distribución: Paleártica meridional.

- *Notophthiracarus* (*Calyptophthiracarus*) *meridionalis* (Sergienko, 1992)

(*Hoplophthiracarus*)

Distribución: Mediterránea oriental.

- *Notophthiracarus* (*Calyptophthiracarus*) *oenipontanus* (Mahunka, 1982)

(*Hauserophthiracarus*)

Distribución: Grecia.

*Notophthiracarus* (*Calyptophthiracarus*) *pavidus* (Berlese, 1913) (*Hoplophthiracarus*)

- *Notophthiracarus* (*Calyptophthiracarus*) *pavidus pavidus* (Berlese, 1913)

(= *Hoplophthiracarus cretensis* Mahunka, 1979)

Distribución: Paleártica meridional.

- *Notophthiracarus* (*Calyptophthiracarus*) *pavidus vicinus* (Niedbala, 1984)

(*Hoplophthiracarus* v.)

Distribución: Cáucaso.

♣ ***Phthiracarus*** Perty, 1841

Especie tipo: (*Phthiracarus contractilis* Perty, 1841) = *Hoplophthiracarus laevigata* Koch, 1841

***Phthiracarus*** (***Phthiracarus***) Perty, 1841

(= *Ginglymacarus* Ewing, 1917)

(= *Hoplophthiracarus* Michael, 1898)

(=*Hoplophora* Koch, 1835, “*nom. praeoc.*” por Germar, 1833)

(=*Peridromotritia* Jacot, 1923)

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• *Phthiracarus (P.) affinis* (Hull, 1914) (*Hoploderma*)

Distribución: Europa occidental.

*Phthiracarus (P.) boresetosus* Jacot, 1930

• *Phthiracarus (P.) boresetosus boresetosus* Jacot, 1930

(=*Phthiracarus dudichi* Mahunka, 1982)

(=*Phthiracarus kaszabi* Mahunka, 1981)

(=*Phthiracarus minimarginatus* Woolley, 1954)

(=*Phthiracarus tenuis* Hammer, 1977)

Distribución: Holártica (frecuente en Neártica), Neotropical e India (Cachemira).

• *Phthiracarus (P.) boresetosus propinquus* Niedbala, 1983 (*P. p.*)

Distribución: Paleártica (Mediterránea oriental y Asia centroccidental).

• *Phthiracarus (P.) compressus* Jacot, 1930

(=*Phthiracarus commutabilis* Niedbala, 1983)

(=*Phthiracarus pallidus* Feider y Suciú, 1958)

Distribución: Holártica.

• *Phthiracarus (P.) crenophilus* Willmann, 1951

Distribución: Europa central.

• *Phthiracarus (P.) crinitus* (Koch, 1841)

(*Hoplophora*)

Distribución: Europa centromeridional.

• *Phthiracarus (P.) dubinini* Feider y Suciú, 1958

Distribución: Europa suroriental.

• *Phthiracarus (P.) ferrugineus* (Koch, 1841)

(*Hoplophora*)

(=*Phthiracarus juvenalis* Parry, 1979)

(=*Phthiracarus paraligneus* Iturrondobeitia y Saloña, 1989)

(=*Phthiracarus sellnicki* Feider y Suciú, 1957)

Distribución: Paleártica occidental.

• *Phthiracarus (P.) incredibilis* Niedbala, 1983

Distribución: Paleártica meridional (Cáucaso e Irán).

• *Phthiracarus (P.) italicus* (Oudemans, 1900)

(*Hoploderma*)

Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Michigan).

• *Phthiracarus (P.) jacoti* Feider y Suciú, 1958

Distribución: Europa suroriental.

• *Phthiracarus (P.) koumantanosi* Niedbala, 1983

Distribución: Grecia.

• *Phthiracarus (P.) laevigatus* (Koch, 1841)

(*Hoplophora*)

(=*Phthiracarus contractilis* Perty, 1841)

(=*Hoplophora nitens* Nicolet, 1855)

(=*Phthiracarus roubali* Berlese, 1923)

Distribución: Paleártica (menos frecuente en el Norte), Perú e I. Santa Helena.

• *Phthiracarus (P.) lautus* Niedbala, 1981

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Phthiracarus (P.) lentulus* (Koch, 1841)

(*Hoplophora*)

(=*Phthiracarus angolensis* Mahunka, 1985)

(=*Phthiracarus conformis* Sergienko, 1987)

(=*Phthiracarus incertus* Niedbala, 1983)

(=*Phthiracarus rotundus* Berlese, 1923, “*nom. praeoc.*” por Ewing, 1908)

Distribución: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Neártica) y Angola.

• *Phthiracarus (P.) longulus* (Koch, 1841)

(*Hoplophora*)

(=*Phthiracarus apiculatus* Jacot, 1939)

(=*Phthiracarus flexisetosus* Parry, 1979)

(=*Phthiracarus hortobagyensis* Mahunka, 1982)

(=*Phthiracarus montium* Jacot, 1937)

(=*Phthiracarus mundus* Niedbala, 1983)

(=*Phthiracarus prior* Jacot, 1933)

(=*Phthiracarus setosellus* Jacot, 1929)

(=*Phthiracarus tardus* Forsslund, 1943)

Distribución: Holártica.

• *Phthiracarus (P.) membranifer* Parry, 1979

Distribución: Paleártica (Paleártica occidental y Corea) y Ceilán [Sri Lanka].

• *Phthiracarus (P.) serrulatus* Parry, 1979

Distribución: Europa occidental.

• *Phthiracarus (P.) sphaerulus* (Banks, 1895)

(*Hoplophora*)

Distribución: Holártica.

• *Phthiracarus (P.) subdulus* Niedbala, 1983

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Phthiracarus (P.) testudineus* (Koch, 1841)

(*Hoplophora*) “*sp. inq.*”

Distribución: Europa central.

• *Phthiracarus (P.) tristis* Mahunka y Paoletti, 1984

Distribución: Italia.

***Phthiracarus (Archiphthiracarus)*** Balogh y Mahunka, 1979

(=***Archiphthiracarella*** Mahunka, 1996)

(=***Microphthiracarus*** Mahunka, 1982)

(=***Paraphthiracarus*** Aoki, 1980)

Especie tipo: *Archiphthiracarus variabilis* Balogh y Mahunka, 1979

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• *Phthiracarus (Archiphthiracarus) aegypticus* (Al-Assiuty, Bayoumi, Abdel-Hamid y El-Deeb, 1984) (*A.*)

Distribución: Egipto.

• *Phthiracarus (Archiphthiracarus) anonymus* Grandjean, 1933 (*P.*)

(=*Phthiracarus anonymus amicus* Jacot, 1938)

(=*Archiphthiracarus hauseri* Mahunka, 1988)

(=*Archiphthiracarus pocsii* Mahunka, 1983)

Distribución: Pantropical y subtropical.

• *Phthiracarus (Archiphthiracarus) atlanticus*

(Pérez-Iñigo, 1987) (*A.*)

Distribución: I. Azores.

• *Phthiracarus (Archiphthiracarus) baloghi* Feider y Suciú, 1957 (*P.*)

Distribución: Europa meridional.

• *Phthiracarus (Archiphthiracarus) borealis*

(Trägårdh, 1910) (*Hoploderma*)

Distribución: Holártica (menos frecuente en el Sur).

• *Phthiracarus (Archiphthiracarus) bryobius* Jacot, 1930 (*P. setosellum b.*)



- (=*Phthiracarus crinitosimilis* Willmann, 1939)  
 (= *Archiphthiracarus gobiensis* Mahunka, 1981)  
 (= *Archiphthiracarus hungaricus* Balogh y Mahunka, 1979)  
 (= *Phthiracarus lanatus* Feider y Suciú, 1957)  
 (= *Archiphthiracarus pilosus* Sergienko, 1987)  
 Distribución: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Neártica: excepto Sureste).  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) cadizi* Niedbala, 1986 (P.)  
 Distribución: España.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) clavatus* Parry, 1979 (P.)  
 Distribución: Holártica (Paleártica occidental y Canadá).  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) clemens* Aoki, 1963 (P.)  
 (= *Phthiracarus clemens kyushuensis* Aoki, 1980)  
 Distribución: Paleártica oriental (excepto Norte), Cáucaso y Norte de Oriental.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) crassus* Niedbala, 1983 (P.)  
 Distribución: Cáucaso.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) dissonus* Niedbala, 1983 (P.)  
 Distribución: Cáucaso.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) dominiaki* Niedbala, 1984 (P.)  
 Distribución: Turquía.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) duplex* Mahunka y Mahunka-Papp, 2010 (P.)  
 Distribución: Grecia.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) eupalineus* Mahunka, 2001  
 Distribución: Grecia.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) falciformis* Morell y Subías, 1991  
 Distribución: Mediterránea occidental.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) furvus* Niedbala, 1983 (P.)  
 Distribución: Mediterránea oriental.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) globosus* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)  
 (= *Phthiracarus globus* Parry, 1979)  
 (= *Phthiracarus mediocris* Niedbala, 1984)  
 (= *Phthiracarus rotundus* Ewing, 1908)  
 (= *Phthiracarus subglobosus* Berlese, 1923)  
 Distribución: Holártica (frecuente) y Borneo.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) inornatus* Niedbala, 1984 (P.)  
 Distribución: Turquía.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) ligneus* Willmann, 1931 (P.)  
 Distribución: Holártica.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) liparus* Niedbala, 1984 (P.)  
 Distribución: Mediterránea (Turquía y Argelia).  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) montanus* Pérez-Íñigo, 1969 (P.)  
 (= *Phthiracarus assimilis* Niedbala, 1983)  
 (= *Phthiracarus murphyi* Harding, 1976)  
 (= *Phthiracarus rectisetosus* Parry, 1979)  
 (= *Archiphthiracarus tzanoudakisi* Mahunka, 1979)  
 Distribución: Paleártica occidental.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) parobotrichus* (Feider y Suciú, 1957) (P.)  
 Distribución: Mediterránea.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) parainusitatus* (Niedbala y Starý, 2011) (*Austrophthiracarus*)  
 Distribución: España.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) peristomaticus* Willmann, 1951 (P.)  
 (= *Archiphthiracarus hammeni* Balogh y Mahunka, 1979)  
 (= *Archiphthiracarus variabilis* Balogh y Mahunka, 1979)  
 Distribución: Paleártica occidental (excepto Norte).  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) piger* (Scopoli, 1763) (*Acarus*)  
 (= *Hoplophora lucida* Koch, 1841)  
 Distribución: Holártica (frecuente en Paleártica).  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) robertsi* Sheals, 1965 (P.)  
 Distribución: Cáucaso, Nepal e India (Bengala Occidental).  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) sanvicensis* Subías y Gil-Martín, 1990 (P.)  
 Distribución: Portugal.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) schusteri* Niedbala, 2008 (P.)  
 Distribución: Turquía.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) scitus* Niedbala, 1983 (P.)  
 Distribución: Cáucaso.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) stramineus* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)  
 (= *Phthiracarus malagensis* Niedbala, 1986)  
 (= *Phthiracarus opacus* Niedbala, 1986)  
 (= *Phthiracarus wallworki* Niedbala, 1984)  
 Distribución: Holártica (Paleártica y Noreste de U.S.A.) e I. Santa Helena.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) subiasi* Niedbala, 1986 (P.)  
 Distribución: España.  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) torosus* Willmann, 1939 (P.)  
 Distribución: Macaronésica (Madeira).  
 • *Phthiracarus (Archiphthiracarus) totus* Niedbala, 2003 (P.)  
 Distribución: Neotropical (Costa Rica y Brasil) y Cáucaso.  
 ♠ *Rhacaplacarus* Niedbala, 1986  
 (= *Plonaphacarus* Niedbala, 1986)  
 Especie tipo: *Hoplophorella amoena* Niedbala, 1983  
 Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).  
 • *Rhacaplacarus contrarius* (Niedbala, 1984)

*(Hoplophthiracarus)*

Distribución: Iraq.

- *Rhacaplacarus ortizi* (Pérez-Íñigo, 1970)

*(Steganacarus)*

Distribución: Europa occidental.

♣ *Steganacarus* Ewing, 1917Especie tipo: *Hoplophora anomala* Berlese, 1883*Steganacarus (Steganacarus)* Ewing, 1917  
(=*Trachyhoplophora* Berlese, 1923)

Distribución: Cosmopolita (excepto Oriental y Antártica).

- *Steganacarus (S.) applicatus* (Sellnick, 1920) (*Phthiracarus*)

(=*Phthiracarus berlessei* Oudemans, 1915)(=*Hoplophora quadriseriata* Haupt, 1882)

Distribución: Paleártica occidental.

- *Steganacarus (S.) carlosi* Niedbala, 1984

Distribución: I. Canarias.

- *Steganacarus (S.) carusoi* Bernini y Avanzati, 1989

(=?*Steganacarus applicatus crassisetosus* Willmann, 1939 “*sp. inq.*”)

Distribución: Mediterránea occidental.

- *Steganacarus (S.) donatoi* Avanzati, Baratti y Bernini, 1994

Distribución: Italia.

- *Steganacarus (S.) flagellatissimus* Mahunka, 1979

Distribución: Mediterránea oriental.

- *Steganacarus (S.) guanarteme* Pérez-Íñigo y Peña, 1996

Distribución: I. Canarias.

- *Steganacarus (S.) herculeanus* Willmann, 1953  
(=*Steganacarus longisetosus* Moraza, 1985)

Distribución: Europa centrooccidental.

*Steganacarus (S.) hirsutus* Pérez-Íñigo, 1974

- *Steganacarus (S.) hirsutus hirsutus* Pérez-Íñigo, 1974

(=*Steganacarus perezinigo* Balogh y Mahunka, 1979)

Distribución: Mediterránea occidental.

- *Steganacarus (S.) hirsutus azorensis* Pérez-Íñigo, 1992

Distribución: I. Azores.

- *Steganacarus (S.) incognitus* Niedbala, 1984

Distribución: España.

- *Steganacarus (S.) incomptus* Niedbala, 1983

Distribución: Cáucaso.

- *Steganacarus (S.) insulanus* C. y C., jr. Pérez-Íñigo, 1996

Distribución: I. Azores.

*Steganacarus (S.) magnus* (Nicolet, 1855)  
(*Hoplophora*)

- *Steganacarus (S.) magnus magnus* (Nicolet, 1855) (*Hoplophora*)

(=*Phthiracarus magnus oblongus* Oudemans, 1915)(=*Phthiracarus magnus rotundus* Oudemans, 1915)(=*Phthiracarus magnus transitans* Oudemans, 1915)

Distribución: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, y U.S.A.) e I. Santa Helena.

- *Steganacarus (S.) magnus anomalus* (Berlese, 1883) (*Hoplophora a.*)

(=*Steganacarus karamani* Tarman, 1962)(=*Phthiracarus magnus anomaloides* Oudemans, 1915)

Distribución: Paleártica (excepto este).

- *Steganacarus (S.) manganellii* Avanzati, Baratti y Bernini, 1994

Distribución: Italia.

- *Steganacarus (S.) michaeli* Bernini y Avanzati, 1987

Distribución: Europa occidental.

- *Steganacarus (S.) similis* Willmann, 1939

Distribución: Macaronésica (Madeira).

- *Steganacarus (S.) simonettae* Bernini y Avanzati, 1987

Distribución: Mediterránea occidental.

*Steganacarus (S.) spinosus* (Sellnick, 1920)(=*Phthiracarus*)

- *Steganacarus (S.) spinosus spinosus* (Sellnick, 1920)

(=*Steganacarus barborae* Mahunka y Miko, 1989)

Distribución: Europea e Irán.

- *Steganacarus (S.) spinosus personatus* Niedbala, 1983 (*S. p.*)

(=*Steganacarus punctulatus* Sergienko, 1985)

Distribución: Mediterránea oriental.

- *Steganacarus (S.) tenerifensis* Pérez-Íñigo, 1972

Distribución: I. Canarias.

- *Steganacarus (S.) travei* Lions, 1968

Distribución: Mediterránea occidental.

- *Steganacarus (S.) vernaculus* Niedbala, 1982

Distribución: Europa centromeridional.

*Steganacarus (Tropacarus)* Ewing, 1917(=*Calhoplophora* Berlese, 1923)Especie tipo: *Hoplophora carinata* Koch, 1841

Distribución: Paleártica.

- *Steganacarus (Tropacarus) balcanicus* Bernini y Avanzati, 1989

Distribución: Grecia.

- *Steganacarus (Tropacarus) balearicus* Pérez-Íñigo, 1969 (*S.*)

Distribución: Mediterránea occidental.

- *Steganacarus (Tropacarus) bicarinatus* (Jeleva, 1970) (*T.*)

Distribución: Bulgaria.

- *Steganacarus (Tropacarus) boulfekhari* Niedbala, 1986 (*S.*)

Distribución: Argelia.

- *Steganacarus (Tropacarus) brevopilus* (Berlese, 1923) (*Phthiracarus (Trachyhoplophora)*)

(=*Hoploderma brevopilus perfecta* Sellnick, 1931)

Distribución: Paleártica occidental (excepto Norte).

- *Steganacarus (Tropacarus) callainii* Bernini, S. Bernini y Avanzati, 1989

Distribución: Mediterránea.

*Steganacarus (Tropacarus) carinatus* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)

• *Steganacarus (Tropacarus) carinatus carinatus* (Koch, 1841)

Distribución: Paleártica (menos frecuente en el Norte) e India (Cachemira).

• *Steganacarus (Tropacarus) carinatus pulcherrimus* (Berlese, 1887) (*Hoplophora p.*)

Distribución: Paleártica meridional.

• *Steganacarus (Tropacarus) coniunctus* Niedbala, 1983 (*S.*) (= *Steganacarus danae* Mahunka y Miko, 1989)

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Steganacarus (Tropacarus) desmeti* Niedbala, 1988 (*S.*)

(= *Steganacarus (Tropacarus) altitudinis* Bernini, S. Bernini y Avanzati, 1989)

Distribución: Mediterránea occidental.

• *Steganacarus (Tropacarus) doumandji* Niedbala, 1986 (*S.*)

Distribución: Mediterránea occidental.

• *Steganacarus (Tropacarus) excavatus* (Niedbala, 1981) (*T.*)

Distribución: Turquía.

• *Steganacarus (Tropacarus) grandjeani* Mahunka, 1977 (*S.*)

(= *Steganacarus sacculiferus* Parry, 1978)

Distribución: Israel.

• *Steganacarus (Tropacarus) lasithiensis* Mahunka, 1979 (*S.*)

Distribución: Mediterránea.

• *Steganacarus (Tropacarus) lucidus* Sergienko, 1994 (*S.*)

Distribución: Mediterránea.

• *Steganacarus (Tropacarus) maghrebinus* Bernini, S. Bernini y Avanzati, 1989

Distribución: Argelia.

• *Steganacarus (Tropacarus) malatestai* Avanzati, Baratti y Bernini, 1994

Distribución: Italia.

• *Steganacarus (Tropacarus) patruelis* Niedbala, 1983 (*S.*)

(= *Steganacarus lazitanicus* Mahunka y Miko, 1989)

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Steganacarus (Tropacarus) pseudocarinatus* Bernini y Avanzati, 1989

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia central rusa).

Suborden HOLOSOMATA Grandjean, 1960

### ▲ **Crotonioidea** Thorell, 1876

#### ◆ **Trhypochthoniidae** Willmann, 1931

Distribución: Cosmopolita.

#### ♠ **Mainothrus** Choi, 1996

(= **Altrhypochthonius** Weigmann, 1997)

Especie tipo: *Mainothrus aquaticus* Choi, 1996

Distribución: Holártica y Neotropical austral.

#### • **Mainothrus badius** (Berlese, 1905)

(**Trhypochthonius**)

Distribución: Holártica (menos frecuente en el Sur).

#### ♠ **Mucronothrus** Trägårdh, 1931

Especie tipo: (*Mucronothrus rostratus* Trägårdh, 1931) = *Malaconothrus nasalis* Willmann, 1929

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Australiana y Neotropical).

• **Mucronothrus nasalis** (Willmann, 1929) (*Malaconothrus*)

(= *Mucronothrus rostratus* Trägårdh, 1931)

Distribución: Semicosmopolita (Boreoalpina: frecuente, Australiana y Neotropical).

#### ♠ **Trhypochthoniellus** Willmann, 1928

(= **Hydronothrus** Aoki, 1964)

Especie tipo: *Trhypochthonius (Trhypochthoniellus) setosus* Willmann, 1928

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• **Trhypochthoniellus longisetus** (Berlese, 1904) (**Trhypochthonius**)

(= *Hydronothrus aquariorum* Fain y Lambrechts, 1987)

(= *Nothrus crassus* Warburton y Pearce, 1905)

(= *Hydronothrus crispus* Aoki, 1964)

(= *Camisia excavata* Willmann, 1919)

(= *Hydronothrus puniceus* Habeeb, 1981)

(= *Trhypochthonius trichosus* Schweizer, 1922)

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica: I. Santa Helena y Madagascar, Australiana y Neotropical).

#### ♠ **Trhypochthonius** Berlese, 1904

(= **Albonothrus** Tseng, 1982)

(= **Trilohmannia** Willmann, 1919)

(= **Tumidalvus** Ewing, 1908)

Especie tipo: *Hypochthonius tectorum* Berlese, 1896

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• **Trhypochthonius cladonicola** (Willmann, 1919) (*Camisia*)

Distribución: Paleártica (menos frecuente en el Sur) y Canadá.

• **Trhypochthonius conspectus** Sergienko, 1991

Distribución: Mediterránea oriental.

• **Trhypochthonius nigricans** Willmann, 1928 (= *Trhypochthonius sphagnicola* Weigmann, 1997)

Distribución: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Sur y Neártica septentrional).

• **Trhypochthonius setantis** Golosova, 1983

Distribución: Cáucaso y Paleártica oriental meridional.

*Trhypochthonius tectorum* (Berlese, 1896)

(*Hypochthonius*)

• **Trhypochthonius tectorum tectorum** (Berlese, 1896)

- (=*Trhypochthonius monodactylus* Mihelčič, 1957)  
 (= *Tumidulvus mutsalpina* Kishida, 1931)  
 Distribución: Holártica (frecuente), Oriental (China suroriental y Sikkim) y Perú.  
 • *Trhypochthonius tectorum congregator* Grandjean, 1940  
 Distribución: Europa meridional.  
 • *Trhypochthonius tectorum spinosus* Kulijev, 1968  
 Distribución: Cáucaso.

◆ **Malaconothridae** Berlese, 1916  
 Distribución: Cosmopolita.

- ♣ ***Malaconothrus*** Berlese, 1904  
 Especie tipo: *Nothrus monodactylus* Michael, 1888  
***Malaconothrus (Malaconothrus)*** Berlese, 1904  
 Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).  
 • *Malaconothrus (M.) globiger* Trägårdh, 1910  
 Distribución: Paleártica occidental (excepto Suroeste).  
 • *Malaconothrus (M.) monodactylus* (Michael, 1888) (*Nothrus*)  
 (= *Lohmannia (Malaconothrus) egregia* Berlese, 1904)  
 (= *Malaconothrus gracilis* Hammen, 1952)  
 (= *Malaconothrus mollisetosus* Hammer, 1952)  
 (= *Malaconothrus pulcher* Mihelčič, 1957)  
 (= *Malaconothrus punctulatus* Hammen, 1952)  
 Distribución: Holártica (frecuente) y Neotropical.  
 • *Malaconothrus (M.) processus* Hammen, 1952  
 Distribución: Europa centromeridional.  
 • *Malaconothrus (M.) pygmaeus* Aoki, 1969  
 Distribución: Holártica: Paleártica (excepto Norte) y Canadá, y China suroriental.  
***Malaconothrus (Cristonothrus)*** Subías, 2004  
 Especie tipo: *Malaconothrus pauciareolatus* Subías y Sarkar, 1982  
 Distribución: Cosmopolita (excepto Boreal).  
 • *Malaconothrus (Cristonothrus) ramensis* Hammer, 1966 (*M.*)  
 Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea y Paquistán).

- ♣ ***Trimalaconothrus*** Berlese, 1916  
 Especie tipo: *Malaconothrus (Trimalaconothrus) indusiatus* Berlese, 1916  
***Trimalaconothrus (Trimalaconothrus)*** Berlese, 1916  
 (= *Zeanothrus* Hammer, 1966)  
 Distribución: Cosmopolita.  
 • *Trimalaconothrus (T.) foveolatus* Willmann, 1931  
 Distribución: Holártica septentrional (Europa: menos frecuente en el Sur, Paquistán y Neártica septentrional).  
 • *Trimalaconothrus (T.) indusiatus* (Berlese, 1916) (*Malaconothrus (T.)*)  
 Distribución: Europea.

- *Trimalaconothrus (T.) tardus* (Michael, 1888) (*Nothrus*)  
 Distribución: Paleártica (excepto Norte) y Neártica (U.S.A.: Carolina del Norte, y Canadá).  
 • *Trimalaconothrus (T.) vietsi* Willmann, 1925  
 Distribución: Paleártica occidental (Euroatlántica y Cáucaso).  
***Trimalaconothrus (Tyrphonothrus)*** Knülle, 1957  
 (= *Fossonothrus* Hammer, 1962)  
 Especie tipo: (*Malaconothrus novus* Sellnick, 1921) = *Malaconothrus maior* Berlese, 1910  
 Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).  
 • *Trimalaconothrus (Tyrphonothrus) buresi* Kunst, 1959 (*Trim.*)  
 Distribución: Europa meridional.  
 • *Trimalaconothrus (Tyrphonothrus) glaber* (Michael, 1898) (*Nothrus*)  
 Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.).  
 • *Trimalaconothrus (Tyrphonothrus) maior* (Berlese, 1910) (*Malaconothrus*) (= *Trimalaconothrus intermedius* Cooreman, 1941)  
 (= *Malaconothrus novus* Sellnick, 1921)  
 (= *Malaconothrus sphagnicola* Trägårdh, 1910)  
 Distribución: Semicosmopolita (Holártica: frecuente en Paleártica occidental, Neotropical, I. Santa Helena y Nueva Zelanda).  
 • *Trimalaconothrus (Tyrphonothrus) saxosus* Knülle, 1957 (*Trim.*)  
 (? = *Malaconothrus optatus* Berlese, 1908 “*sp. inq.*”)  
 Distribución: Paleártica (Europa meridional y Este de Rusia asiática).

◆ **Nothridae** Berlese, 1896  
 Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

- ♣ ***Nothrus*** Koch, 1836  
 (= *Angelina* Berlese, 1885)  
 (= *Gymnonothrus* Ewing, 1917)  
 (= *Vigilomicrozetes* Tseng, 1982)  
 Especie tipo: *Nothrus palustris* Koch, 1839  
 Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica)  
 • *Nothrus anauniensis* Canestrini y Fanzago, 1876  
 (= *Nothrus pseudoborussicus* Mahunka 1978)  
 Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica): frecuente en Paleártica.  
 • *Nothrus borussicus* Sellnick, 1928  
 Distribución: Holártica (frecuente en Paleártica).  
 • *Nothrus longipilus* (Berlese, 1910) (*Angelina anauniensis* l.)  
 Distribución: Europa centromeridional.  
 • *Nothrus macedi* Beck, 1962  
 Distribución: Neotropical (Perú y Argentina) y Paleártica occidental (Cáucaso).

*Nothrus palustris* Koch, 1839

• *Nothrus palustris palustris* Koch, 1839

(=*Nothrus pallens* Koch, 1844)

Distribución: Holártica (frecuente en Paleártica) e I. Santa Helena.

• *Nothrus palustris azorensis* Pérez-Íñigo, 1987

Distribución: I. Azores.

• *Nothrus perezinigo* Mahunka, 1980

Distribución: Holártica (Europa centoccidental y U.S.A.: Carolina del Norte).

• *Nothrus pratensis* Sellnick, 1928

Distribución: Holártica (menos frecuente en el Sur).

• *Nothrus pulchellus* (Berlese, 1910) (*Angelia*)

(=*Nothrus parvus* Sitnikova, 1975)

Distribución: Paleártica: Europa centromeridional y Paleártica oriental.

• *Nothrus silvestris* Nicolet, 1855

Distribución: Holártica (frecuente) y Nueva Zelanda.

◆ **Crotoniidae** Thorell, 1876

Distribución: Cosmopolita.

♠ **Camisia** Heyden, 1826

Especie tipo: *Notaspis segnis* Hermann, 1804

**Camisia** (**Camisia**) Heyden, 1826

(=*Uronothrus* Berlese, 1913)

Distribución: Cosmopolita.

• *Camisia* (*C.*) *biurus* (Koch, 1839) (*Nothrus*)

(=*Camisia exuvialis* Grandjean, 1939)

(=*Nothrus furcatus* Koch, 1844)

(=*Uronothrus kochi* Willmann, 1943)

(=*Nothrus pigerrimus* Koch, 1844)

Distribución: Holártica y China suroriental.

• *Camisia* (*C.*) *biverrucata* (Koch, 1839)

(*Nothrus*)

(?=*Acarus scaber* Linnaeus, 1758 “*sp. inq.*”)

(=*Camisia berlesei* Oudemans, 1900)

(=*Camisia fischeri* Oudemans, 1900)

(=*Camisia nicoleti* Oudemans, 1900)

Distribución: Holártica (frecuente en Paleártica).

• *Camisia* (*C.*) *borealis* (Thorell, 1871) (*Nothrus*)

Distribución: Boreoalpina (Eurosiberiana, Cáucaso y Groenlandia).

• *Camisia* (*C.*) *horrida* (Hermann, 1804)

(*Notaspis*)

(=*Nothrus bistratus* Koch, 1839)

(=*Nothrus mutilus* Koch, 1839)

(=*Nothrus rugulosus* Banks, 1895)

(=*Nothrus runcinatus* Koch, 1839)

(=*Nothrus sinuatus* Koch, 1839)

Distribución: Holártica (frecuente), Norte de Oriental, y Centroamérica.

• *Camisia* (*C.*) *invenusta* (Michael, 1888)

(*Nothrus*)

Distribución: Paleártica.

• *Camisia* (*C.*) *segnis* (Hermann, 1804)

(*Notaspis*)

(=*Nothrus bicarinatus* Koch, 1839)

(=*Nothrus excisus* Banks, 1895)

(=*Nothrus rostratus* Koch, 1839)

(=*Camisia segnis segnoides* André, Lebrun y

Leroy, 1984)

(=*Nothrus ventricosus* Koch, 1844)

Distribución: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Oriental, y Antártica).

• *Camisia* (*C.*) *spinifer* (Koch, 1835) (*Nothrus*)

(=*Nothrus ansatus* Haupt, 1882)

(=*Nothrus concavus* Haupt, 1882)

(=*Nothrus echinatus* Koch, 1835)

(=*Nothrus quadracanthus* Haupt, 1882)

(=*Nothrus sordidus* Koch, 1839)

(=*Nothrus superbus* Berlese, 1910)

(=*Nothrus taurinus* Banks, 1906)

Distribución: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Norte de Oriental y Neotropical: Brasil y Panamá).

• *Camisia* (*C.*) *zangherii* Lombardini, 1963 “*sp. inq.*”

Distribución: Italia.

**Camisia** (**Ensicamisia**) Kunst, 1971

(=*Ivarsia* Karppinen y Krivolutsky, 1987)

Especie tipo: *Nothrus lapponicus* Trägårdh, 1910

Distribución: Holártica y Oriental.

• *Camisia* (**Ensicamisia**) *lapponica* (Trägårdh, 1910) (*Nothrus*)

(=*Camisia labradorica* Behan-Pelletier, 1978)

Distribución: Boreoalpina.

• *Camisia* (**Ensicamisia**) *solhoeyi* Colloff, 1993

(*C.*)

(=*Camisia islandica* Gjelstrup y Solhøy, 1994)

Distribución: Holártica (menos frecuente en el Sur) y China suroriental.

♠ **Heminothrus** Berlese, 1913

Especie tipo: *Nothrus targionii* Berlese, 1885

**Heminothrus** (**Heminothrus**) Berlese, 1913

(=*Paulonothrus* Kunst, 1971)

Distribución: Cosmopolita (excepto Neotropical y Antártica).

• *Heminothrus* (*H.*) *longisetosus* Willmann, 1925

(*H. paolianus* l.)

Distribución: Holártica (frecuente en Norte) y Taiwan [Formosa].

• *Heminothrus* (*H.*) *oromii* Morell y Subías, 1991

Distribución: I. Azores.

• *Heminothrus* (*H.*) *paolianus* (Berlese, 1913)

(*Nothrus* (*H.*))

Distribución: Holártica (Europa, Asia central, U.S.A.: Michigan, y Groenlandia).

• *Heminothrus* (*H.*) *targionii* (Berlese, 1885)

(*Nothrus*)

(=*Nothrus* (*Heminothrus*) *princeps* Berlese, 1916)

Distribución: Holártica (frecuente en Paleártica), China suroriental y Panamá.

**Heminothrus** (**Capillonothrus**) Kunst, 1971

(=*Ovonothrus* Kunst, 1971)

(=*Paracamisia* Olszanowski y Norton, 2002)

Especie tipo: *Angelia thori* Berlese, 1904

Distribución: Holártica, Oriental y

Neotropical.

• *Heminothrus (Capillonothrus) capillatus* (Berlese, 1914) (*Angelia*) (= *Platynothis capillatus septentrionalis* Sellnick, 1944)

(= *Platynothis maior* Willmann, 1956)  
Distribución: Holártica (Paleártica, U.S.A.: California, y Groenlandia).

• *Heminothrus (Capillonothrus) nevadensis* (Pérez-Iñigo, 1969) (*Platynothis*)

Distribución: España y Corea.

• *Heminothrus (Capillonothrus) thori* (Berlese, 1904) (*Angelia*)

(= *Nothrus crinitus* Warburton y Pearce, 1905)

Distribución: Holártica (Paleártica:

frecuente, y Neártica: menos frecuente en el Sur) y Oriental (China suroriental e India: Sikkim).

***Heminothrus (Platynothis)* Berlese, 1913**

(= *Neonothrus* Forsslund, 1955)

(= *Sigmonothrus* Chakrabarti y Kundu, 1978)

Especie tipo: *Nothrus peltifer* Koch, 1839

Distribución: Cosmopolita.

• *Heminothrus (Platynothis) humicola* (Forsslund, 1955) (*Neonothrus*)

Distribución: Boreoalpina.

• *Heminothrus (Platynothis) peltifer* (Koch, 1839) (*Nothrus*)

(= *Heminothrus abchasicus* Tarba, 1990)

(= *Nothrus bicristatus* Haupt, 1882)

(= *Nothrus cirrosus* Canestini y Fanzago, 1876)

(= *Platynothis grandjeani* Sitnikova, 1975)

(?= *Acarus infusionum* Schrank, 1803 “*sp. inq.*”)

(= *Nothrus palliatus* Koch, 1839)

(= *Nothrus spirofilus* Haupt, 1882)

Distribución: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Norte de Oriental, Australiana: Nueva Zelanda, Norte de Neotropical e Isla Santa Helena).

• *Heminothrus (Platynothis) punctatus*

(L. Koch, 1879) (*Nothrus*)

(= *Hermannia carinata* Kramer, 1897)

(= *Heminothrus valentianus* Hull, 1916)

Distribución: Boreoalpina.

▲ **Nanhermannioidea** Sellnick, 1928

◆ **Nanhermanniidae** Sellnick, 1928

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

♣ ***Bicyrthermannia*** Hammer, 1979

Especie tipo: *Bicyrthermannia duodentata* Hammer, 1979

Distribución: Pantropical (excepto Australiana).

• *Bicyrthermannia ezzati* (Bayoumi y Mahunka, 1977) (*Cyrthermannia*)

Distribución: Egipto.

♣ ***Cyrthermannia*** Balogh, 1958

(= *Linothis* Tseng, 1982)

Especie tipo: *Cyrthermannia tuberculata* Balogh, 1958

Distribución: Pantropical y subtropical.

• *Cyrthermannia tuberculata* Balogh, 1958

Distribución: Congo, Egipto y Java.

♣ ***Masthermannia*** Berlese, 1913

(= *Phyllothis* Sellnick, 1959)

(= *Posthermannia* Grandjean, 1954)

Especie tipo: *Angelia mammillaris* Berlese, 1904

Distribución: Pantropical y subtropical.

• *Masthermannia mammillaris* (Berlese, 1904) (*Angelia*)

(= *Posthermannia nematophora* Grandjean, 1954)

Distribución: Pantropical y subtropical.

♣ ***Nanhermannia*** Berlese, 1913

Especie tipo: *Nothrus nanus* Nicolet, 1855

***Nanhermannia (Nanhermannia)*** Berlese, 1913

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• *Nanhermannia (N.) comitalis* Berlese, 1916

(= *Nanhermannia ussurica* Golosova, 1969)

Distribución: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Noreste de U.S.A.).

• *Nanhermannia (N.) dorsalis* (Banks, 1896) (*Carabodes*)

(= *Nanhermannia coronata* Berlese, 1913)

(= *Nanhermannia hiemalis* Fujikawa, 2003)

Distribución: Holártica y Neotropical.

• *Nanhermannia (N.) elegantula* Berlese, 1913

(= *Nanhermannia areolata* Strenzke, 1953)

Distribución: Holártica e I. Santa Helena.

• *Nanhermannia (N.) komareki* Kunst, 1956

Distribución: Europa centrooriental.

• *Nanhermannia (N.) nana* (Nicolet, 1855) (*Nothrus*)

Distribución: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Neotropical, Norte de Oriental, Nueva Zelanda, I. Santa Helena y Antártica).

• *Nanhermannia (N.) pectinata* Strenzke, 1953

Distribución: Paleártica centromeridional.

• *Nanhermannia (N.) sellnicki* Forsslund, 1958

Distribución: Paleártica (Eurosiberiana, Cáucaso y China: Tíbet).

***Nanhermannia (Nippohermannia)*** P. Balogh, 1985

Especie tipo: *Nanhermannia parallela* Aoki, 1961

Distribución: Paleártica meridional y Oriental.

• *Nanhermannia (Nippohermannia) parallela* Aoki, 1961 (*Nan.*)

Distribución: Este de Paleártica oriental, Cáucaso y Oriental.

▲ ***Hermannioidea*** Sellnick, 1928

◆ ***Hermannidae*** Sellnick, 1928

Distribución: Cosmopolita.

♣ ***Hermannia*** Nicolet, 1855

Especie tipo: (*Hermannia crassipes* Nicolet, 1855) = *Nothrus gibbus* Koch, 1839

***Hermannia* (*Hermannia*) Nicolet, 1855**

Distribución: Holártica, Paleotropical, “Neotropical” y “Australiana”.

- *Hermannia* (*H.*) *canariensis* Pérez-Íñigo y Peña, 1996

Distribución: I. Canarias.

- *Hermannia* (*H.*) *convexa* (Koch, 1839) (*Nothrus*)

(=*Hermannia grandis* Berlese, 1910)

(=*Claviceps rugosus* L. Koch, 1879)

Distribución: Holártica (Europa: menos frecuente en el Sur, Paleártica oriental y U.S.A.: Virginia), India (Sikkim) e I. Seychelles.

- *Hermannia* (*H.*) *gibba* (Koch, 1839) (*Nothrus*) (= *Hermannia crassipes* Nicolet, 1855)

Distribución: Holártica e I. Seychelles.

***Hermannia* (*Heterohermannia*) Woas, 1992**

Especie tipo: *Hermannia reticulata* Thörell, 1871

Distribución: Holártica.

- *Hermannia* (*Heterohermannia*) *evidens* Pérez-Íñigo, 1992 (*Herm.*)

Distribución: I. Azores.

- *Hermannia* (*Heterohermannia*) *minuta* Woas, 1980 (*Herm.*)

Distribución: Europa meridional.

- *Hermannia* (*Heterohermannia*) *nodosa* Michael, 1888 (*Herm.*)

Distribución: Europa occidental.

- *Hermannia* (*Heterohermannia*) *pulchella* Willmann, 1952 (*Herm.*)

Distribución: Euroatlántica.

- *Hermannia* (*Heterohermannia*) *scabra* (L. Koch, 1879) (*Nothrus*)

Distribución: Holártica (menos frecuente en el Sur).

- *Hermannia* (*Heterohermannia*) *schusteri* Woas, 1980 (*Herm.*)

Distribución: Europa meridional (excepto Oeste).

- *Hermannia* (*Heterohermannia*) *subglabra* Berlese, 1910 (*Herm.*)

Distribución: Holártica (Europa y Neártica septentrional).

- *Hermannia* (*Heterohermannia*) *woasi* Pérez-Íñigo, 1992 (*Herm.*)

Distribución: I. Azores.

- Suborden BRACHYPYLINA Hull, 1918

Infraorden PYCNONOTICAE Grandjean, 1954

**▲ *Hermannielloidea* Grandjean, 1934****◆ *Hermanniellidae* Grandjean, 1934**

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

**♠ *Hermanniella* Berlese, 1908**

Especie tipo: *Hermannia granulata* Nicolet, 1855

Distribución: Cosmopolita (excepto Neotropical y Antártica).

- *Hermanniella canestrinii* (Tietze, 1899) (*Hypochthonius*) “*sp. inq.*”

Distribución: Italia.

- *Hermanniella clavigera* Berlese, 1908

Distribución: U.S.A. (Misuri) y Cáucaso.

- *Hermanniella dolosa* Grandjean, 1931

Distribución: Paleártica (menos frecuente en el Norte).

- *Hermanniella dubinini* Sitnikova, 1973

Distribución: Cáucaso, Paleártica oriental meridional y China (Tíbet).

- *Hermanniella gibber* Kulijev, 1979

Distribución: Cáucaso.

- *Hermanniella granulata* (Nicolet, 1855) (*Hermannia*)

Distribución: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Noreste de U.S.A.).

- *Hermanniella incondita* Pérez-Íñigo, 1987

Distribución: I. Azores.

- *Hermanniella issanielloides* Gil-Martín y Subías, 1997

Distribución: España.

- *Hermanniella laurisilvae* Pérez-Íñigo, 1972

Distribución: I. Canarias.

- *Hermanniella multipora* Sitnikova, 1973

Distribución: Paleártica (Mediterránea oriental, Sur de Siberia y Este de Rusia asiática).

- *Hermanniella oblitera* Sitnikova, 1973

Distribución: Paleártica meridional (Cáucaso y Asia centrooccidental).

- *Hermanniella picea* (Koch, 1839) (*Nothrus*) (= *Hermannia arrecta* Nicolet, 1855)

(= *Hermanniella punctulata* Berlese, 1908)

Distribución: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y U.S.A.: Virginia), Noreste de Oriental y Filipinas.

- *Hermanniella reticulata* Sitnikova, 1973

Distribución: Paleártica meridional (Asia centrooccidental y Cáucaso).

- *Hermanniella septentrionalis* Berlese, 1910 (*H. punctulata* s.)

(= *Hermanniella barbata* Moraza, 1990)

Distribución: Holártica (Paleártica occidental: excepto Norte, y U.S.A.: Oregón).

- *Hermanniella serrata* Sitnikova, 1973

Distribución: Paleártica (Mediterránea oriental y Este de Rusia asiática).

**♠ *Issaniella* Grandjean, 1962**

Especie tipo: *Issaniella mognabin* Grandjean, 1962

Distribución: Paleártica y Neotropical.

*Issaniella mognabin* Grandjean, 1962

- *Issaniella mognabin mognabin* Grandjean, 1962

Distribución: Mediterránea e I. Galápagos.

- *Issaniella mognabin hauseri* Mahunka, 2001

Distribución: Grecia.

**◆ *Plasmobatidae* Grandjean, 1961**

Distribución: Pantropical y Paleártica meridional.

**♠ *Plasmobates* Grandjean, 1929**

Especie tipo: *Plasmobates pagoda*

Grandjean, 1929

Distribución: Pantropical y Paleártica meridional.

• *Plasmobates pagoda* Grandjean, 1929

Distribución: Norte de Neotropical, India (Bengala Occidental) y Cáucaso.

▲ **Neoliodoidea** Sellnick, 1928

◆ **Neolioididae** Sellnick, 1928

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

♣ **Neoliodes** Berlese, 1888

(=*Liodes* Heyden, 1826, “*nom. praeoc.*” por *Leiodes* Latreille, 1796)

(=*Udetaliodes* Jacot, 1929)

Especie tipo: *Notaspis theleproctus* Hermann, 1804

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• *Neoliodes globosus* (Subías y Gil-Martín, 1990) (*Liodes*)

Distribución: Mediterránea.

• *Neoliodes ionicus* Sellnick, 1931

Distribución: Mediterránea.

• *Neoliodes terrestris* (Wallwork, 1963) (*Liodes*)

Distribución: Tropical (Etiópica: Ghana, Oriental: India, y Neotropical: Venezuela) y Paleártica meridional (Cáucaso y Asia centrooccidental).

• *Neoliodes theleproctus* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)

(=*Nothrus circumvallatus* Haupt, 1882)

(=*Nothrus dimera* Haupt, 1882)

(=*Nothrus dorsatus* Canestrini y Fanzago, 1876)

Distribución: Semicosmopolita (Paleártica: menos frecuente en el Norte, Oriental: Vietnam, y Australiana: Nueva Guinea y Hawai).

♣ **Platylodes** Berlese, 1916

Especie tipo: *Nothrus doderleini* Berlese, 1883

Distribución: Holártica.

• *Platylodes doderleini* (Berlese, 1883) (*Nothrus*)

(?=*Nothrus venosus* Grube, 1859 “*sp. inq.*”)

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea y Japón).

• *Platylodes graecus* Sellnick, 1927

Distribución: Grecia.

• *Platylodes longisetosus* Sitnikova, 1975

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).

• *Platylodes scaliger* (Koch, 1839) (*Nothrus*)

Distribución: Holártica (frecuente en Mediterránea).

♣ **Poroliodes** Grandjean, 1934

Especie tipo: (*Notaspis theleproctus* Hermann “*sensu*” Michael, 1888) =*Nothrus farinosus* Koch, 1839

Distribución: Paleártica.

• *Poroliodes farinosus* (Koch, 1839) (*Nothrus*)

(=*Neoliodes caudatus* Berlese, 1914)

Distribución: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental).

▲ **Plateremaeoidea** Trägårdh, 1926

◆ **Plateremaeidae** Trägårdh, 1926

Distribución: Pantropical y subtropical.

♣ **Balagheremaeus** Arillo y Subías, 2006

Especie tipo: *Balagheremaeus chimaera* Arillo y Subías, 2006

Distribución: Paleártica.

• *Balagheremaeus chimaera* Arillo y Subías, 2006

Distribución: España.

♣ **Lopheremaeus** Paschoal, 1987

Especie tipo: *Plateremaeus mirabilis* Csiszár, 1962

Distribución: Subtropical (Paleártica meridional) y Etiópica.

• *Lopheremaeus laminipes* (Berlese, 1916) (*Plateremaeus*)

Distribución: Europa meridional.

• *Lopheremaeus mirabilis* (Csiszár, 1962) (*Plateremaeus*)

Distribución: Mediterránea oriental.

♣ **Paralopheremaeus** Paschoal, 1987

Especie tipo: *Plateremaeus legendrei* Balogh, 1962

Distribución: Paleotropical y subtropical (Paleártica meridional).

• *Paralopheremaeus hispanicus* (Ruiz, Kahwash y Subías, 1990) (*Plateremaeus*)

Distribución: Europa meridional.

◆ **Licnodamaeidae** Grandjean, 1954

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

♣ **Licnodamaeus** Grandjean, 1931

Especie tipo: *Licneremaeus undulatus* Paoli, 1908

Distribución: Paleártica, Oriental y Neotropical.

• *Licnodamaeus baccettii* Bernini, 1972

Distribución: Italia.

• *Licnodamaeus costula* Grandjean, 1931

Distribución: Mediterránea.

• *Licnodamaeus inaequalis* (Balogh y Mahunka, 1965) (*Pedrocortesia*)

Distribución: Paleártica: Sureste de Europa (Ucrania: Crimea) y Paleártica oriental meridional.

• *Licnodamaeus pulcherrimus* (Paoli, 1908) (*Licneremaeus*)

Distribución: Paleártica (excepto Norte).

• *Licnodamaeus undulatus* (Paoli, 1908) (*Licneremaeus*)

Distribución: Paleártica (excepto Norte) y Taiwán [Formosa].



♣ **Licnoliodes** Grandjean, 1931

Especie tipo: *Licnoliodes andrei* Grandjean, 1931

Distribución: Paleártica.

- *Licnoliodes adminensis* Grandjean, 1933  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Licnoliodes andrei* Grandjean, 1931  
Distribución: Paleártica (menos frecuente en el Norte).
- *Licnoliodes apunctatus* Mahunka, 1977  
Distribución: Grecia.

♦ **Licnobelbidae** Grandjean, 1965

Distribución: Paleártica.

♣ **Flabellobelba** Pérez-Íñigo, 1994

Especie tipo: *Licnobelba almeriensis* Ruiz, Kahwash y Subías, 1990

Distribución: Paleártica.

- *Flabellobelba almeriensis* (Ruiz, Kahwash y Subías, 1990) (*Licnobelba*)  
Distribución: España.

♣ **Licnobelba** Grandjean, 1931

Especie tipo: (*Licnobelba alestensis* Grandjean, 1931) =*Licneremaeus latiflabellatus* Paoli, 1908

Distribución: Paleártica.

- *Licnobelba caesarea* (Berlese, 1910) (*Licneremaeus*)  
Distribución: Mediterránea.
- *Licnobelba latiflabellata* (Paoli, 1908) (*Licneremaeus*) (= *Licnobelba alestensis* Grandjean, 1931) (= *Licnobelba montana* Mihelčič, 1957)  
Distribución: Paleártica occidental (excepto Norte).

▲ **Gymnodamaeidea** Grandjean, 1954

♦ **Gymnodamaeidae** Grandjean, 1954

Distribución: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).

♣ **Adrodamaeus** Paschoal, 1984

(=*Heterodamaeus* Woolley, 1957, “*nom. praec.*” por Ewing, 1917)

Especie tipo: *Damaeus magnisetosus* Ewing, 1909

Distribución: Holártica y Oriental.

- *Adrodamaeus femoratus* (Koch, 1839) (*Damaeus*) (= *Damaeus dugesi* Michael, 1890) (= *Belba gibba* Canestrini y Fanzago, 1877)  
Distribución: Paleártica (Paleártica occidental: excepto Norte, y Paquistán).
- *Adrodamaeus hispanicus* (Grandjean, 1928) (*Gymnodamaeus*) (= *Gymnodamaeus noster* Mihelčič, 1957) (= *Gymnodamaeus sculptus* Mihelčič, 1957)  
Distribución: Paleártica meridional.
- *Adrodamaeus italicus* (Berlese, 1916)

(*Gymnodamaeus*)

(=*Arthrodamaeus parvulus* Kunst, 1958)

Distribución: Europa centromeridional.

- *Adrodamaeus mongolicus* (Bayartogtokh y Weigmann, 2005) (*Arthrodamaeus*)

Distribución: Paleártica meridional

(Cáucaso y Paleártica oriental meridional).

- *Adrodamaeus pusillus* (Berlese, 1910)

(*Gymnodamaeus*)

Distribución: Europa centromeridional.

- *Adrodamaeus siculus* (Berlese, 1910)

(*Gymnodamaeus reticulatus s.*)

(=*Arthrodamaeus ignotus* Paschoal, 1984)

Distribución: Europa centromeridional.

- *Adrodamaeus starki* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*Allodamaeus*)

Distribución: Paleártica (Mediterránea oriental y Este de Rusia asiática).

♣ **Arthrodamaeus** Grandjean, 1954

Especie tipo: *Gymnodamaeus reticulatus* Berlese, 1910

Distribución: Paleártica.

- *Arthrodamaeus bicristatus* Subías, Arillo y J. Subías, 1997  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Arthrodamaeus cereus* Subías, Arillo y J. Subías, 1997  
Distribución: Italia.
- *Arthrodamaeus mediterraneus* Subías, Arillo y J. Subías, 1997  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Arthrodamaeus octosetosus* Subías, Arillo y J. Subías, 1997  
Distribución: España.
- *Arthrodamaeus reticulatus* (Berlese, 1910) (*Gymnodamaeus*)  
Distribución: Europa occidental.
- *Arthrodamaeus rosarius* Subías, Arillo y J. Subías, 1997  
(?= *Arthrodamaeus reticulatus tenuis* Mihelčič, 1958 “*sp. inq.*”)  
Distribución: España.

♣ **Gymnodamaeus** Kulczynski, 1902

(=*Donjohnstonella* Walter, 2009)

(=*Heterodamaeus* Ewing, 1917)

(=*Johnstonella* Paschoal, 1983)

(=*Odontodamaeus* Paschoal, 1982)

(=*Pleodamaeus* Paschoal, 1983)

Especie tipo: *Damaeus bicostatus* Koch, 1935

Distribución: Holártica y Oriental.

- *Gymnodamaeus bicostatus* (Koch, 1835) (*Damaeus*)

(=*Eremaeus asperulus* Berlese, 1882)

Distribución: Holártica.

- *Gymnodamaeus quadriseta* Ruiz, Kahwash y Subías, 1990

Distribución: Mediterránea occidental.

- *Gymnodamaeus trichosus* (Kulijev, 1979) (*Allodamaeus*)

Distribución: Cáucaso.

♣ **Jacotella** Banks, 1947

Especie tipo: *Gymnodamaeus quadricaudiculus* Jacot, 1937

Distribución: Holártica, Oriental y Neotropical.

• *Jacotella austriaca* (Willmann, 1935) (*Gymnodamaeus*)

(=*Gymnodamaeus austriacus stepposus* Bashkirova, 1958)

Distribución: Paleártica (Europa centromeridional y Asia centrooccidental).

• *Jacotella enoplura* Paschoal, 1983

Distribución: Holártica: Noroeste de U.S.A. y Europa meridional (Bulgaria).

• *Jacotella frondeus* (Kulijev, 1979)

(*Plesiodamaeus*)

(=*Plesiodamaeus ornatus* Mahunka, 1979)

(=*Plesiodamaeus perezinigo* Mahunka, 1986)

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Jacotella glabra* (Mihelčič, 1957)

(*Plesiodamaeus*)

(?=*Gymnodamaeus aprofundatus* Mihelčič, 1956 “*sp. inq.*”)

Distribución: Paleártica meridional.

• *Jacotella neominata* Subías, 2004

(=*Plesiodamaeus ornatus* Pérez-Iñigo, 1972, “*nom. praeoc.*” por Balogh y Csiszár, 1963)

Distribución: Mediterránea.

• *Jacotella reticulata* Ruiz, Kahwash y Subías, 1990

Distribución: Mediterránea occidental.

♣ **Joshuella** Wallwork, 1972

(=*Nortonella* Paschoal, 1982, “*nom. praeoc.*” por Rohwer, 1908)

(=*Paschoalia* Özdikmen, 2008, “*nom. praeoc.*” por Subías, 2004)

(=*Roynortonella* Walter, 2009)

Especie tipo: *Joshuella striata* Wallwork, 1972

Distribución: Holártica y Oriental.

• *Joshuella helvetica* (Woas, 1992)

(*Gymnodamaeus*)

Distribución: Suroeste de Europa.

♣ **Plesiodamaeus** Grandjean, 1954

Especie tipo: *Damaeus craterifer* Haller, 1884

Distribución: Paleártica y Neotropical.

• *Plesiodamaeus craterifer* (Haller, 1884)

(*Damaeus*)

Distribución: Paleártica (Europa centromeridional y Sur de Siberia).

♦ **Aleurodamaeidae** Paschoal y Johnston, 1985

Distribución: Paleártica meridional y Etiópica.

♣ **Aleurodamaeus** Grandjean, 1954

Especie tipo: *Damaeus setosus* Berlese, 1883

Distribución: Paleártica meridional y

Etiópica.

• *Aleurodamaeus setosus* (Berlese, 1883)

(*Damaeus*)

(=*Gymnodamaeus gibbus* Mihelčič, 1963)

(=*Gymnodamaeus nitidus* Mihelčič, 1956)

Distribución: Paleártica meridional.

▲ **Damaeidea** Berlese, 1896

♦ **Damaeidae** Berlese, 1896

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

♣ **Belba** Heyden, 1826

Especie tipo: *Notaspis corynopus* Hermann, 1804

Distribución: Holártica, Oriental y “Australiana”.

• *Belba aurata* Kulijev, 1967

Distribución: Cáucaso.

• *Belba compta* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)

(=*Belba verrucosa* Bulanova-Zachvatkina, 1962)

Distribución: Paleártica.

• *Belba corynopus* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)

(=*Belba bulbipes* Karpelles, 1893)

(=*Damaeus sufflexus* Michael, 1885)

Distribución: Holártica y Norte de Oriental.

• *Belba daghestanica* Bulanova-Zachvatkina,

1962

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Belba dubinini* Bulanova-Zachvatkina, 1962

Distribución: Paleártica (Europa centrooriental y Paleártica oriental).

• *Belba globiceps* (Canestrini y Fanzago, 1876)

(*Oribata*) “*sp. inq.*”

Distribución: Italia.

• *Belba meridionalis* Bulanova-Zachvatkina,

1962

Distribución: Paleártica meridional

(Mediterránea y Paleártica oriental meridional).

• *Belba paracorynopus* Bulanova-Zachvatkina,

1962

Distribución: Paleártica meridional (Europa meridional y Este de Paleártica oriental).

• *Belba patelloides* (Michael, 1888) (*Notaspis*)

(=*Belba bartosi* Winkler, 1955)

(=*Belba pseudocorynopus* Märkel, 1960)

Distribución: Paleártica occidental (excepto Norte).

• *Belba sculpta* Mihelčič, 1957

(=*Belba aberrans* Mihelčič, 1957)

(=*Belba ignota* Mihelčič, 1957)

Distribución: Mediterránea.

• *Belba servadeii* Lombardini, 1963 “*sp. inq.*”

Distribución: Italia.

♣ **Belbodamaeus** Bulanova-Zachvatkina, 1967

**Belbodamaeus** (*Lanibelba*) Norton, 1980

Especie tipo: *Lanibelba pini* Norton, 1980

Distribución: Holártica.

• *Belbodamaeus* (*Lanibelba*) *marginatus* Kulijev, 1967 (*B.*)

Distribución: Cáucaso.

♣ **Damaeus** Koch, 1835

Especie tipo: *Damaeus auritus* Koch, 1835

**Damaeus (Damaeus)** Koch, 1835

(=*Hypodamaeus* Bulanova-Zachvatkina, 1957)

Distribución: Holártica y "Neotropical".

- *Damaeus (D.) arvernensis* Grandjean, 1960

Distribución: Oeste de Europa.

- *Damaeus (D.) auritus* Koch, 1835

Distribución: Paleártica: frecuente.

- *Damaeus (D.) crispatus* (Kulczynski, 1902)

(*Oribata*)

Distribución: Paleártica (Europa y

Paquistán).

- *Damaeus (D.) echinopus* Bulanova-

Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)

Distribución: Mediterránea oriental.

- *Damaeus (D.) flagellifer* Michael, 1890

(=*Damaeus kulczynskii* Grandjean, 1943)

(=*Damaeus longipes* Mihelčič, 1957, "nom.

*praeoc.*" por Willmann, 1940)

(=*Belba pachytrichosa* Mihelčič, 1956)

Distribución: Paleártica occidental (excepto

Norte).

- *Damaeus (D.) foroliviensis* (Lombardini, 1943)

(*Neophyllobius*) "sp. inq."

Distribución: Italia.

- *Damaeus (D.) glycyphagoides* Bulanova-

Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)

Distribución: Cáucaso y Méjico.

- *Damaeus (D.) gracilipes* (Kulczynski, 1902)

(*Oribata*)

Distribución: Holártica (Paleártica

occidental, Paquistán y Groenlandia).

- *Damaeus (D.) longipes* (Willmann, 1940)

(*Belba*)

Distribución: Centro de Europa meridional.

- *Damaeus (D.) maximus* Mihelčič, 1957

Distribución: Europa meridional.

- *Damaeus (D.) oritizi* Pérez-Íñigo, 1995

Distribución: España.

- *Damaeus (D.) pseudoauritus* Bulanova-

Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)

Distribución: Cáucaso.

- *Damaeus (D.) recasensi* Capilla, 1971

Distribución: Mediterránea occidental.

- *Damaeus (D.) riparius* Nicolet, 1855

(=*Damaeus alienus* Hull, 1915)

Distribución: Paleártica (frecuente).

- *Damaeus (D.) selgae* Pérez-Íñigo, 1966

Distribución: España.

- *Damaeus (D.) tauricus* Bulanova-Zachvatkina,

1957 (*D. (Hypodamaeus)*)

Distribución: Mediterránea oriental.

- *Damaeus (D.) torquisetosus* (Mihelčič, 1955)

(*Belba*)

(=*Damaeus ornatus* Mihelčič, 1957)

Distribución: España.

**Damaeus (Adamaeus)** Norton, 1977

Especie tipo: *Damaeus onustus* Koch, 1841

Distribución: Paleártica y Etiópica.

- *Damaeus (Adamaeus) firmus* Kunst, 1958 (*D.*)

Distribución: Europa meridional (Bulgaria y

Rumanía).

- *Damaeus (Adamaeus) onustus* Koch, 1841 (*D.*)

(=*Belba geniculosa* Oudemans, 1929)

(=*Belba helvetica* Schweizer, 1956)

Distribución: Paleártica occidental

(frecuente), Etiópica (Tanzania) e I. Santa

Helena.

**Damaeus (Epidamaeus)** Bulanova-Zachvatkina,

1957

Especie tipo: *Oribata bituberculata*

Kulczynski, 1902

Distribución: Holártica y tropical (Oriental y

Neotropical).

- *Damaeus (Epidamaeus) aleinikovae* (Bulanova-

Zachvatkina, 1964) (*E.*)

Distribución: Este de Paleártica occidental.

- *Damaeus (Epidamaeus) berlesei* Michael, 1908

(*D.*)

Distribución: Paleártica occidental (excepto

Norte).

- *Damaeus (Epidamaeus) bituberculatus*

(Kulczynski, 1902) (*Oribata*)

Distribución: Paleártica.

- *Damaeus (Epidamaeus) flexispinosus* (Kunst,

1961) (*E.*)

Distribución: Mediterránea oriental.

- *Damaeus (Epidamaeus) pavlovskii* (Bulanova-

Zachvatkina, 1957) (*E.*)

Distribución: Paleártica (Mediterránea

oriental y Asia centrooccidental).

- *Damaeus (Epidamaeus) pinguis* (Kulijev, 1967)

(*E.*)

Distribución: Cáucaso.

- *Damaeus (Epidamaeus) plumosus* (Bulanova-

Zachvatkina, 1975) (*E.*)

Distribución: Este de Paleártica occidental

(excepto Norte).

- *Damaeus (Epidamaeus) pyrenaicus* (Pérez-

Íñigo jr., 1991) (*E.*)

(=*Epidamaeus ibericus* Moraza, Moreno y

Saloña, 1991)

Distribución: España.

- *Damaeus (Epidamaeus) smirnovi* Bulanova-

Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)

Distribución: Paleártica (Este de Paleártica

occidental y Este de Paleártica oriental).

- *Damaeus (Epidamaeus) subiasi* (Pérez-Íñigo,

1995) (*E.*)

Distribución: España.

- *Damaeus (Epidamaeus) tatricus* (Kulczynski,

1902) (*Oribata*)

(=*Epidamaeus pseudotatricus* Bulanova-

Zachvatkina, 1957)

Distribución: Holártica.

**Damaeus (Eudamaeus)** Pérez-Íñigo, 1987

Especie tipo: *Damaeus (Eudamaeus)*

*pomboi* Pérez-Íñigo, 1987

Distribución: Paleártica.

- *Damaeus (Eudamaeus) pomboi* Pérez-Íñigo,

1987

Distribución: I. Azores.

**Damaeus (Kunstdamaeus)** Miko, 2006

Especie tipo: *Belba lengersdorfi* Willmann,

1932

Distribución: Holártica.

- *Damaeus (Kunstdamaeus) diversipilis* (Willmann, 1951) (*Belba*)

Distribución: Europa centromeridional.

- *Damaeus (Kunstdamaeus) longisetosus* (Willmann, 1953) (*Belba*)

Distribución: Europa centromeridional.

- *Damaeus (Kunstdamaeus) tecticola* Michael, 1888 (*D.*)

Distribución: Europea.

***Damaeus (Paradamaeus)*** Bulanova-Zachvatkina, 1957

- Especie tipo: *Notaspis clavipes* Hermann, 1804

Distribución: Paleártica.

- *Damaeus (Paradamaeus) clavipes* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)

 (= *Oppia glaucina* Koch, 1836) (= *Damaeus nodipes* Koch, 1839)

Distribución: Paleártica occidental

(frecuente).

***Damaeus (Spatiodamaeus)*** Bulanova-Zachvatkina, 1957

- Especie tipo: *Damaeus verticillipes* Nicolet, 1855

Distribución: Holártica.

- *Damaeus (Spatiodamaeus) boreus* Bulanova-Zachvatkina, 1957

Distribución: Este de Paleártica occidental.

- *Damaeus (Spatiodamaeus) fageti* Bulanova-Zachvatkina, 1957

Distribución: Europa oriental.

- *Damaeus (Spatiodamaeus) glabrisetus* (Willmann, 1930) (*Belba*)

Distribución: Europa centromeridional (excepto Oeste).

- *Damaeus (Spatiodamaeus) setiger* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)

Distribución: Europa centrooriental (excepto Norte).

- *Damaeus (Spatiodamaeus) verticillipes* (Nicolet, 1855) (*D.*)

 (= *Belba mirabilis* Karpelles, 1893) (= *Damaeus quadrihastatus* Märkel y Meyer, 1960) (?= *Damaeus torvus* Koch, 1835 “*sp. inq.*”)

Distribución: Holártica (Paleártica

occidental: frecuente, y U.S.A.: New Hampshire).

♣ ***Dameobelba*** Sellnick, 1928

- Especie tipo: *Oribata minutissima* Sellnick, 1920

Distribución: Paleártica.

- *Dameobelba minutissima* (Sellnick, 1929) (*Oribata*)

Distribución: Paleártica (Paleártica

occidental y Este de Rusia asiática).

♣ ***Metabelba*** Grandjean, 1936

- Especie tipo: *Damaeus papillipes* Nicolet, 1855

***Metabelba (Metabelba)*** Grandjean, 1936

Distribución: Cosmopolita (excepto Neotropical y Antártica).

- *Metabelbella (M.) gratiosa* (Willmann, 1940) (*Belba*)

Distribución: Europa centrooriental (excepto Norte).

- *Metabelba (M.) limasetosa* (Bulanova-Zachvatkina, 1962) (*Belba*)

Distribución: Mediterránea oriental.

- *Metabelba (M.) papillipes* (Nicolet, 1855) (*Damaeus*)

 (= *Metabelba cremersi* Hammen, 1952) (= *Belba globipes* Canestrini y Berlese, 1884) (= *Belba michaeli* Oudemans, 1900) (= *Belba obscura* Mihelčič, 1956)

Distribución: Holártica (Paleártica

occidental: menos frecuente en el Norte, Oeste de Siberia y U.S.A.).

- *Metabelba (M.) parapulverosa* Moritz, 1966

Distribución: Europa centromeridional.

- *Metabelba (M.) propexa* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)

Distribución: Europa centromeridional.

- *Metabelba (M.) propinqua* (Sellnick, 1943) (*Damaeus*) “*sp. inq.*”

Distribución: Italia.

- *Metabelba (M.) pulverulenta* (Koch, 1839) (*Nothrus*)

 (= *Metabelba pulverosa* Strenzke, 1953)

Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Virginia).

- *Metabelba (M.) rara* Bulanova-Zachvatkina, 1965

Distribución: Paleártica (Mediterránea oriental y Oeste de Siberia).

- *Metabelba (M.) rohdendorfi* Bulanova-Zachvatkina, 1965

Distribución: Europa centrooriental.

***Metabelba (Allobelba)*** Kunst, 1961

- Especie tipo: *Allobelba aculeata* Kunst, 1961

Distribución: Paleártica.

- *Metabelba (Allobelba) aculeata* (Kunst, 1961) (*A.*)

Distribución: Europa meridional (Bulgaria y Rumanía).

***Metabelba (Neobelba)*** Bulanova-Zachvatkina, 1967

- Especie tipo: *Neobelba pseudopapillipes* Bulanova-Zachvatkina, 1967

Distribución: Paleártica.

- *Metabelba (Neobelba) pseudopapillipes* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*N.*)

Distribución: Europa meridional.

***Metabelba (Parametabelba)*** Mihelčič, 1964

- Especie tipo: (*Metabelba gladiator* Mihelčič, 1963) = *Damaeus romandiola* Sellnick, 1943

Distribución: Paleártica y Etiópica.

- *Metabelba (Parametabelba) ericius* Kunst, 1958 (*M.*)

Distribución: Sureste de Europa.

- *Metabelba (Parametabelba) filippovae*

- Bulanova-Zachvatkina, 1965 (*M.*)  
Distribución: Cáucaso.
- *Metabelba (Parametabelba) flagelliset*  
Bulanova-Zachvatkina, 1965 (*M.*)  
Distribución: Mediterránea oriental.
  - *Metabelba (Parametabelba) italica* (Sellnick, 1931) (*Damaeus*)  
Distribución: Europa centromeridional.
  - *Metabelba (Parametabelba) machadoi* Pérez-Íñigo, 1986 (*M.*)  
Distribución: I. Canarias.
  - *Metabelba (Parametabelba) monilipeda*  
Bulanova-Zachvatkina, 1965 (*M.*)  
Distribución: Cáucaso.
  - *Metabelba (Parametabelba) platynota*  
Grandjean, 1954 (*M.*)  
Distribución: Europa meridional.
  - *Metabelba (Parametabelba) pseudoitalica*  
Bulanova-Zachvatkina, 1965 (*M.*)  
(=*Metabelba paraitalica* Kulijev, 1967)  
Distribución: Cáucaso.
  - *Metabelba (Parametabelba) rhodopeia* Kunst, 1961 (*M.*)  
Distribución: Europa meridional.
  - *Metabelba (Parametabelba) romandiola* (Sellnick, 1943) (*Damaeus*)  
(=*Metabelba gladiator* Mihelčič, 1963)  
Distribución: Suroeste de Europa.
- ♣ ***Metabelbella*** Bulanova-Zachvatkina, 1967  
Especie tipo: *Metabelbella zachvatkini*  
Bulanova-Zachvatkina, 1967  
Distribución: Paleártica.
- *Metabelbella gratiosa* (Willmann, 1940) (*Belba*)  
Distribución: Europa centrooriental (excepto Norte).
  - *Metabelbella interlamellaris* Pérez-Íñigo, 1987  
Distribución: Mediterránea occidental.
  - *Metabelbella janae* Pérez-Íñigo jr., 1991  
Distribución: España.
  - *Metabelbella kosarovi* Jeleva, 1970  
Distribución: Bulgaria.
  - *Metabelbella macerochaeta* Bulanova-Zachvatkina, 1967  
Distribución: Mediterránea oriental.
  - *Metabelbella phalangioides* (Michael, 1890) (*Damaeus*)  
Distribución: Mediterránea occidental.
  - *Metabelbella tichonravovi* Bulanova-Zachvatkina, 1967  
Distribución: Ucrania (Crimea).
  - *Metabelbella zachvatkini* Bulanova-Zachvatkina, 1967  
Distribución: Cáucaso.
- ♣ ***Nortonbelba*** Bernini, 1980  
Especie tipo: *Nortonbelba italica* Bernini, 1980  
Distribución: Paleártica.  
*Nortonbelba italica* Bernini, 1980
- *Nortonbelba italica italica* Bernini, 1980  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Nortonbelba italica plesiomorphica* (Saloña e Iturrondobeitia, 1989) (*Epidamaeus p.*)  
Distribución: España.
- ♣ ***Parabelbella*** Bulanova-Zachvatkina, 1967  
Especie tipo: *Parabelbella crenatosetosa*  
Bulanova-Zachvatkina, 1967  
***Parabelbella (Parabelbella)*** Bulanova-Zachvatkina, 1967  
(=*Heterodamaeus* Mihelčič, 1964, “*nom. praeoc.*” por Ewing, 1917)  
(=*Mirobelba* Pérez-Íñigo y Peña, 1994)  
Distribución: Paleártica.
- *Parabelbella (P.) exilior* (Mihelčič, 1964) (*Damaeus (Heterodamaeus)*)  
Distribución: Italia.
  - *Parabelbella (P.) grancanariae* (Pérez-Íñigo y Peña, 1994) (*Mirobelba*)  
Distribución: I. Canarias.
- Parabelbella (Tectodamaeus)*** Aoki, 1984  
Especie tipo: *Tectodamaeus armatus* Aoki, 1984  
Distribución: Paleártica, Oriental y “Australiana”.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) alpina* (Schwizer, 1956) (*Belba*)  
Distribución: Paleártica occidental (Suiza y Cáucaso).
  - *Parabelbella (Tectodamaeus) interlamellaris* (Willmann, 1939) (*Belba*) Distribución: Sur de Paleártica occidental (Macaronésica: Madeira, y Ucrania).
- ♣ ***Porobelba*** Grandjean, 1936  
Especie tipo: *Oribata spinosa* Sellnick, 1920  
Distribución: Holártica.
- *Porobelba grandjeanica* Subías, 1977  
Distribución: España.
  - *Porobelba spinosa* (Sellnick, 1920) (*Oribata*)  
(=*Belba parvula* Mihelčič, 1955)  
(=*Belba parvula* Mihelčič, 1956, “*nom. praeoc.*” por Mihelčič, 1955)  
Distribución: Paleártica (frecuente).
- ♣ ***Subbelba*** Bulanova-Zachvatkina, 1967  
Especie tipo: *Subbelba partiocrispa*  
Bulanova-Zachvatkina, 1967  
Distribución: Paleártica.
- Subbelba elisae* Pérez-Íñigo, 1972
- *Subbelba elisae elisae* Pérez-Íñigo, 1972  
Distribución: I. Canarias.
  - *Subbelba elisae fuerteventurae* Pérez-Íñigo y Peña, 1996  
Distribución: I. Canarias.
  - *Subbelba elisae grancanariae* Pérez-Íñigo y Peña, 1996  
Distribución: I. Canarias.
  - *Subbelba montana* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)  
(=*Belba ursina* Thor, 1930)  
Distribución: Paleártica (Euroatlántica, Cáucaso y Asia centrooccidental).

▲ **Polypterozetoidea** Grandjean, 1959

◆ **Polypterozetidae** Grandjean, 1959

Distribución: Paleártica.

♣ **Polypterozetes** Berlese, 1916

Especie tipo: *Polypterozetes cherubin*

Berlese, 1916

Distribución: Paleártica.

• *Polypterozetes cherubin* Berlese, 1916

Distribución: Italia.

▲ **Niphocephoidea** Travé, 1959

◆ **Compactozetidae** Luxton, 1988

Distribución: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

♣ **Cepheus** Koch, 1835

(=*Pelonia* Grube, 1859)

(=*Tegeocranus* Nicolet, 1855)

Especie tipo: *Cepheus latus* Koch, 1835

Distribución: Semicosmopolita (Holártica y Australianooriental).

• *Cepheus caucasicus* Sitnikova, 1975

Distribución: Cáucaso.

• *Cepheus cepheiformis* (Nicolet, 1855)

(*Tegeocranus*)

(=*Cepheus michaeli* Jacot, 1928)

Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Carolina del Norte) y China suroriental.

• *Cepheus dentatus* (Michael, 1888)

(*Tegeocranus*)

(=*Cepheus grandis* Sitnikova, 1975)

Distribución: Paleártica: Europa (frecuente) y Este de Rusia asiática.

• *Cepheus heterosetosus* (Sitnikova, 1975)

(*Oribatodes*)

Distribución: Este de Paleártica occidental: excepto Norte.

• *Cepheus latus* Koch, 1835

Distribución: Holártica (frecuente en Paleártica) y China suroriental.

• *Cepheus pegazzanoae* Bernini y Nannelli, 1982

Distribución: Mediterránea occidental.

• *Cepheus tuberculatus* Strenzke, 1951

Distribución: Paleártica occidental: excepto Norte.

• *Cepheus verrucosus* Bernini, 1971

Distribución: Mediterránea occidental.

♣ **Conoppia** Berlese, 1908

(=*Balzanina* Jacot, 1929)

(=*Phyllostegeus* Berlese, 1913)

Especie tipo: (*Oppia microptera* Berlese, 1885) =*Leiosoma palmicinctum* Michael, 1884

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Oriental y Neotropical).

• *Conoppia palmicincta* (Michael, 1884)

(*Leiosoma*)

(=*Oppia microptera* Berlese, 1885)

(=*Oribata microptera* Canestrini, 1896, “*nom. praeoc.*” por Berlese, 1885)

Distribución: Holártica (Paleártica occidental centromeridional: frecuente, Este de Paleártica oriental y U.S.A.), Oriental: Taiwán [Formosa], e India (Sikkim), y Bolivia.

♣ **Eupterotegaeus** Berlese, 1916

(=*Diodontocephus* Mihelčič, 1958)

Especie tipo: *Tegeocranus ornatissimus* Berlese, 1908

Distribución: Holártica y Neotropical.

• *Eupterotegaeus ornatissimus* (Berlese, 1908)

(*Tegeocranus*)

(?=*Cepheus pseudosculptus* Coggi, 1900 “*sp. inq.*”)

(=*Diodontocephus steinboeckii* Mihelčič, 1958)

Distribución: Holártica (Paleártica meridional, I. Sajalín y Canadá).

♣ **Hypocephus** Krivolutsky, 1971

Especie tipo: *Hypocephus mirabilis* Krivolutsky, 1971

Distribución: Paleártica.

• *Hypocephus mirabilis* Krivolutsky, 1971

Distribución: Mediterránea oriental.

♣ **Ommatocephus** Berlese, 1913

Especie tipo: *Cepheus ocellatus* Michael, 1882

Distribución: Holártica.

• *Ommatocephus crassisetosus* Pérez-Íñigo y Peña, 1996

Distribución: I. Canarias.

• *Ommatocephus ocellatus* (Michael, 1882)

(*Cepheus*)

(=*Scutovertex pulcherrimus* Berlese, 1913)

Distribución: Paleártica (Paleártica occidental: excepto Norte, e India: Himalaya).

• *Ommatocephus parvilamellatus* C. y C., jr. Pérez-Íñigo, 1996

Distribución: I. Azores.

• *Ommatocephus reticulatus* Pérez-Íñigo y Peña, 1997

Distribución: I. Canarias.

♣ **Oribatodes** Banks, 1895

Especie tipo: *Oribatodes mirabilis* Banks, 1895

Distribución: Holártica.

• *Oribatodes crenulatus* Csiszár, 1962

Distribución: Sureste de Europa.

♣ **Pilocephus** Pérez-Íñigo, 1992

Especie tipo: *Pilocephus azoricus* Pérez-Íñigo, 1992

Distribución: Paleártica.

• *Pilocephus azoricus* Pérez-Íñigo, 1992

Distribución: I. Azores.

♣ **Protocephus** Jacot, 1928

Especie tipo: *Tegeocranus hericius* Michael, 1887

- Distribución: Paleártica.  
 • *Protocepheus hericius* (Michael, 1887) (*Tegeocranus*)  
 Distribución: Europa central.
- ♣ ***Sphodrocepheus*** Woolley e Higgins, 1963  
 Especie tipo: *Sphodrocepheus tridactylus* Woolley e Higgins, 1963  
 Distribución: Holártica, Oriental y Neotropical.  
 • *Sphodrocepheus tridactylus* Woolley e Higgins, 1963  
 Distribución: Holártica (U.S.A. occidental y Cáucaso).
- ♣ ***Tereticepheus*** S. y F. Bernini, 1990  
 Especie tipo: *Tereticepheus annamariae* S. y F. Bernini, 1990  
 Distribución: Paleártica meridional.  
 • *Tereticepheus annamariae* S. y F. Bernini, 1990  
 Distribución: Argelia.  
 • *Tereticepheus undulatus* (Willmann, 1939) (*Cepheus*)  
 Distribución: Macaronésica (Madeira).
- ♣ ***Tritegeus*** Berlese, 1913  
 Especie tipo: (*Cepheus bifidatus* Nicolet "sensu" Michael, 1880) = *Tritegeus bisulcatus* Grandjean, 1953  
 Distribución: Paleártica.  
 • *Tritegeus bisulcatus* Grandjean, 1953  
 Distribución: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).  
 • *Tritegeus brevisetus* Sitnikova, 1975  
 Distribución: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental).  
 • *Tritegeus sculptus* S. y F. Bernini, 1990  
 Distribución: Mediterránea occidental.
- ♦ ***Niphocepheidae*** Travé, 1959  
 Distribución: Paleártica y Oriental.
- ♣ ***Niphocepheus*** Balogh, 1943  
 Especie tipo: *Cepheus nivalis* Schweizer, 1922  
 Distribución: Paleártica, Oriental y Neotropical.  
 • *Niphocepheus guadarramicus* Subías, 1977  
 Distribución: España.  
*Niphocepheus nivalis* (Schweizer, 1922) (*Cepheus*)  
 • *Niphocepheus nivalis nivalis* (Schweizer, 1922)  
 Distribución: Paleártica (Europa centromeridional y Japón) y Taiwán [Formosa].  
 • *Niphocepheus nivalis baloghi* Travé, 1959  
 Distribución: Mediterránea.  
 • *Niphocepheus nivalis delamarei* Travé, 1959 (*Cepheus*)  
 Distribución: Mediterránea occidental y Méjico.  
 • *Niphocepheus nivalis grandjeani* Travé, 1959  
 Distribución: Oeste de Europa.
- ▲ ***Charassobatoidea*** Grandjean, 1958
- ♦ ***Microtegeidae*** Balogh, 1972  
 Distribución: Pantropical.
- ♣ ***Microtegeus*** Berlese, 1916  
 Especie tipo: *Tegeocranus (Microtegeus) undulatus* Berlese, 1916  
 Distribución: Pantropical.  
 • *Microtegeus undulatus* (Berlese, 1916) (*Tegeocranus (M.)*)  
 Distribución: Etiópica (Somalia y Tanzania) y Paleártica meridional (Cáucaso).
- ♦ ***Nosybeidae*** Mahunka, 1993  
 Distribución: Subtropical.
- ♣ ***Lamellocepheus*** Balogh, 1961 (= *Nosybea* Mahunka, 1993) (= *Tessacarus* Grandjean, 1962)  
 Especie tipo: *Tectocepheus personatus* Berlese, 1910  
 Distribución: Paleártica meridional y Etiópica.  
 • *Lamellocepheus personatus* (Berlese, 1910) (*Tectocepheus*) (= *Lamellocepheus ambitus* Kulijev, 1966)  
 Distribución: Europa meridional.
- ▲ ***Microzetoidea*** Grandjean, 1936
- ♦ ***Microzetidae*** Grandjean, 1936  
 Distribución: Cosmopolita.
- ♣ ***Acaroceras*** Grandjean, 1936  
***Acaroceras (Trichacaroceras)*** Mahunka, 1991  
 Especie tipo: *Acaroceras (Trichacaroceras) africanus* Mahunka, 1991  
 Distribución: Paleártica meridional.  
 • *Acaroceras (Trichacaroceras) africanus* Mahunka, 1991  
 Distribución: Macaronésica (Cabo Verde).
- ♣ ***Arenozetes*** Krivolutsky, 1971  
 Especie tipo: *Arenozetes christovi* Krivolutsky, 1971  
 Distribución: Paleártica.  
 • *Arenozetes christovi* Krivolutsky, 1971  
 Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
- ♣ ***Berlesezetes*** Mahunka, 1980  
 Especie tipo: (*Microzetes auxiliaris* Grandjean, 1936) = *Microzetes ornatissimus* Berlese, 1913  
 Distribución: Cosmopolita.  
 • *Berlesezetes aegypticus* (Bayoumi, 1977) (*Microzetes*)  
 Distribución: Egipto.  
 • *Berlesezetes alces* (Piffel, 1961) (*Microzetes*)  
 Distribución: Mediterránea.  
 • *Berlesezetes cuspidatus* Mahunka, 1982  
 Distribución: Grecia.

- *Berlesezetes grandjeani* (Mahunka, 1977) (*Microzetes*)  
Distribución: Mediterránea oriental.
- *Berlesezetes kingi* Bayoumi y Al-Khalifa, 1986  
Distribución: Arabia Saudita.
- Berlesezetes ornatissimus* (Berlese, 1913) (*Microzetes*)
- *Berlesezetes ornatissimus ornatissimus* (Berlese, 1913)  
(=*Microzetes africanus* Balogh, 1958)  
(=*Microzetes auxiliaris* Grandjean, 1936)  
(=*Microzetes auxiliaris pachyseta* Hammer, 1971)  
Distribución: Pantropical y subtropical (frecuente).
- *Berlesezetes ornatissimus mirus* (Mihelčič, 1956) (*Microzetes m.*)  
Distribución: España.
- ♣ *Caucasiozetes* Shtanchaeva, 1984  
(=*Teraja* Mahunka, 1995)  
Especie tipo: *Caucasiozetes lamellatus* Shtanchaeva, 1984  
Distribución: Oriental y Paleártica meridional.
- *Caucasiozetes lamellatus* Shtanchaeva, 1984  
Distribución: Cáucaso.
- ♣ *Microzetes* Berlese, 1913  
(=*Nellacaroides* Mahunka, 1998)  
(=*Nellacarus* Grandjean, 1936)  
Especie tipo: *Sphaerozetes (Tectoribates) mirandus* Berlese, 1908  
Distribución: Paleártica meridional y Etiópica.
- *Microzetes adansoni* (Lions, 1966) (*Nellacarus*)  
Distribución: Mediterránea occidental.
- \*• *Microzetes asiaticus* (Krivolutsky, 1975) (*Nellacarus*)  
Distribución: Paleártica (España, Ucrania, y Asia centrooccidental).
- *Microzetes baloghi* (Jeleva, 1962) (*Nellacarus*)  
Distribución: Europa meridional.
- *Microzetes castrii* (Mahunka, 1966) (*Nellacarus*)  
Distribución: Italia.
- *Microzetes caucasicus* (Krivolutsky, 1967) (*Nellacarus*)  
Distribución: Cáucaso.
- *Microzetes costulatus* (Travé, 1956) (*Nellacarus*)  
Distribución: Europa meridional.
- *Microzetes hellenicus* (Mahunka, 1977) (*Nellacarus*)  
Distribución: Grecia.
- *Microzetes mirandus* (Berlese, 1908) (*Sphaerozetes (Tectoribates)*)  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Microzetes petrocoriensis* (Grandjean, 1936) (*Nellacarus*)  
Distribución: Europa centromeridional.
- *Microzetes phitosi* (Mahunka, 1979) (*Nellacarus*)  
Distribución: Grecia.
- *Microzetes pyrenaicus* (Travé, 1956) (*Nellacarus*)  
Distribución: Suroeste de Europa.
- *Microzetes sestai* Mahunka, 1982  
Distribución: Grecia.
- \*• *Microzetes simplisetus* (Mahunka, 1998) (*Nellacaroides*)  
Distribución: Uganda y Marruecos.
- *Microzetes viedmai* Subías, Ruiz y Kahwash, 1990  
Distribución: España.
- ♣ *Miracarus* Kunst, 1959  
Especie tipo: *Miracarus hurkai* Kunst, 1959  
Distribución: Paleártica.
- *Miracarus discrepans* Mahunka, 1966  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Miracarus hurkai* Kunst, 1959  
Distribución: Centro de Europa meridional.
- *Miracarus senensis* Bernini, 1975  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Miracarus similis* Subías e Iturrondobeitia, 1978  
(=*Miracarus abeloosi* Lions, 1979)  
Distribución: Mediterránea.
- ▲ *Zetorcheostoidea* Michael, 1898
- ♦ *Zetorchestidae* Michael, 1898  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- ♣ *Belorchestes* Grandjean, 1951  
Especie tipo: *Belorchestes planatus* Grandjean, 1951  
Distribución: Paleártica.
- *Belorchestes gebennicus* Grandjean, 1957  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Belorchestes planatus* Grandjean, 1951  
Distribución: Europa meridional.
- *Belorchestes sectus* Pérez-Íñigo y Peña, 1996  
Distribución: Mediterránea occidental.
- ♣ *Litholestes* Grandjean, 1951  
Especie tipo: *Litholestes altitudinis* Grandjean, 1951  
Distribución: Paleártica.
- *Litholestes altitudinis* Grandjean, 1951  
Distribución: Europa central.
- ♣ *Microzetorchestes* Balogh, 1943  
(=*Diorchestes* Grandjean, 1951)  
Especie tipo: *Zetorchestes emeryi* Coggi, 1898  
Distribución: Paleártica.
- *Microzetorchestes emeryi* (Coggi, 1898) (*Zetorchestes*)  
(=*Zetorchestes consanguineus* Oudemans, 1902)  
(=*Zetorchestes italicus* Eyndhoven, 1942)  
Distribución: Paleártica centromeridional.



- ♣ **Saxicolestes** Grandjean, 1951  
Especie tipo: *Saxicolestes auratus* Grandjean, 1951  
Distribución: Paleártica.
- *Saxicolestes auratus* Grandjean, 1951  
Distribución: Europa meridional.
  - *Saxicolestes corsicanus* Grandjean, 1956  
Distribución: Mediterránea occidental.
  - *Saxicolestes pollinivorus* Travé, 1963  
Distribución: Francia.
- ♣ **Strenzkea** Travé, 1967  
Especie tipo: *Strenzkea depilata* Travé, 1967  
Distribución: Paleártica.
- *Strenzkea depilata* Travé, 1967  
Distribución: Paleártica occidental.
- ♣ **Zetorchestes** Berlese, 1888  
(=*Leptorchistis* Canestrini y Berlese, 1885, “*nom. praeoc.*” por *Leptorchestes* Thorell, 1870)  
(=*Phyllorchestes* Mahunka, 1983)  
Especie tipo: *Carabodes micronychus* Berlese, 1883  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Zetorchestes flabrarius* Grandjean, 1951  
Distribución: Mediterránea.
  - *Zetorchestes grandjeani* Krisper, 1987  
Distribución: Europa meridional.
- Zetorchestes micronychus* (Berlese, 1883) (*Carabodes*)
- *Zetorchestes micronychus micronychus* (Berlese, 1883)  
(=*Zetorchestes falzonii* Coggi, 1898)  
Distribución: Paleártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, y Este de Rusia asiática).
  - *Zetorchestes micronychus unicorniculatus* Lombardini, 1961 “*ssp. inq.*”  
Distribución: Italia.
  - *Zetorchestes phyllosetus* Mahunka, 1977  
Distribución: Mediterránea oriental.
  - *Zetorchestes reticulatus* Karppinen y Poltavskaja, 1990  
Distribución: Cáucaso.
  - *Zetorchestes saltator* Oudemans, 1915  
Distribución: Oriental (frecuente) y Paleártica: Ucrania (Crimea) y Corea.
  - *Zetorchestes schusteri* Krisper, 1984  
Distribución: Neotropical e I. Canarias.
- ▲ **Gustavioidea** Oudemans, 1900
- ◆ **Astegistidae** Balogh, 1961  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- ♣ **Astegistes** Hull, 1916  
(=*Cultrozetes* Sellnick, 1922)  
Especie tipo: (*Li acarus bicornis* Warburton y Pearce, 1905) =*Zetes pilosus* Koch, 1841  
Distribución: Paleártica.
- *Astegistes pilosus* (Koch, 1841) (*Zetes*) (= *Li acarus bicornis* Warburton y Pearce, 1905) (= *Acarus muscorum* Scopoli, 1763 “*sp. inq.*”)  
Distribución: Paleártica: Europa (menos frecuente en el Sur) y Paleártica oriental meridional.
- ♣ **Cultroribula** Berlese, 1908  
Especie tipo: *Notaspis juncta* Michael, 1885  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Cultroribula bicultrata* (Berlese, 1905) (*Dameosoma*)  
(=*Cultroribula falcata* Evans, 1952)  
(=*Cultroribula szentivanyi* Balogh, 1943)  
(=*Cultroribula trifurcata* Jacot, 1939)  
(=*Cultroribula trifurcata rotundata* Krivolutsky, 1962)  
Distribución: Holártica (frecuente en Paleártica) y Java.
  - *Cultroribula confinis* Berlese, 1908  
Distribución: Europa meridional.
  - *Cultroribula juncta* (Michael, 1885) (*Notaspis*)  
Distribución: Holártica (Europa y U.S.A. oriental).
  - *Cultroribula neonominata* Subías, 2004  
(=*Cultroribula tridentata* Aoki, 1965, “*nom. praeoc.*” por Mihelčič, 1958)  
Distribución: Paleártica: Cáucaso y Este de Paleártica oriental (frecuente).
- ♣ **Furcoribula** Balogh, 1943  
Especie tipo: *Notaspis furcillata* Nordenskiöld, 1901  
Distribución: Holártica.
- *Furcoribula furcillata* (Nordenskiöld, 1901) (*Notaspis*)  
(=*Notaspis bicuspidata* Štorkán, 1925)  
(=*Eremaeus copulatus* Oudemans, 1906)  
(=*Cultroribula confinis magna* Ewing, 1917)  
Distribución: Holártica (Europa centrooriental, Paleártica oriental y U.S.A.: Illinois).
  - *Furcoribula pacifica* Krivolutsky, 1975  
Distribución: Paleártica (Cáucaso y Este de Paleártica oriental).
- ◆ **Ceratoppiidae** Kunst, 1971  
Distribución: Cosmopolita.
- ♣ **Ceratoppia** Berlese, 1908  
(?= *Notaspis* Hermann, 1804 “*gen. inq.*”)  
Especie tipo: *Notaspis bipilis* Hermann, 1804  
Distribución: Holártica, Oriental, ¿Neotropical? y “Australiana”.
- *Ceratoppia abchasic* Krivolutsky y Tarba, 1971  
Distribución: Cáucaso.
  - *Ceratoppia bipilis* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)  
(=*Murcia acuminata* Koch, 1841)  
(=*Oribata badius* Koch, 1839)  
(=*Oppia cornuta* Koch, 1844)  
(=*Ceratoppia herculeana* Berlese, 1908)

(=*Oribata politus* Koch y Berendt, 1854)

Distribución: Holártica (frecuente), Noreste de Oriental y ¿Centroamérica?.

• *Ceratoppia quadridentata* (Haller, 1882)

(*Notaspis bipilis* q.)

(=*Ceratoppia quadridentata arctica* Hammer, 1955)

Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y Neártica septentrional) y China suroriental.

• *Ceratoppia sexpilosa* Willmann, 1938

Distribución: Holártica (Europa, Este de Paleártica oriental y Neártica septentrional).

♣ **Parapyroppia** Pérez-Íñigo y Subías, 1979

Especie tipo: (*Parapyroppia monodactyla* Pérez-Íñigo y Subías, 1979) =*Oribella cornuta* Berlese, 1910

Distribución: Holártica.

• *Parapyroppia cornuta* (Berlese, 1910)

(*Oribella*)

(=*Oribella magna* Mihelčič, 1957)

(=*Parapyroppia monodactyla* Pérez-Íñigo y Subías, 1979)

Distribución: Mediterránea.

♣ **Pyroppia** Hammer, 1955

Especie tipo: *Pyroppia lanceolata* Hammer, 1955

Distribución: Holártica, Oriental y Neotropical.

• *Pyroppia lanceolata* Hammer, 1955

Distribución: Holártica: Paleártica occidental (Cáucaso), Paleártica oriental (Noreste de Rusia), y Neártica septentrional.

• *Pyroppia tajikistanica* Krivolutsky y Christov, 1970

Distribución: Paleártica meridional (Cáucaso y Asia centrooccidental) y Méjico.

♦ **Metrioppiidae** Balogh, 1943

Distribución: Holártica.

♣ **Metrioppia** Grandjean, 1931

(=*Peloppia* Sellnick, 1931)

Especie tipo: *Metrioppia helvetica*

Grandjean, 1931

Distribución: Holártica.

• *Metrioppia helvetica* Grandjean, 1931

(=*Ceratoppia microseta* Hammer, 1952)

Distribución: Holártica (Europa centromeridional, Paleártica oriental y Neártica).

♦ **Gustaviidae** Oudemans, 1900

Distribución: Holártica y Etiópica.

♣ **Gustavia** Kramer., 1879

(=*Neozetes* Berlese, 1885)

(=*Serrarius* Michael, 1883)

Especie tipo: (*Gustavia sol* Kramer, 1879)

=*Leiosoma microcephala* Nicolet, 1855

Distribución: Holártica y Paleotropical.

• *Gustavia fusifer* (Koch, 1841) (*Oribata*)

Distribución: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).

• *Gustavia longicornis* (Berlese, 1904)

(*Serrarius*)

Distribución: Mediterránea y Taiwán [Formosa].

• *Gustavia maior* (Berlese, 1904) (*Serrarius*)

(=*Gustavia microcephala longirostris* Mihelčič, 1957)

Distribución: Mediterránea.

• *Gustavia microcephala* (Nicolet, 1855)

(*Leiosoma*)

(=*Neozetes bicornis* Berlese, 1885)

(=*Gustavia sol* Kramer, 1879)

Distribución: Paleártica (frecuente), China suroriental y Méjico.

• *Gustavia oceanica* Pérez-Íñigo, 1987

Distribución: Mediterránea occidental.

♦ **Liacaridae** Sellnick, 1928

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

♣ **Adoristes** Hull, 1916

Especie tipo: *Oribata ovata* Koch, 1839

**Adoristes** (*Adoristes*) Hull, 1916

Distribución: Holártica.

*Adoristes* (*A.*) *ovatus* (Koch, 1839) (*Oribata*)

• *Adoristes* (*A.*) *ovatus ovatus* (Koch, 1839)

(=*Conoppia grandis* Berlese, 1908)

(=*Leiosoma pyrigerum* Berlese, 1888)

(=*Leiosoma truncatum* Canestrini y Fanzago, 1876)

Distribución: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Asia centrooccidental).

• *Adoristes* (*A.*) *ovatus extraneus* Mihelčič, 1955 (*A. e.*)

Distribución: Ibérica.

• *Adoristes* (*A.*) *ovatus poppei* (Oudemans, 1906) (*Liacarus p.*)

Distribución: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Oeste de Siberia y U.S.A.: Minesota).

**Adoristes** (*Gordeeviella*) Shtanchaeva,

Subías y Arillo, 2010

Especie tipo: *Adoristes* (*Gordeeviella*)

*krivolutskyi* Shtanchaeva, Subías y Arillo, 2010

Distribución: Paleártica meridional.

• *Adoristes* (*Gordeeviella*) *krivolutskyi*

Shtanchaeva, Subías y Arillo, 2009

Distribución: Cáucaso.

♣ **Birsteinus** Krivolutsky, 1965

Especie tipo: *Birsteinus clavatus*

Krivolutsky, 1965

Distribución: Paleártica y Oriental.

• *Birsteinus clavatus* Krivolutsky, 1965

Distribución: Este de Paleártica occidental.

• *Birsteinus microchaetus* Krivolutsky, 1967

Distribución: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental: excepto Oeste).

• *Birsteinus perlongus* Krivolutsky, 1965

Distribución: Paleártica meridional

(Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional).

♠ *Liacarus* Michael, 1898

Especie tipo: *Oribata nitens* Gervais, 1844

*Liacarus* (*Liacarus*) Michael, 1898

(=*Leiosoma* Nicolet, 1855, “*nom. praeoc.*” por Stephens, 1829)

(=*Leuroxenillus* Woolley e Higgins, 1966)

(=*Stenoxenillus* Woolley e Higgins, 1966)

Distribución: Holártica y Palearctica.

*Liacarus* (*L.*) *brevilamellatus* Mihelčič, 1955

• *Liacarus* (*L.*) *brevilamellatus brevilamellatus* Mihelčič, 1955

(=*Liacarus cartalinicus* Djaparidze, 1979)

(=*Liacarus internodentatus* Kulijev, 1962)

(=*Liacarus ovalis* Mihelčič, 1956)

(=*Liacarus vastus* Mihelčič, 1956)

Distribución: Paleártica meridional

(Mediterránea e Irán).

• *Liacarus* (*L.*) *brevilamellatus major* Mihelčič, 1955 (*L. m.*)

Distribución: Europa meridional.

• *Liacarus* (*L.*) *chroniosus* Woolley, 1968

(=*Liacarus robustus* Mihelčič, 1954, “*nom. praeoc.*” por Ewing, 1918)

Distribución: Europa centromeridional.

• *Liacarus* (*L.*) *coracinus* (Koch, 1841) (*Oribata*)

(=*Liacarus lencoranicus* Krivolutsky, 1967)

(=*Liacarus nitidulus* Krivolutsky, 1967)

(=*Liacarus parvus* Mihelčič, 1954)

(=*Leiosoma similis* Nicolet, 1855)

(=*Liacarus vombi* Dalenius, 1950)

Distribución: Paleártica (frecuente) e

I. Santa Helena.

• *Liacarus* (*L.*) *granulatus* Willmann, 1940

Distribución: Eslovenia.

• *Liacarus* (*L.*) *incisus* (Grobler, Ozman y Cobanoglu, 2003) (*Stenoxenillus*)

Distribución: Turquía.

• *Liacarus* (*L.*) *jordanai* Moraza y Pérez-Íñigo, 1979

Distribución: España.

• *Liacarus* (*L.*) *koeszegiensis* Balogh, 1943

(=*Liacarus sejunctus* Mihelčič, 1954)

Distribución: Europa centromeridional.

• *Liacarus* (*L.*) *laterostris* Mihelčič, 1954

Distribución: Europa centromeridional.

• *Liacarus* (*L.*) *longipilis* Shtanchaeva, Subías y Arillo, 2010

Distribución: Cáucaso.

• *Liacarus* (*L.*) *madeirensis* Willmann, 1939

Distribución: Mediterránea occidental.

• *Liacarus* (*L.*) *mucronatus* Willmann, 1939

Distribución: Holártica meridional

(Mediterránea occidental y U.S.A.: Carolina del Norte).

• *Liacarus* (*L.*) *nitens* (Gervais, 1844) (*Oribata*)

Distribución: Holártica (Paleártica

occidental, Este de Paleártica oriental y U.S.A.: Virginia).

• *Liacarus* (*L.*) *perezinigo* Capilla, 1972

Distribución: Mediterránea.

• *Liacarus* (*L.*) *reticulatus* Mahunka, 1966

Distribución: Italia.

• *Liacarus* (*L.*) *subiasi* Shtanchaeva, 2008

Distribución: Mediterránea (Cáucaso y España).

• *Liacarus* (*L.*) *subterraneus* (Koch, 1844)

(*Oribata*)

(=*Liacarus gracilis* Mihelčič, 1954)

(=*Leiosoma lativentris* Nicolet, 1855)

(=*Liacarus willmanni* Pschorn-Walcher, 1951)

Distribución: Holártica (Paleártica

occidental: frecuente, Suroeste de Siberia y

U.S.A.: Virginia).

• *Liacarus* (*L.*) *tubifer* Djaparidze y Melamud, 1990

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Liacarus* (*L.*) *xylariae* (Schrank, 1803) (*Acarus*)

(=*Liacarus cuspidatus* Mihelčič, 1954)

(=*Oribata fusca* Koch, 1841)

(=*Liacarus sphaericus* Djaparidze, 1980)

(=*Liacarus translamellatus* Kulijev, 1962)

Distribución: Paleártica (frecuente).

• *Liacarus* (*Dorycranosus*) Woolley, 1969

Especie tipo: *Liacarus abdominalis* Banks, 1906

Distribución: Holártica.

• *Liacarus* (*Dorycranosus*) *acutus* Pschorn-Walcher, 1951 (*L.*)

(=*Liacarus claviger* Mihelčič, 1956)

(=*Liacarus coracinus racovitzae* Trägårdh, 1912)

(=*Cultroribula grandis* Mihelčič, 1956)

(=*Liacarus infissus* Gunhold, 1953)

Distribución: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).

• *Liacarus* (*Dorycranosus*) *angustatus*

(Weigmann, 1976) (*D.*)

Distribución: I. Azores.

• *Liacarus* (*Dorycranosus*) *badghysi* Krivolutsky, 1966 (*L.*)

Distribución: Paleártica meridional

(Ucrania: Crimea, y Asia centrooccidental).

• *Liacarus* (*Dorycranosus*) *dickersoni* (Moraza, 1990) (*D.*)

Distribución: España.

• *Liacarus* (*Dorycranosus*) *djaparidzae* Subías, 2010

(=*Dorycranosus ovatus* Djaparidze, 1973, “*nom. praeoc.*” por Mihelčič, 1954)

Distribución: Cáucaso.

• *Liacarus* (*Dorycranosus*) *musaevi*

(Shtanchaeva, 2008) (*D.*)

Distribución: Cáucaso.

• *Liacarus* (*Dorycranosus*) *punctulatus* Mihelčič, 1956 (*L.*)

(=*Liacarus diversus* Mihelčič, 1956)

Distribución: Mediterránea.

• *Liacarus* (*Dorycranosus*) *splendens* (Coggi, 1898) (*Cepheus*)

(=*Liacarus alatus* Berlese, 1904)

(=*Liacarus ghilarovi* Bashkirova, 1958)

(=*Liacarus moraviacus* Willmann, 1954)

Distribución: Paleártica centromeridional

(frecuente).

- *Liacarus (Dorycranosus) zachvatkini* Kulijev, 1962 (L.)  
(=*Dorycranosus ibericus* Djaparidze, 1973)  
Distribución: Mediterránea oriental e Irán.
- ♣ **Planoristes** Iturrondobeitia y Subías, 1978  
Especie tipo: *Planoristes acuspidatus*  
Iturrondobeitia y Subías, 1978  
Distribución: Paleártica.
- *Planoristes acuspidatus* Iturrondobeitia y Subías, 1978  
Distribución: España.
- ♣ **Scarabacarus** Shtanchaeva y Subías, 2010  
Especie tipo: *Scarabacarus longisensillus*  
Shtanchaeva y Subías, 2010  
Distribución: Paleártica meridional.
- *Scarabacarus longisensillus* Shtanchaeva y Subías, 2010  
Distribución: Cáucaso.
- ♦ **Xenillidae** Woolley e Higgins, 1966  
Distribución: Holártica, Oriental y Neotropical.
- **Xenillus** Robineau-Desvoidy, 1839  
Especie tipo: *Xenillus clypeator* Robineau-Desvoidy, 1839  
**Xenillus (Xenillus)** Robineau-Desvoidy, 1839  
(=*Banksia* Oudemans y Voigts, 1905)  
(=*Dinoxenillus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980)  
(=*Kochia* Oudemans, 1900)  
(=*Pseudocephus* Jacot, 1928)  
Distribución: Holártica, Oriental y Neotropical.
- *Xenillus (X.) adela* Pérez-Íñigo y Peña, 1996  
Distribución: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) anasillus* Woolley e Higgins, 1966  
Distribución: Líbano.
- *Xenillus (X.) arilloi* Gil-Martín y Subías, 1997  
Distribución: España.
- *Xenillus (X.) athesis* Schatz, 2004  
Distribución: Italia.
- *Xenillus (X.) clavatopilus* Mihelčič, 1966  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Xenillus (X.) clypeator* Robineau-Desvoidy, 1839  
(=*Cepheus latus* Nicolet, 1855)  
(=*Cepheus permixtus* André, 1925)  
Distribución: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Paleártica oriental: excepto Norte, y U.S.A.: Michigan) y Méjico.
- *Xenillus (X.) confusus* Mahunka, 1979  
Distribución: Grecia.
- Xenillus (X.) discrepans* Grandjean, 1936  
(*X. permixtus d.*)
- *Xenillus (X.) discrepans discrepans* Grandjean, 1936  
(=*Xenillus baderi* Mahunka, 1996)  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).
- *Xenillus (X.) discrepans azorensis* Pérez-Íñigo, 1987  
Distribución: I. Azores.
- *Xenillus (X.) discrepans canariensis* Pérez-Íñigo, 1976  
Distribución: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) erbanensis* Pérez-Íñigo y Peña, 1996  
Distribución: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) fernandoi* Morell, 1989  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Xenillus (X.) halophilus* Weigmann, 2011  
Distribución: Portugal.
- *Xenillus (X.) ibericus* Djaparidze, 1974  
Distribución: Cáucaso.
- *Xenillus (X.) latilamellatus* Willmann, 1939  
Distribución: Macaronésica (Madeira).
- *Xenillus (X.) lebanonensis* Woolley, 1970  
Distribución: Líbano.
- *Xenillus (X.) longipilus* Pérez-Íñigo y Peña, 1996  
Distribución: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) moyae* Pérez-Íñigo y Peña, 1994  
Distribución: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) penicilliger* Csiszár, 1962  
Distribución: Sureste de Europa.
- *Xenillus (X.) pulvillus* Pérez-Íñigo y Peña, 1996  
Distribución: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) sculptrus* Kulijev, 1963  
(=*Xenillus stepensis* Djaparidze, 1974)  
Distribución: Cáucaso.
- *Xenillus (X.) selgae* Morell, 1987  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Xenillus (X.) setosus* Grobler, Ozman y Cobanoglu, 2003  
Distribución: Turquía.
- *Xenillus (X.) tegeocranus* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)  
(=*Cepheus bifidatus* Nicolet, 1855)  
(=*Cepheus vulgaris* Nicolet, 1855)  
Distribución: Paleártica (frecuente) y China suroriental.
- *Xenillus (X.) tuberculatus* Subías y Arillo, 2000  
Distribución: España.
- *Xenillus (X.) ybarrai* Morell, 1987  
Distribución: España.
- Xenillus (Stonyxenillus)** Woolley e Higgins, 1966  
Especie tipo: *Stonyxenillus spilotus* Woolley e Higgins, 1966  
Distribución: Holártica.
- *Xenillus (Stonyxenillus) gephyrus* (Woolley, 1970) (S.)  
Distribución: Líbano.
- ♦ **Tenuialidae** Jacot, 1929  
Distribución: Holártica.
- ♣ **Hafenferrefia** Jacot, 1939  
(=*Hafenferrefiella* Sellnick, 1952)  
Especie tipo: *Galumna nitidula* Banks, 1906  
Distribución: Holártica.
- *Hafenferrefia imperialis* (Berlese, 1910) (*Achipteria*) “sp. inq.”  
Distribución: Italia (Sicilia).

- *Hafenferrefia nevesi* (Sellnick, 1952) (*Hafenrefferiella*) (= *Hafenrefferiella hyrcanica* Krivolutsky, 1967)  
Distribución: Mediterránea.
- ♣ ***Hafenrefferia*** Oudemans, 1906  
Especie tipo: *Oribata gilvipes* Koch, 1839  
Distribución: Paleártica.
- *Hafenrefferia gilvipes* (Koch, 1839) (*Oribata*) (= *Liacarus auritus* Nordenskiöld, 1901) (= *Liacarus pterotus* Coggi, 1900)  
Distribución: Paleártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Sur, y Paleártica oriental: excepto Norte).
- ♣ ***Tenuiala*** Ewing, 1913  
Especie tipo: *Tenuiala nuda* Ewing, 1913  
Distribución: Holártica.
- *Tenuiala crenulata* Woolley e Higgins, 1966  
Distribución: Líbano.
- ▲ ***Eremaoidea*** Oudemans, 1900
- ◆ ***Kodiakellidae*** Hammer, 1967  
Distribución: Holártica.
- ♣ ***Kodiakella*** Hammer, 1967  
Especie tipo: *Kodiakella lutea* Hammer, 1967  
Distribución: Holártica.
- *Kodiakella dimorpha* Pérez-Íñigo y Subías, 1978  
Distribución: Mediterránea occidental.
- ◆ ***Eremaidae*** Oudemans, 1900  
Distribución: Holártica y Oriental.
- ♣ ***Caucaseremaeus*** Subías y Shtanchaeva, 2006  
Especie tipo: *Caucaseremaeus krivolutskyi* Shtanchaeva y Subías, 2006  
Distribución: Paleártica.
- *Caucaseremaeus krivolutskyi* Shtanchaeva y Subías, 2006  
Distribución: Cáucaso.
- ♣ ***Eremaeus*** Koch, 1835  
Especie tipo: *Eremaeus hepaticus* Koch, 1835  
Distribución: Holártica y Oriental.  
*Eremaeus hepaticus* Koch, 1835
- *Eremaeus hepaticus hepaticus* Koch, 1835 (= *Notaspis dentilamellatus* Štorkán, 1925) (= *Eremaeus hepaticus acruciata* Mihelčič, 1952) (= *Eremaeus magnus* Mihelčič, 1957) (= *Eremaeus ovalis* Mihelčič, 1955, “*nom. praeoc.*” por Koch, 1841)  
Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Virginia).
- *Eremaeus hepaticus cordiformis* Grandjean, 1934 (*E. c.*) (= *Eremaeus setiger* Mihelčič, 1957)  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Eremaeus longiseta* Djaparidze, 1990  
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Eremaeus tenuisetiger* Aoki, 1970  
Distribución: Paleártica (Cáucaso y Este de Paleártica oriental).
- *Eremaeus translamellatus* Hammer, 1952 (= *Eremaeus oblongus borealis* Strenzke, 1952)  
Distribución: Holártica.
- *Eremaeus tuberosus* Gordeeva, 1970  
Distribución: Este de Paleártica occidental.
- ♣ ***Eueremaeus*** Mihelčič, 1963 (= *Kartoeremaeus* Higgins, 1979)  
Especie tipo: *Eremaeus oblongus* Koch, 1835  
Distribución: Holártica y Oriental.
- *Eueremaeus brevifer* (Mahunka, 1980) (*Eremaeus*)  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Eueremaeus cornutus* (Lombardini, 1943) (*Eremaeus*) “*sp. inq.*”  
Distribución: Italia.
- *Eueremaeus foveolatus* (Hammer, 1952) (*Eremaeus*)  
Distribución: Holártica.
- Eueremaeus oblongus* (Koch, 1835) (*Eremaeus*)
- *Eueremaeus oblongus oblongus* (Koch, 1835) (= *Eremaeus areolatus* Kunst, 1959) (= *Eremaeus figuratus* Winkler, 1956) (= *Eremaeus intermedius* Mihelčič, 1955) (= *Eueremaeus kuehneli* Mihelčič, 1963)  
Distribución: Holártica (frecuente) y China suroriental.
- *Eueremaeus oblongus granulatus* (Mihelčič, 1955) (*Eremaeus g.*) (= *Eremaeus ornatus* Mihelčič, 1957) (= *Eremaeus silvestris* Forsslund, 1957)  
Distribución: Holártica (frecuente).
- *Eueremaeus oblongus valkanovi* (Kunst, 1957) (*Eremaeus v.*)  
Distribución: Paleártica centromeridional.
- *Eueremaeus quadrilamellatus* (Hammer, 1952) (*Eremaeus*) (= *Eremaeus fossulatus* Kunst, 1959) (= *Eueremaeus valkanovi debilis* Mihelčič, 1963)  
Distribución: Holártica (Neártica septentrional y Europa centromeridional).
- *Eueremaeus travei* Mihelčič, 1963 (?= *Eremaeus oblongus major* Mihelčič, 1957 “*sp. inq.*”)  
Distribución: Europa meridional.
- *Eueremaeus triglavensis* (Tarman, 1958) (*Eremaeus*)  
Distribución: Europa meridional.
- ♣ ***Tricheremaeus*** Berlese, 1908  
Especie tipo: *Notaspis serrata* Michael, 1885  
Distribución: Paleártica.
- *Tricheremaeus abnobensis* Miko y Weigmann, 2006  
Distribución: Europa centromeridional.
- *Tricheremaeus conspicuus* Berlese, 1916

- Distribución: Europa centromeridional.
- *Tricheremaeus grandjeani* Bernini, 1970  
Distribución: Italia.
  - *Tricheremaeus nemosensis* Grandjean, 1963  
Distribución: Europa meridional.
  - *Tricheremaeus serratus* (Michael, 1885) (*Notaspis*)  
Distribución: Europa occidental.
  - *Tricheremaeus travei* Miko, 1993  
Distribución: Europa centrooccidental.
- ▲ **Ameroidea** Bulanova-Zachvatkina, 1957
- ◆ **Ctenobelbidae** Grandjean, 1965  
Distribución: Paleártica y Oriental.
- ♣ **Ctenobelba** Balogh, 1943  
Especie tipo: *Eremobelba pectiniger* Berlese, 1908
- Ctenobelba** (*Ctenobelba*) Balogh, 1943 (= *Elapheremaeus* Grandjean, 1944)  
Distribución: Paleártica y Oriental.
- *Ctenobelba* (*C.*) *apatomorpha* Iturrondobeitia, Saloña, Andrés y Caballero, 1998  
Distribución: España.
  - *Ctenobelba* (*C.*) *foliata* Hammer, 1961  
Distribución: Europa meridional.
  - *Ctenobelba* (*C.*) *grancanariae* Pérez-Íñigo y Peña, 1997  
Distribución: I. Canarias.
  - *Ctenobelba* (*C.*) *heterosetosa* Murvanidze y Weigmann, 2007  
Distribución: Cáucaso.
  - *Ctenobelba* (*C.*) *mahnerti* Mahunka, 1974  
Distribución: Europa meridional.
  - *Ctenobelba* (*C.*) *marcuzzii* Mahunka, 1974  
Distribución: Italia.
  - *Ctenobelba* (*C.*) *parafoliata* Pérez-Íñigo jr., 1991  
Distribución: España (I. Baleares).
  - *Ctenobelba* (*C.*) *pectiniger* (Berlese, 1908) (*Eremobelba*) (= *Amerobelba bicarinata* Berlese, 1910) (= *Ctenobelba fenestrata* Pérez-Íñigo jr., 1990) (? = *Notaspis maculosa* Warburton y Pearce, 1905 “*sp. inq.*”)  
Distribución: Europa centromeridional (frecuente).
  - *Ctenobelba* (*C.*) *perezinigo* Moraza, 1985  
Distribución: Mediterránea occidental.
  - *Ctenobelba* (*C.*) *pilosella* Jeleva, 1962 (= *Ctenobelba tuberculata* Kulijev, 1966)  
Distribución: Mediterránea.
  - *Ctenobelba* (*C.*) *pulchellula* Gil-Martín y Subías, 1997  
Distribución: España.
  - *Ctenobelba* (*C.*) *serrata* Mahunka, 1964  
Distribución: Europa meridional.
  - *Ctenobelba* (*C.*) *simplex* (Willmann, 1940) (*Eremobelba*)  
Distribución: Bosnia-Herzegovina.
  - *Ctenobelba* (*C.*) *translamellata* Iordansky, 1990  
Distribución: Mediterránea oriental.

- Ctenobelba** (*Bifurcobelba*) Subías y Shtanchaeva, 2010  
Especie tipo: *Ctenobelba* (*Bifurcobelba*) *iberica* Subías y Shtanchaeva, 2010  
Distribución: Paleártica meridional.
- *Ctenobelba* (*Bifurcobelba*) *iberica* Subías y Shtanchaeva, 2010  
Distribución: España.
- Ctenobelba** (*Caucasiobelba*) Subías y Shtanchaeva, 2010  
Especie tipo: *Ctenobelba* (*Caucasiobelba*) *reticulata* Subías y Shtanchaeva, 2010  
Distribución: Paleártica meridional.
- *Ctenobelba* (*Caucasiobelba*) *reticulata* Subías y Shtanchaeva, 2010  
Distribución: Cáucaso.
- ◆ **Amerobelbidae** Grandjean, 1961  
Distribución: Holártica.
- ♣ **Amerobelba** Berlese, 1908  
Especie tipo: *Amerobelba decedens* Berlese, 1908  
Distribución: Paleártica meridional.
- *Amerobelba decedens* Berlese, 1908 (= *Eremobelba maxima* Willmann, 1951)  
Distribución: Paleártica meridional (Europa centromeridional e Irán).
- ♣ **Berndamerus** Mahunka, 1977  
Especie tipo: *Berndamerus hellenicus* Mahunka, 1977  
Distribución: Paleártica.
- *Berndamerus bicostatus* (Berlese, 1910) (*Amerobelba*)  
Distribución: Mediterránea.
  - *Berndamerus eremuloides* (Berlese, 1910) (*Amerobelba*)  
Distribución: Europa meridional.
  - *Berndamerus hellenicus* Mahunka, 1977  
Distribución: Grecia.
- ♣ **Hellenamerus** Mahunka, 1974  
Especie tipo: *Hellenamerus ionicus* Mahunka, 1974  
Distribución: Paleártica.
- *Hellenamerus ionicus* Mahunka, 1974  
Distribución: Mediterránea.
- ♣ **Mongaillardia** Grandjean, 1961  
Especie tipo: *Mongaillardia callitoca* Grandjean, 1961  
Distribución: Paleártica y Etiópica.
- *Mongaillardia aeoliana* (Bernini, 1979) (*Amerobelba*)  
Distribución: Mediterránea occidental.
  - *Mongaillardia callitoca* Grandjean, 1961  
Distribución: Europa meridional
  - *Mongaillardia eveana* Grandjean, 1961  
Distribución: Europa occidental.
- ♣ **Rastellobata** Grandjean, 1961  
Especie tipo: *Amerobelba rastelligera*

- Berlese, 1908  
Distribución: Paleártica.
- *Rastellobata rastelligera* (Berlese, 1908) (*Amerobelba*)  
Distribución: Mediterránea.
- ◆ **Eremulidae** Grandjean, 1965  
Distribución: Cosmopolita.
- ♣ **Eremulus** Berlese, 1908  
Especie tipo: *Eremulus flagellifer* Berlese, 1908  
Distribución: Cosmopolita.
  - *Eremulus antis* Poltavskaja, 1987  
Distribución: Mediterránea oriental.
  - *Eremulus avenifer* Berlese, 1913  
Distribución: Paleártica meridional (Italia y Paleártica oriental meridional), Oriental (frecuente) y Polinesia (Tahití).
  - *Eremulus clavatoflagellatus* Lombardini, 1963 “*sp. inq.*”  
Distribución: Italia.
  - *Eremulus elegans* Gordeeva, 1987  
Distribución: Ucrania (Crimea).
  - *Eremulus flagellifer* Berlese, 1908 (= *Eremulus modestus* Berlese, 1908)  
Distribución: Cosmopolita: Paleártica (menos frecuente en el Norte), Neártica (U.S.A.: Washington D.C.), Etiópica (Congo), Noreste de Oriental, Australiana y subantártica (I. St. Paul).
- ◆ **Damaeolidae** Grandjean, 1965  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- ♣ **Damaeolus** Paoli, 1908  
Especie tipo: *Dameosoma asperatum* Berlese, 1904  
Distribución: Holártica y Etiópica.
  - *Damaeolus asperatus* (Berlese, 1904) (*Dameosoma*)  
Distribución: Holártica (Paleártica: excepto Norte, y U.S.A.: Columbia).
  - *Damaeolus bregetovae* Csiszár, 1962  
Distribución: Mediterránea.
  - *Damaeolus cellulatus* Subías, Ruiz y Kahwash, 1990  
Distribución: España.
  - *Damaeolus magnus* Mahunka, 1979  
Distribución: Grecia.
  - *Damaeolus ornatissimus* Csiszár, 1962  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).
- ♣ **Fosseremus** Grandjean, 1954  
Especie tipo: *Dameosoma laciniatum* Berlese, 1905  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Fosseremus laciniatus* (Berlese, 1905) (*Dameosoma*) (= *Fosseremus africanus* Balogh, 1958) (= *Damaeolus ornatus* Mihelčič, 1956)
- (= *Damaeolus pistillifer* Berlese, 1913)  
(= *Fosseremus quadripertitus* Grandjean, 1965)  
(= *Damaeolus saltaensis* Hammer, 1958)  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica): frecuente.
- ◆ **Hungarobelbidae** Miko y Travé, 1996  
Distribución: Paleártica.
- ♣ **Hungarobelba** Balogh, 1943  
Especie tipo: *Belba visnyai* Balogh, 1938  
Distribución: Paleártica.
  - *Hungarobelba pyrenaica* Miko y Travé, 1996  
Distribución: Oeste de Europa.
  - *Hungarobelba visnyai* (Balogh, 1938) (*Belba*)  
Distribución: Paleártica (Europa centromeridional y Este de Paleártica oriental).
- ◆ **Eremobelbidae** Balogh, 1961  
Distribución: Pantropical y subtropical.
- ♣ **Eremobelba** Berlese, 1908  
Especie tipo: *Eremaeus leporosus* Haller, 1884  
Distribución: Pantropical y subtropical.
  - *Eremobelba geographica* Berlese, 1908  
Distribución: Europa centromeridional.
  - *Eremobelba gracilior* Berlese, 1908 (= *Eremobelba leporosa flagellaris* Jacot, 1938) (= *Oribata neosota* Banks, 1909) (= *Eremobelba nervosa* Hartenstein, 1962)  
Distribución: Holártica (Neártica oriental y Cáucaso) y Méjico.
  - *Eremobelba longisetosa* Subías, Ruiz y Kahwash, 1990  
Distribución: España.
- ◆ **Ameridae** Bulanova-Zachvatkina, 1957  
Distribución: Pantropical y subtropical.
- ♣ **Amerus** Berlese, 1896  
Especie tipo: *Belba troisi* Berlese, 1883  
**Amerus** (**Amerus**) Berlese, 1896  
Distribución: Paleártica.
  - *Amerus* (*A.*) *cuspidatus* Avanzati, Salomone, Baratti y Bernini, 2003  
Distribución: Mediterránea.
  - *Amerus* (*A.*) *polonicus* Kulczynski, 1902  
Distribución: Europa centromeridional e Irán.
  - *Amerus* (*A.*) *troisi* (Berlese, 1883) (*Belba*)  
Distribución: Mediterránea.
- Amerus** (**Neamerus**) Willmann, 1939  
Especie tipo: *Amerus* (*Neamerus*) *lundbladi* Willmann, 1939  
Distribución: Paleártica.
- *Amerus* (*Neamerus*) *lundbladi* Willmann, 1939 (?= *Amerus laticephalus* Berlese, 1915 “*sp. inq.*”)  
Distribución: Mediterránea occidental.
- ▲ **Eremelloidea** Balogh, 1961
- ◆ **Caleremaeidae** Grandjean, 1965

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

- ♣ **Caleremaeus** Berlese, 1910  
Especie tipo: *Damaeus monilipes* Michael, 1882  
Distribución: Holártica y Neotropical.
- *Caleremaeus monilipes* (Michael, 1882) (*Damaeus*)  
Distribución: Paleártica occidental (frecuente) y Méjico.
- ♦ **Eremellidae** Balogh, 1961  
Distribución: Pantropical y subtropical.
- \* ♣ **Eremella** Berlese, 1913  
(=**Proteremella** Balogh, 1959)  
Especie tipo: *Eremella vestita* Berlese, 1913  
Distribución: Pantropical y Paleártica meridional.
- \* • *Eremella pulchella* (Balogh, 1959) (*Proteremella*)  
Distribución: Europa centromeridional.
- ♣ **Triteremella** Kunst, 1971  
(=**Afreremella** Mahunka, 1974)  
Especie tipo: *Eremella kaszabi* Csiszár, 1962  
Distribución: Paleártica y Etiópica.
- *Triteremella kaszabi* (Csiszár, 1962) (*Eremella*)  
(?= *Licneremaeus tuberculatus* Paoli, 1908 “*sp. inq.*”)  
Distribución: Europa centromeridional.
- ♦ **Oribellidae** Kunst, 1971  
Distribución: Holártica, Etiópica y “Oriental”.
- ♣ **Kaszabobates** Balogh, 1972  
(=**Gobiella** Balogh y Mahunka, 1965, “*nom. praeoc.*” por Cienkowsky, 1882)  
Especie tipo: *Gobiella kaszabi* Balogh y Mahunka, 1965  
Distribución: Paleártica.
- *Kaszabobates olbiopolitanus* Sergienko, 1980  
Distribución: Mediterránea oriental.
- ♣ **Montizetes** Kunst, 1971  
Especie tipo: *Xenillus alpestris* Willmann, 1929  
Distribución: Holártica.
- *Montizetes abulensis* Pérez-Íñigo, 1984  
Distribución: Ibérica.
- *Montizetes alpestris* (Willmann, 1929) (*Xenillus*)  
Distribución: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional).
- *Montizetes delamellatus* Pérez-Íñigo jr., 1991  
Distribución: España.
- \* • *Montizetes rarisetosus* Bayartogtokh, 1998  
Distribución: Mongolia y Cáucaso.

- ♣ **Oribella** Berlese, 1908  
(=**Infernobates** Karppinen y Poltavskaja, 1990)  
Especie tipo: *Notaspis pectinata* Michael, 1885  
Distribución: Holártica.
- *Oribella canariensis* Pérez-Íñigo, 1986  
Distribución: I. Canarias.
- *Oribella citelli* (Karppinen y Poltavskaja, 1990) (*Infernobates*)  
Distribución: Mediterránea oriental.
- *Oribella fujikawae* Mahunka, 1982  
Distribución: Grecia.
- *Oribella matritensis* Arillo, Bordel y Subías, 1988  
Distribución: España.
- *Oribella pectinata* (Michael, 1885) (*Notaspis*)  
(=*Dameosoma crinitum* Berlese, 1916)  
(=*Oribata distincta* Karpelles, 1893)  
(=*Xenillus limburgiensis* Oudemans, 1912)  
Distribución: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Asia centrooccidental y U.S.A.: Nuevo Méjico).
- ♣ **Oribellopsis** Kunst, 1971  
(=**Gemmazetes** Fujikawa, 1979)  
Especie tipo: *Oribella cavatica* Kunst, 1962  
Distribución: Holártica.
- *Oribellopsis cavaticus* (Kunst, 1962) (*Oribella*)  
Distribución: Holártica (Paleártica: Europa centromeridional, Mongolia y Noreste de China, y Neártica septentrional).
- *Oribellopsis etruscus* (Bernini, 1980) (*Gemmazetes*)  
Distribución: Italia.
- *Oribellopsis grecus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2010  
Distribución: Grecia.
- ♣ **Pantelozetes** Grandjean, 1953  
Especie tipo: *Xenillus paolii* Oudemans, 1913  
Distribución: Holártica y “Oriental”.
- *Pantelozetes berlesei* Fujikawa, 1979  
Distribución: Europa suroccidental.
- *Pantelozetes paolii* (Oudemans, 1913) (*Xenillus*)  
(=*Amazoppia caucasica* Djaparidze, 1986)  
(=*Oribella dentata* Mihelčič, 1956)  
(=*Oribella pannonica* Mahunka, 1969)  
(=*Oribella paolii multidentata* Evans, 1954)  
(=*Pantelozetes paolii tuxeni* Fujikawa, 1979)  
Distribución: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Asia centrooccidental y Neártica septentrional) y Java.
- ♦ **Spinozetidae** Balogh, 1972  
Distribución: Paleártica.
- ♣ **Iberoppia** Pérez-Íñigo, 1986  
Especie tipo: *Iberoppia paradoxa* Pérez-Íñigo, 1986  
Distribución: Paleártica.



- *Iberoppia paradoxa* Pérez-Iñigo, 1986  
Distribución: España.
- ♣ *Spinozetes* Piffel, 1966  
(=*Mirus* Kulijev, 1967)  
Especie tipo: *Spinozetes inexpectatus* Piffel, 1966  
Distribución: Paleártica.
- *Spinozetes inexpectatus* Piffel, 1966  
Distribución: Sureste de Europa.
- *Spinozetes pectinatus* (Kulijev, 1967) (*Mirus*)  
Distribución: Cáucaso.
- ▲ **Oppioidea** Sellnick, 1937
- ◆ **Autognetidae** Grandjean, 1960  
Distribución: Holártica y subtropical austral (excepto Etiópica).
- ♣ *Autogneta* Hull, 1916  
Especie tipo: *Notaspis longilamellata* Michael, 1885  
*Autogneta (Autogneta)* Hull, 1916  
Distribución: Holártica.
- *Autogneta (A.) longilamellata* (Michael, 1885) (*Notaspis*)  
Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y Neártica septentrional).
- *Autogneta (A.) parva* Forsslund, 1947  
(=*Autogneta rugosa* Mihelčič, 1956)  
Distribución: Paleártica.
- *Autogneta (A.) penicillum* Grandjean, 1960  
Distribución: Oeste de Europa.
- *Autogneta (A.) traegardhi* Forsslund, 1947  
Distribución: Holártica (Paleártica y Canadá).
- Autogneta (Rhaphigneta)* Grandjean, 1960  
Especie tipo: *Rhaphigneta numidiana* Grandjean, 1960  
Distribución: Paleártica meridional.
- *Autogneta (Rhaphigneta) flagellata* (Mahunka, 1977) (R.)  
Distribución: Grecia.
- *Autogneta (Rhaphigneta) numidiana* (Grandjean, 1960) (R.)  
Distribución: Mediterránea.
- ♣ *Conchogneta* Grandjean, 1963  
Especie tipo: (*Autogneta dalecarlica* Forsslund, 1947) =*Dameosoma willmanni* Dyradowska, 1929  
Distribución: Holártica.  
*Conchogneta willmanni* (Dyradowska, 1929) (*Dameosoma*)
- *Conchogneta willmanni willmanni* (Dyradowska, 1929)  
(=*Autogneta dalecarlica* Forsslund, 1947)  
(=*Oppia talischica* Kulijev, 1962)  
Distribución: Paleártica.
- *Conchogneta willmanni herzegowinensis* (Willmann, 1941) (*Oppia*)  
Distribución: Bosnia-Herzegovina.
- ♣ *Cosmogneta* Grandjean, 1960  
Especie tipo: *Cosmogneta impedita* Grandjean, 1960  
Distribución: Paleártica y Neotropical.
- *Cosmogneta cassolai* Bernini, Baratti y Avanzati, 1991  
Distribución: Suroeste de Europa.
- *Cosmogneta impedita* Grandjean, 1960  
Distribución: Francia y Méjico.
- *Cosmogneta kargi* Grandjean, 1963  
Distribución: Europa centrooccidental.
- *Cosmogneta ozkani* Toluk, Ayyildiz y Subías, 2007  
Distribución: Turquía.
- ◆ **Thyrisomidae** Grandjean, 1953  
Distribución: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
- ♣ *Banksinoma* Oudemans, 1930  
(=*Thyrisoma* Grandjean, 1953)  
Especie tipo: (*Notaspis lanceolata* Michael “sensu” Oudemans, 1930) =*Banksinoma lanceolata oudemansi* Fujikawa, 1979  
Distribución: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
- *Banksinoma lanceolata* (Michael, 1885) (*Notaspis*)  
(?=*Zetes dorsatus* Koch, 1841 “sp. inq.”)  
(?=*Zetes flavipes* Koch, 1841 “sp. inq.”)  
(=*Banksinoma lanceolata islandica* Fujikawa, 1979)  
Distribución: Paleártica (excepto Este): frecuente, y Hawai.
- ◆ **Oppiidae** Sellnick, 1937  
[**Antilloppiinae**] Mahunka, 1985  
Distribución: Neotropical y subtropical (Holártica meridional).
- ♣ *Joboppia* Ruiz, Mínguez y Subías, 1988  
Especie tipo: *Neoppia (Joboppia) dichosa* Ruiz, Mínguez y Subías, 1988  
Distribución: Holártica.
- *Joboppia dichosa* (Ruiz, Mínguez y Subías, 1988) (*Neoppia (J.)*)  
Distribución: España y “U.S.A.”
- *Joboppia expansum* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)  
Distribución: Mediterránea.
- ♣ *Neoppia* Bhattacharya y Banerjee, 1981  
(=*Antilloppia* Mahunka, 1985)  
Especie tipo: *Neoppia minuta* Bhattacharya y Banerjee, 1981  
Distribución: Neotropical y subtropical (Paleártica meridional).
- *Neoppia bayoumii* (Al-Assiuty y El-Deeb, 1983) (*Multioppia*)  
Distribución: Egipto.
- *Neoppia discreta* Ruiz, Mínguez y Subías, 1988  
Distribución: Europa meridional.
- [**Paternoppiinae**] Gil-Martín, Subías y Arillo,

2000

Distribución: Paleártica.

♣ ***Paternoppia*** Gil-Martín, Subías y Arillo, 2000Especie tipo: *Paternoppia**andalusicabulensis* Gil-Martín, Subías y Arillo, 2000

Distribución: Paleártica.

• *Paternoppia andalusicabulensis* Gil-Martín, Subías y Arillo, 2000

Distribución: España.

[**Oppiinae**] Sellnick, 1937

Distribución: Cosmopolita.

♣ ***Lasiobelba*** Aoki, 1959Especie tipo: *Lasiobelba remota* Aoki, 1959***Lasiobelba (Lasiobelba)*** Aoki, 1959(=*Cilioppia* Balogh, 1983)

Distribución: Pantropical y subtropical.

• *Lasiobelba (L.) arcidiaconoae* (Bernini, 1973) (*Oppia*)

Distribución: Mediterránea e India

(Tripura).

• *Lasiobelba (L.) decui* (Vasiliev e Ivan, 1995) (*Cilioppia*)

Distribución: Israel.

• *Lasiobelba (L.) hesperidiana* (Pérez-Íñigo, 1986) (*Cilioppia*)

Distribución: Mediterránea occidental.

• *Lasiobelba (L.) neominata* Subías, 2004 (=*Oppia yodai africana* Kok, 1967, “*nom praeoc.*” por Evans, 1953)

Distribución: Etiópica (Sudáfrica y Malgache), Hawai y Paleártica meridional (Mediterránea occidental e Irán).

• *Lasiobelba (L.) pori* (Vasiliev e Ivan, 1995) (*Cilioppia*)

Distribución: Israel.

***Lasiobelba (Antennoppia)*** Mahunka, 1983(=*Daedaloppia* Hauser y Mahunka, 1983)Especie tipo: *Antennoppia minor* Mahunka, 1983

Distribución: Pantropical, subtropical (Paleártica meridional) y Neártica.

• *Lasiobelba (Antennoppia) izquierdoae* Arillo, Gil-Martín y Subías, 1994 (*L.*)

Distribución: I. Canarias.

• *Lasiobelba (Antennoppia) quadriseta* Subías, 1989 (*L.*)(=*Lasiobelba icaria* Mahunka, 2001)

Distribución: Grecia.

♣ ***Neoamerioppia*** Subías, 1989Especie tipo: *Amerioppia decemsetosa*

Hammer, 1973

Distribución: Pantropical y subtropical.

• *Neoamerioppia abchasica* (Golosova y Tarba, 1974) (*Oppia*)

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Neoamerioppia flagellata* (Hammer, 1975) (*Amerioppia*)

Distribución: Sahara.

• *Neoamerioppia hamidi* (Al-Assiuty y El-Deeb, 1983) (*Amerioppia*)

Distribución: Egipto.

♣ ***Niloppia*** Balogh, 1983Especie tipo: *Oppia sticta* Popp, 1960

Distribución: Paleártica.

• *Niloppia sticta* (Popp, 1960) (*Oppia*)

Distribución: Egipto.

♣ ***Oppia*** Koch, 1836(=*Dameosoma* Berlese, 1892)Especie tipo: *Oppia nitens* Koch, 1836

Distribución: Cosmopolita (excepto

Australiana).

• *Oppia denticulata* (G. y R. Canestrini, 1882) (*Belba*)(=*Oppia cyclosoma* Mihelčič, 1955)(=*Oppia grandis* Mihelčič, 1955)(=*Oppia willmanni* Oudemans, 1937)

Distribución: Paleártica (Paleártica

occidental: menos frecuente en el Norte, Irán y Sur de Siberia) y Antillas (La Española: R. Dominicana).

• *Oppia neominata* Subías, 2004(=*Oppia concolor tridentata* Pérez-Íñigo, 1976, “*nom. praeoc.*” por Forsslund, 1942)

Distribución: I. Canarias.

• *Oppia nitens* Koch, 1836(=*Belba minuta* Banks, 1895)(=*Dameosoma myrmecophilum* Sellnick, 1928)(=*Oribata perolata* Banks, 1909)

Distribución: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Asia centrooccidental y Neártica oriental).

♣ ***Pluritrichoppia*** Subías y Arillo, 1989Especie tipo: *Pluritrichoppia insolita* Subías

y Arillo, 1989

Distribución: Paleártica.

• *Pluritrichoppia insolita* Subías y Arillo, 1989

Distribución: España.

♣ ***Taiwanoppia*** Tseng, 1982***Taiwanoppia (Paragloboppia)*** Subías, 1989Especie tipo: *Oppia diversiseta* Mahunka,

1985

Distribución: Pantropical (excepto Oriental) y subtropical.

• *Taiwanoppia (Paragloboppia) mercedesae* (Arillo y Subías, 1997) (*Vietoppia (P.)*)

Distribución: España.

[**Multioppiinae**] Balogh, 1983

Distribución: Cosmopolita.

♣ ***Anomaloppia*** Subías, 1978Especie tipo: *Anomaloppia canariensis*

Subías, 1978

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica, Neotropical y Antártica).

• *Anomaloppia canariensis* Subías, 1978

Distribución: I. Canarias.

- *Anomaloppia chitinofincta* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia central rusa).
- *Anomaloppia differens* Mahunka y Topercer, 1983  
Distribución: Europa centromeridional.
- *Anomaloppia madeirensis* Arillo y Subías, 1990  
Distribución: Macaronésica (Madeira).
- *Anomaloppia mazandaranica* Akrami y Subías, 2007  
Distribución: Paleártica meridional (Cáucaso e Irán).
- *Anomaloppia ozkani* Ayyildiz, 1989 (= *Anomaloppia iranica* Bayartogtokh y Akrami, 2000)  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental e Irán).
- ♣ *Graptoppia* Balogh, 1983  
Especie tipo: (*Dameosoma foveolatum* Paoli “sensu” Bernini, 1973) = *Graptoppia paraanalis* Subías y Rodríguez, 1985  
***Graptoppia (Graptoppia)*** Balogh, 1983 (= *Fronduppia* Mahunka, 1983)  
Distribución: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical.
- *Graptoppia (G.) neonominata* Subías, 2004 (= *Oppia parva* Kok, 1967, “*nom. praeoc.*” por Lombardini, 1952)  
Distribución: Sudáfrica y Europa meridional.
- *Graptoppia (G.) paraanalis* Subías y Rodríguez, 1985 (= *Stenoppia italica quinquepilosa* Morell, 1987)  
Distribución: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).
- Graptoppia (G.) sundensis* (Hammer, 1979) (*Oppia*)
- *Graptoppia (G.) sundensis acuta* Ayyildiz, 1989  
Distribución: Mediterránea oriental.
- *Graptoppia (G.) tanaïtica* Karppinen y Poltavskaja, 1990  
Distribución: Mediterránea oriental.
- Graptoppia (Apograptoppia)*** Subías y Rodríguez, 1985  
Especie tipo: *Dameosoma foveolatum* Paoli, 1908  
Distribución: Holártica.
- *Graptoppia (Apograptoppia) foveolata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*) (= *Graptoppia (Apograptoppia) paolii* Ohkubo, 1993)  
Distribución: Holártica (Paleártica meridional: Mediterránea e Irán, y Canadá).
- Graptoppia (Stenoppia)*** Balogh, 1983  
Especie tipo: (*Oppia heterotricha* Bernini, 1969) = *Oppia italica* Bernini, 1973  
Distribución: Tropical (Etiópica y Neotropical) y subtropical (excepto Australiana).
- *Graptoppia (Stenoppia) italica* (Bernini, 1973) (*Oppia*) (= *Oppia heterotricha* Bernini, 1969, “*nom. praeoc.*” por Balogh y Mahunka, 1969)  
Distribución: Mediterránea occidental.
- ♣ ***Javieroppia*** Mínguez y Subías, 1986  
Especie tipo: *Javieroppia cervus* Mínguez y Subías, 1986  
Distribución: Paleártica meridional y Australiana.
- *Javieroppia cervus* Mínguez y Subías, 1986  
Distribución: España y Australia.
- ♣ ***Multioppia*** Hammer, 1961  
Especie tipo: *Multioppia radiata* Hammer, 1961  
***Multioppia (Multioppia)*** Hammer, 1961  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Multioppia (M.) ghiljarovi* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)  
Distribución: Paleártica (Mediterránea oriental y Este de Rusia asiática).
- *Multioppia (M.) gilmartinoi* Subías y Arillo, 1996  
Distribución: España.
- *Multioppia (M.) glabra* (Mihelčič, 1955) (*Oppia*)  
Distribución: Europa centrooriental y Oeste de Siberia.
- *Multioppia (M.) insulana* Pérez-Íñigo, 1982  
Distribución: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón], Hawai y Macaronésica (Madeira).
- *Multioppia (M.) integra* Pérez-Íñigo jr., 1990  
Distribución: España.
- *Multioppia (M.) jandiae* Pérez-Íñigo y Peña, 1996  
Distribución: I. Canarias.
- *Multioppia (M.) neglecta* Pérez-Íñigo, 1969 (= *Multioppia excisa* Moritz, 1971)  
Distribución: Holártica (Europa: excepto Este, y U.S.A.: Nuevo Méjico) y Hawai.
- *Multioppia (M.) turcica* Toluk, Ayyildiz y Subías, 2009  
Distribución: Turquía.
- Multioppia (Furculoppia)*** Balogh, 1983  
Especie tipo: *Oppia furcata* Kunst, 1958  
Distribución: Paleártica.
- *Multioppia (Furculoppia) furcata* (Kunst, 1958) (*Oppia*) (= *Oppia bulgarica* Mahunka, 1987) (= *Oppia ramulifera* Kunst, 1959)  
Distribución: Europa meridional.
- Multioppia (Hammeroppia)*** Vasiliu e Ivan, 2009  
Especie tipo: *Multioppia wilsoni* Aoki, 1964  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Multioppia (Hammeroppia) canariensis* Pérez-Íñigo y Peña, 1996 (*M.*)  
Distribución: I. Canarias.
- Multioppia (Hammeroppia) wilsoni* Aoki, 1964
- *Multioppia (Hammeroppia) wilsoni wilsoni* Aoki, 1964  
(?= *Oppia carolinae* Jacot, 1938 “*sp. inq.*”)  
(?= *Oppia carolinae barbatis* Jacot, 1938 “*sp.*”)

inq.”)

Distribución: Cosmopolita (excepto Neotropical y Antártica).

- *Multioppia (Hammeroppia) wilsoni laniseta* Moritz, 1966 (*M. l.*)  
(?= *Oppia caporiacci* Valle, 1955 “*sp. inq.*”)  
(?= *Dameosoma clavipectinatum lamellatum* Thamdruk, 1932 “*sp. inq.*”, “*nom. praeoc.*” por Halbert, 1923)  
(?= *Oppia insolita* Mihelčič, 1956 “*sp. inq.*”)  
(?= *Oppia sexmaculata* Dalenius, 1950 “*sp. inq.*”)

Distribución: Paleártica occidental (frecuente), Paleártica oriental (excepto Este), “USA.” y Venezuela.

***Multioppia (Multilanceoppia)*** Subías, 1989

Especie tipo: *Multioppia ramulifera carpatica* Schalk, 1966

- *Multioppia (Multilanceoppia) carpatica* Schalk, 1966 (*Multiop. ramulifera c.*)  
Distribución: Mediterránea oriental.

♣ ***Pseudoamerioppia*** Subías, 1989

(= ***Minoricoppia*** Pérez-Íñigo jr., 1991)

Especie tipo: *Oppia barrancensis paraguayensis* Balogh y Mahunka, 1981

Distribución: Pantropical, subtropical (Paleártica meridional) y Neártica.

- *Pseudoamerioppia balearica* (Pérez-Íñigo jr., 1991) (*Minoricoppia*)  
Distribución: España.

- *Pseudoamerioppia paraguayensis* (Balogh y Mahunka, 1981) (*Oppia barrancensis p.*)  
Distribución: Neotropical e I. Canarias.

♣ ***Pulchroppiella*** Balogh, 1983

Especie tipo: *Oppia plurisetosa* Mihelčič, 1956

Distribución: Paleártica.

- *Pulchroppiella plurisetosa* (Mihelčič, 1956) (*Oppia*)  
Distribución: Europa meridional.

♣ ***Ramonoppia*** Morell, 1990

Especie tipo: *Ramonoppia amparoae* Morell, 1990

Distribución: Paleártica.

- *Ramonoppia aequiseta* (Pérez-Íñigo jr., 1990) (*Multioppia*)  
Distribución: España.
- *Ramonoppia amparoae* Morell, 1990  
Distribución: España.

♣ ***Ramusella*** Hammer, 1962

Especie tipo: *Ramusella puertomontensis* Hammer, 1962

***Ramusella (Ramusella)*** Hammer, 1962

(= ***Alcioppia*** Balogh, 1983)  
(= ***Amolops*** Hull, 1916, “*nom. praeoc.*” por Cope, 1865)

(= ***Bioppia*** Mahunka y Paoletti, 1984)

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Ramusella (R.) assimiloides* Subías y

Rodríguez, 1987

Distribución: Mediterránea occidental.

- *Ramusella (R.) clavipectinata* (Michael, 1885) (*Notaspis*)

(= *Oppia alamellata* Kardar, 1976)

(= *Dameosoma alces* Jacot, 1934)

(= *Oppia assimilis* Mihelčič, 1956)

(= *Oppia taminae* Rjabinin, 1975)

Distribución: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, U.S.A.: California, I. Seychelles, Oriental y Hawai).

- *Ramusella (R.) confusa* Arillo y Subías, 1990

Distribución: Macaronésica (Madeira).

- *Ramusella (R.) defectuosa* Subías y Rodríguez, 1987

Distribución: España.

- *Ramusella (R.) gyrata* (Mahunka y Paoletti, 1984) (*Bioppia*)

Distribución: Italia.

- *Ramusella (R.) junonis* Pérez-Íñigo, 1986

Distribución: Mediterránea occidental y Norte de Neotropical.

- *Ramusella (R.) puertomontensis* Hammer, 1962

Distribución: Tropical (India: Bengala Occidental, Melanesia: I. Fiji, y Chile) y Paleártica meridional (Mediterránea y Este de Rusia asiática).

*Ramusella (R.) sengbuschi* Hammer, 1968

- *Ramusella (R.) sengbuschi sengbuschi* Hammer, 1968

Distribución: Pantropical (excepto Etiópica) y subtropical.

- *Ramusella (R.) sengbuschi tokyoensis* (Aoki, 1974) (*Oppia*)

(= *Ramusella tuberculata* Mahunka y Topercer, 1983)

Distribución: Paleártica meridional.

- *Ramusella (R.) translamellata* Subías, 1980

Distribución: Mediterránea.

***Ramusella (Insculptoppia)*** Subías, 1980

Especie tipo: *Dameosoma insculptum* Paoli, 1908

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Ramusella (Insculptoppia) anuncata* Subías y Rodríguez, 1986

Distribución: Mediterránea.

- *Ramusella (Insculptoppia) berninii* (Pérez-Íñigo, 1975) (*Oppia*)

Distribución: España.

- *Ramusella (Insculptoppia) corniculata* Pérez-Íñigo y Peña, 1997

Distribución: I. Canarias.

- *Ramusella (Insculptoppia) elliptica* (Berlese, 1908) (*Lohmannia*)

(= *Ramusella abarkouhiensis* Bayartogtokh y Akrami, 2000)

(= *Insculptoppia lamellata* Pérez-Íñigo jr., 1991)

Distribución: Holártica meridional (Mediterránea: frecuente, Irán y U.S.A.: Nuevo Méjico) y Costa Rica.

- *Ramusella (Insculptoppia) ermani* Baran, 2010 (*R.*)

- Distribución: Turquía.
- *Ramusella (Insculptoppia) furcata* (Willmann, 1928) (*Dameosoma*)  
Distribución: Europea.
  - *Ramusella (Insculptoppia) golbasiensis* Baran, 2010 (*R.*)  
Distribución: Turquía.
  - *Ramusella (Insculptoppia) insculpta* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)  
(=*Oppia shaldybinae* Kulijev, 1962)  
(=*Ramusella insularis* Rjabinin, 1987)  
Distribución: Paleártica occidental (excepto Norte): frecuente, Paleártica oriental (Este de Paleártica oriental e Irán) y Vietnam.
  - *Ramusella (Insculptoppia) krivolutskyi* (Kulijev, 1966) (*Oppia*)  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
  - *Ramusella (Insculptoppia) luxtoni* (Ayyildiz, 1989) (*Gressittoppia*)  
Distribución: Turquía.
  - *Ramusella (Insculptoppia) pinarbasiensis* Ayyildiz, Toluk y Taskiran, 2010  
Distribución: Turquía.
  - *Ramusella (Insculptoppia) ramulifera* Subías y Shtanchaeva, 2011  
Distribución: España.
  - *Ramusella (Insculptoppia) salmani* Toluk y Ayyildiz, 2008  
Distribución: Turquía.
  - *Ramusella (Insculptoppia) soror* (Balogh, 1958) (*Oppia*)  
Distribución: África centrooriental y Cáucaso.
  - *Ramusella (Insculptoppia) terricola* Subías y Rodríguez, 1986  
Distribución: Mediterránea.
- Ramusella (Insculptoppiella)*** Subías y Rodríguez, 1986  
Especie tipo: *Oppia alfonsii* Bernini, 1980  
Distribución: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical.
- *Ramusella (Insculptoppiella) alejnicovae* (Krivolutsky y Gatilova, 1974) (*Oppia*)  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional).
  - *Ramusella (Insculptoppiella) alfonsii* (Bernini, 1980) (*Oppia*)  
Distribución: Italia.
  - *Ramusella (Insculptoppiella) elongata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)  
Distribución: Europa meridional.
  - *Ramusella (Insculptoppiella) paillei* (Mahunka, 1980) (*Oppia*)  
Distribución: Marruecos.
  - *Ramusella (Insculptoppiella) varians* (Wallwork, 1961) (*Oppia*)  
Distribución: Etiópica (Ghana e I. Santa Helena) y Suroeste de Paleártica oriental.
- Ramusella (Rectoppia)*** Subías, 1980  
Especie tipo: *Oppia mihelcici* Pérez-Íñigo, 1965
- Distribución: Cosmopolita (excepto Australiana).
- *Ramusella (Rectoppia) debililamellata* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)  
Distribución: Cáucaso.
  - *Ramusella (Rectoppia) eduardoi* Arillo y Subías, 1996  
Distribución: España.
- Ramusella (Rectoppia) fasciata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
- *Ramusella (Rectoppia) fasciata fasciata* (Paoli, 1908)  
Distribución: Paleáretica (Europa centromeridional y Corea), “U.S.A. (Florida)”, Somalia, India (Tripura) e “I. Amsterdam”.
  - *Ramusella (Rectoppia) fasciata sahariensis* (Hammer, 1975) (*Oppia s.*)  
Distribución: Mediterránea (frecuente).
  - *Ramusella (Rectoppia) mihelcici* (Pérez-Íñigo, 1965) (*Oppia*)  
(=*Oppia guelticola* Hammer, 1975)  
Distribución: Paleártica (menos frecuente en el Norte) y Venezuela.
  - *Ramusella (Rectoppia) rhinina* Subías y Mínguez, 1981  
Distribución: España.
- Ramusella (Rectoppia) strinatii* (Mahunka, 1980) (*Oppia*)
- *Ramusella (Rectoppia) strinatii strinatii* (Mahunka, 1980)  
Distribución: Mediterránea.
  - *Ramusella (Rectoppia) strinatii curtiramosa* Subías y Rodríguez, 1987  
Distribución: Mediterránea (España y Caucaso)
- ♣ ***Ramuselloppia*** Subías y Rodríguez, 1986  
Especie tipo: *Ramuselloppia anomala* Subías y Rodríguez, 1986  
Distribución: Paleártica.
- *Ramuselloppia anomala* Subías y Rodríguez, 1986  
Distribución: Ibérica.
- ♣ ***Tainsculptoppia*** Subías y Shtanchaeva, 2011  
Especie tipo: *Tainsculptoppia graptoppioides* Subías y Shtanchaeva, 2011  
Distribución: Paleártica.
- *Tainsculptoppia graptoppioides* Subías y Shtanchaeva, 2011  
Distribución: España.
  - *Tainsculptoppia subiasi* (Pérez-Íñigo jr., 1990) (*Oxyoppia*)  
Distribución: España.
- [***Pulchroppiinae***] Balogh, 1983  
Distribución: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical.
- ♣ ***Multipulchroppia*** Subías, 1989  
Especie tipo: *Multioppia berndhauseri* Mahunka, 1978

Distribución: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical (Paleártica meridional).

- *Multipulchroppia graeca* (Mahunka, 1977) (*Multioppia*)

Distribución: Grecia.

[**Arcoppiinae**] Balogh, 1983

Distribución: Pantropical y subtropical.

♣ *Arcoppia* Hammer, 1977

(=*Chuoppia* Tseng, 1982)

Especie tipo: *Arcoppia brachyramosa* Hammer, 1977

Distribución: Pantropical y subtropical.

- *Arcoppia mahunkai* Rodríguez y Subías, 1984  
Distribución: I. Canarias.
- *Arcoppia perezinigo* Rodríguez y Subías, 1984  
Distribución: I. Canarias.
- *Arcoppia perisi* Rodríguez y Subías, 1984  
Distribución: I. Canarias.

[**Medioppiinae**] Subías y Mínguez, 1985

Distribución: Cosmopolita.

♣ *Discoppia* Balogh, 1983

*Discoppia* (*Cylindroppia*) Subías y Rodríguez, 1986

Especie tipo: *Oppia minus cylindrica* Pérez-Iñigo, 1965

Distribución: Tropical (Oriental y Neotropical) y subtropical.

*Discoppia* (*Cylindroppia*) *cylindrica* (Pérez-Iñigo, 1965) (*Oppia minus c.*)

- *Discoppia* (*Cylindroppia*) *cylindrica cylindrica* (Pérez-Iñigo, 1965)

(=*Oppia agricola* Fujikawa, 1982)

(=*Oppia bifidus* Bayoumi y Al-Khalifa, 1985)

(=*Oppia casuarina* Abdel-Hamid, Hussein, Bayoumi y Al-Assiuty, 1983)

(=*Oppia sitnikovae* Shereef, 1976, “*nom. praeoc.*” por Kulijev, 1962)

Distribución: Paleártica (menos frecuente en el Norte) y Panamá.

- *Discoppia* (*Cylindroppia*) *cylindrica rostroincisa* Subías y Rodríguez, 1986

Distribución: Europa centrooccidental y Antillas (La Española: R. Dominicana).

♣ *Micropoppia* Balogh, 1983

Especie tipo: *Dameosoma minus* Paoli, 1908

Distribución: Cosmopolita.

- *Micropoppia arcuata* Gordeeva y Tarba, 1990  
Distribución: Mediterránea oriental.

*Micropoppia minus* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)

- *Micropoppia minus minus* (Paoli, 1908)

(=*Oppia minus simplex* Jacot, 1938)

(=*Oppia minutissima* Sellnick, 1950)

Distribución: Cosmopolita (frecuente en Paleártica).

- *Micropoppia minus longisetosa* Subías y Rodríguez, 1988

Distribución: Mediterránea y Argentina.

♣ *Multimedioppia* Subías, 1991

Especie tipo: *Multimedioppia mirena* Subías, 1991

Distribución: Paleártica.

- *Multimedioppia mirena* Subías, 1991

Distribución: Ibérica.

♣ *Ramuloppia* Balogh, 1961

Especie tipo: *Oppia ramiseta* Balogh, 1959

Distribución: Etiópica y Paleártica meridional.

- *Ramuloppia ramiseta* (Balogh, 1959) (*Oppia*)  
Distribución: Angola y Cáucaso.

♣ *Rhinoppia* Balogh, 1983

Especie tipo: *Oppia nasuta* Moritz, 1965

*Rhinoppia* (*Rhinoppia*) Balogh, 1983

(=*Kunoppia* Mahunka, 1987)

(=*Medioppia* Subías y Mínguez, 1985)

Distribución: Cosmopolita (excepto Oriental y Antártica).

- *Rhinoppia* (*R.*) *arilloi* Subías y Shtanchaeva, 2011

Distribución: España.

- *Rhinoppia* (*R.*) *artvinensis* Toluk y Ayyildiz, 2008

Distribución: Turquía.

- *Rhinoppia* (*R.*) *berzosai* Subías y Shtanchaeva, 2011

Distribución: España.

*Rhinoppia* (*R.*) *bulanovae* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)

- *Rhinoppia* (*R.*) *bulanovae bulanovae* (Kulijev, 1962)

Distribución: Mediterránea oriental.

- *Rhinoppia* (*R.*) *bulanovae hauseri* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2000) (*Lauroppia h.*)

Distribución: Europa central y Cáucaso.

- *Rhinoppia* (*R.*) *centrodentata* (Gordeeva y Niemi, 1990) (*Medioppia*)

Distribución: Sureste de Europa.

- *Rhinoppia* (*R.*) *eduardoi* Subías y Shtanchaeva, 2011

Distribución: España.

- *Rhinoppia* (*R.*) *elifae* Toluk, Ayyildiz y Subías, 2009

Distribución: Turquía.

- *Rhinoppia* (*R.*) *exobothridialis* Toluk y Ayyildiz, 2009

Distribución: Turquía.

- *Rhinoppia* (*R.*) *gomozovae* (Gordeeva y Karppinen, 1988) (*Ctenoppiella*)

Distribución: Ucrania (Crimea).

*Rhinoppia* (*R.*) *hygrophila* (Mahunka, 1987) (*Kunoppia*)

- *Rhinoppia* (*R.*) *hygrophila hygrophila* (Mahunka, 1987)

Distribución: Europa central y Cáucaso.

- *Rhinoppia* (*R.*) *hygrophila multiciliata* Subías y Shtanchaeva, 2011

Distribución: España.

- *Rhinoppia (R.) mahunkai* Toluk, Ayyildiz y Subías, 2009  
Distribución: Turquía.
- *Rhinoppia (R.) media* (Mihelčič, 1956) (*Oppia*) (= *Medioppia templadoi* Pérez-Íñigo, 1988)  
Distribución: Mediterránea (frecuente) y Perú.
- *Rhinoppia (R.) melisi* (Valle, 1949) (*Oppia*)  
Distribución: Italia.
- *Rhinoppia (R.) minidentata* (Subías y Rodríguez, 1988) (*Medioppia*)  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Rhinoppia (R.) minimedia* (Arillo y Subías, 1990) (*Medioppia*)  
Distribución: Macaronésica (Madeira).
- *Rhinoppia (R.) monicae* Subías y Shtanchaeva, 2011  
Distribución: España.
- *Rhinoppia (R.) nasuta* (Moritz, 1965) (*Oppia*)  
Distribución: Europa centrooriental.
- Rhinoppia (R.) obsoleta* (Paoli, 1908) (*Dameosoma fallax* o.)
- *Rhinoppia (R.) obsoleta obsoleta* (Paoli, 1908) (= *Dameosoma vitrinum* Hull, 1914)  
Distribución: Paleártica (excepto Este de Paleártica oriental): frecuente, Groenlandia y Australiana (Nueva Zelanda y Hawái).
- Rhinoppia (R.) obsoleta curtiramosa* Subías y Shtanchaeva, 2011  
Distribución: España.
- *Rhinoppia (R.) ordunensis* (Iturrondobeitia y Saloña, 1988) (*Lauroppia*) (= *Oppiella acutirostris* Pérez-Íñigo jr., 1990)  
Distribución: Paleártica (Europa centrooccidental e Irán).
- *Rhinoppia (R.) parva* (Lombardini, 1952) (*Oppia*) “*sp. inq.*”  
Distribución: Italia.
- *Rhinoppia (R.) pinsapi* (Arillo y Subías, 1996) (*Medioppia*)  
Distribución: España.
- *Rhinoppia (R.) producta* (Iturrondobeitia y Arillo, 1997) (*Medioppia*)  
Distribución: España.
- *Rhinoppia (R.) samaina* (Mahunka, 2001) (*Medioppia*)  
Distribución: Grecia.
- *Rhinoppia (R.) subpectinata* (Oudemans, 1900) (*Eremaeus*) (= *Dameosoma subpectinatum aberratum* Thamdrup, 1932) (= *Oppia globosa* Mihelčič, 1956) (= *Oppia paoliana* Cooreman, 1941) (= *Oppia tuberculata* Bulanova-Zachvatkina, 1964) (= *Oppia zachvatkini* Kulijev, 1962)  
Distribución: Holártica: excepto Este de Paleártica oriental (frecuente en Paleártica occidental), y Senegal.
- *Rhinoppia (R.) tridentata* (Subías y Mínguez, 1985) (*Medioppia*)  
Distribución: España.
- *Rhinoppia (R.) trilobata* (Khanbekjan y Gordeeva, 1991) (*Medioppia*)  
Distribución: Mediterránea.
- *Rhinoppia (R.) truncata* (Iturrondobeitia y Saloña, 1988) (*Medioppia*)  
Distribución: España.
- *Rhinoppia (R.) vera* (Mihelčič, 1956) (*Oppia*)  
Distribución: Mediterránea.
- *Rhinoppia (R.) zaballosi* Subías y Shtanchaeva, 2011  
Distribución: Marruecos.
- Rhinoppia (Bipectinoppia)*** Subías y Shtanchaeva, 2011  
Especie tipo: *Rhinoppia (Bipectinoppia) outereloi* Subías y Shtanchaeva, 2011  
Distribución: Paleártica meridional.
- *Rhinoppia (Bipectinoppia) bipectinata* (Akrami y Subías, 2007) (*Medioppia*)  
Distribución: Paleártica meridional (Cáucaso e Irán).
- *Rhinoppia (Bipectinoppia) emarginata* Toluk y Ayyildiz, 2009 (*R.*)  
Distribución: Turquía.
- *Rhinoppia (Bipectinoppia) outereloi* Subías y Shtanchaeva, 2011  
Distribución: Portugal.
- *Rhinoppia (Bipectinoppia) plumata* (Gordeeva y Karppinen, 1988) (*Ctenoppiella*)  
Distribución: Cáucaso.
- *Rhinoppia (Bipectinoppia) tasdemiri* Toluk y Ayyildiz, 2008 (*R.*)  
Distribución: Turquía.
- *Rhinoppia (Bipectinoppia) variopectinata* Toluk y Ayyildiz, 2008 (*R.*)  
Distribución: Turquía.
- ♣ ***Serratoppia*** Subías y Mínguez, 1985  
Especie tipo: *Oppia serrata* Mihelčič, 1956  
Distribución: Paleártica y Neotropical.
- *Serratoppia guanicola* Subías y Arillo, 1996  
Distribución: España.
- *Serratoppia intermedia* Subías y Rodríguez, 1988  
(?= *Serratoppia toletana* Muñoz-Mingarro, 1987 “*sp. inq.*”)  
Distribución: Ibérica.
- *Serratoppia minima* Subías y Rodríguez, 1988  
Distribución: Ibérica y Costa Rica.
- *Serratoppia mitrofanovi* (Gordeeva y Karppinen, 1988) (*Berniniella*)  
Distribución: Ucrania (Crimea).
- *Serratoppia serrata* (Mihelčič, 1956) (*Oppia*)  
Distribución: Paleártica occidental (excepto Norte) y Venezuela.
- [***Oppiellinae***] Seniczak, 1975  
Distribución: Cosmopolita.
- ♣ ***Abchasiella*** Gordeeva y Tarba, 1990  
Especie tipo: *Abchasiella dentata* Gordeeva y Tarba, 1990  
Distribución: Paleártica.
- *Abchasiella dentata* Gordeeva y Tarba, 1990  
Distribución: Cáucaso.

♣ **Berniniella** Balogh, 1983

Especie tipo: *Oppia aeoliana* Bernini, 1973

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Oriental y Neotropical).

• *Berniniella aeoliana* (Bernini, 1973) (*Oppia*)

Distribución: Mediterránea.

• *Berniniella bicarinata* (Paoli, 1908)

(*Dameosoma*)

(=*Oppia triconica* Mihelčič, 1956)

Distribución: Paleártica (frecuente) y

Vietnam.

• *Berniniella carinatissima* Subías, Rodríguez y

Mínguez, 1987

Distribución: Mediterránea.

• *Berniniella conjuncta* (Strenzke, 1951) (*Oppia sigma c.*)

Distribución: Europa centromeridional.

• *Berniniella extrudens* Subías, Rodríguez y

Mínguez, 1987

Distribución: España.

• *Berniniella formosa* Gordeeva y Karppinen, 1988

Distribución: Ucrania (Crimea).

• *Berniniella inornata* (Mihelčič, 1957) (*Oppia*)  
(=*Oppia simplex* Mihelčič, 1956, “*nom. praeoc.*”  
por Jacot, 1938)

Distribución: Mediterránea (frecuente).

• *Berniniella intrudens* Subías, Rodríguez y

Mínguez, 1987

Distribución: España y Cuba.

• *Berniniella jahnae* (Sellnick, 1961) (*Oppia*)

Distribución: Mediterránea.

• *Berniniella latidens* Subías, Rodríguez y

Mínguez, 1987

Distribución: Europa centromeridional.

• *Berniniella minuta* (Bulanova-Zachvatkina, 1964) (*Oppia*)

Distribución: Este de Paleártica occidental.

• *Berniniella parasigma* Iturrodobeitia, 1987

Distribución: Mediterránea (España y Turquía).

• *Berniniella sakeni* Gordeeva y Tarba, 1990

Distribución: Cáucaso.

*Berniniella serratirostris* (Golosova, 1970)

(*Oppia*)

• *Berniniella serratirostris serratirostris*

(Golosova, 1970)

Distribución: Holártica (Europa

centromeridional, Este de Paleártica oriental y U.S.A.: Carolina del Norte).

• *Berniniella serratirostris hauseri* (Mahunka, 1974) (*Oppia*)

(=*Berniniella coronata* Mahunka y Paoletti, 1984)

(=*Oppiella rafalskii* Oplotna y Rajski, 1983)

Distribución: Paleártica occidental (excepto Norte) y Asia centrooccidental.

• *Berniniella serratirostris oscensis* Pérez-Iñigo jr., 1990 (*B. coronata o.*)

Distribución: España.

• *Berniniella setilonga* Iturrodobeitia y Saloña, 1988

Distribución: Europa centrooccidental.

• *Berniniella sigma* (Strenzke, 1951) (*Oppia*)

Distribución: Paleártica (Europa y Asia centrooccidental).

• *Berniniella silvatica* (Vasiliu y Călugăr, 1976)

(*Oppia*)

(?*=Oppia azerbeidjanica* Kulijev, 1962 “*sp. inq.*”)

Distribución: Europa meridional (excepto Oeste).

♣ **Dissorhina** Hull, 1916

(=*Cosmoppia* Balogh, 1983)

Especie tipo: (*Notaspis splendens* Koch

“*sensu*” Michael, 1888) =*Eremaeus ornatus* Oudemans, 1900

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).

• *Dissorhina cretensis* Mahunka, 2008

Distribución: Grecia (Creta).

• *Dissorhina longipilosa* (Kunst, 1958) (*Oppia ornata l.*)

Distribución: Europa meridional.

*Dissorhina ornata* (Oudemans, 1900) (*Eremaeus*)

• *Dissorhina ornata ornata* (Oudemans, 1900)

(=*Oppia bolei* Tarman, 1958)

(=*Dameosoma captator* Hull, 1915)

(=*Dameosoma tricarinatum* Paoli, 1908)

(=*Dameosoma vetula* Hull, 1914)

Distribución: Holártica: frecuente en Paleártica (excepto Este de Paleártica oriental) y África oriental.

• *Dissorhina ornata corniculata* (Paoli, 1908)

(*Dameosoma tricarinatum c.*)

Distribución: Europa occidental.

• *Dissorhina ornata globosa* (Paoli, 1908)

(*Dameosoma tricarinatum g.*)

Distribución: Holártica meridional (Europa meridional y U.S.A.: Florida).

• *Dissorhina ornata peloponnesiaca* (Mahunka, 1974) (*Oppia*)

Distribución: Mediterránea.

• *Dissorhina ornata tunisica* (Mahunka, 1980)

(*Oppia*)

Distribución: Túnez.

• *Dissorhina shqipetarica* Mahunka y Mahunka-Papp, 2008

Distribución: Albania.

• *Dissorhina signata* (Schwalbe, 1989) (*Oppiella*)

Distribución: Europa centromeridional

(excepto Oeste).

• *Dissorhina tricarinatoides* (Dubinina, Sosnina, Vysotskaya, Markov y Atanasov, 1966) (*Oppia*)

Distribución: Europa centromeridional.

• *Dissorhina uludagensis* Ayyildiz, Toluk y Taskiran, 2010

Distribución: Turquía.

♣ **Hypogeoppia** Subías, 1981

Especie tipo: *Hypogeoppia terricola* Subías,

1981

Distribución: Paleártica meridional, “Java” y Cuba.



- *Hypogeoppia exempta* (Mihelčič, 1958) (*Oppia*) (= *Oppia ornatissima* Mihelčič, 1953)  
Distribución: Mediterránea.
- *Hypogeoppia hypogea* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)  
Distribución: Oeste de Europa.
- *Hypogeoppia perezinigo* Subías y Arillo, 1996  
Distribución: España.
- Hypogeoppia terricola* Subías, 1981
- *Hypogeoppia terricola terricola* Subías, 1981 (= *Hypogeoppia festoneata* Moraza y Moreno, 1988)  
Distribución: Ibérica, “Java” y Cuba.
- *Hypogeoppia terricola salmanticensis* Morell, 1987 (*H. s.*)  
Distribución: España.
- ♣ *Kulievia* Vasiliu e Ivan, 1999  
Especie tipo: *Oppia paradecipiens* Kulijev, 1962  
Distribución: Paleártica.
- *Kulievia paradecipiens* (Kulijev, 1962) (*Oppia*) (= *Neotrichoppia (Confinoppia) calugarae* Mahunka, 2006)  
Distribución: Europa centromeridional (excepto Oeste).
- ♣ *Lauroppia* Subías y Mínguez, 1986 (= *Ctenoppiella* Gordeeva y Karppinen, 1988)  
Especie tipo: *Dameosoma fallax* Paoli, 1908  
Distribución: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
- *Lauroppia baetica* Arillo y Subías, 1996  
Distribución: España.
- *Lauroppia brevisimile* Mahunka y Mahunka-Papp, 2010  
Distribución: Grecia.
- *Lauroppia doris* (E. Pérez-Iñigo, 1978) (*Oppia*) (= *Lauroppia obscura* Mahunka y Mahunka-Papp, 2000)  
Distribución: Paleártica meridional (Europa centromeridional e Irán).
- *Lauroppia falcata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)  
Distribución: Paleártica.
- *Lauroppia fallax* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*) (= *Oppia aligarhiensis* Kardar, 1976) (= *Oppiella dubia* Hammer, 1962)  
Distribución: Semicosmopolita (Holártica: frecuente en Paleártica occidental, India: Uttar Pradesh, Nueva Zelanda y Chile).
- Lauroppia maritima* (Willmann, 1928) (*Dameosoma falcatum m.*)
- *Lauroppia maritima maritima* (Willmann, 1928) (= *Oppia fissurata* Hammer, 1952)  
Distribución: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Sur, y Neártica septentrional).
- *Lauroppia maritima acuminata* (Strenzke, 1951) (*Oppia*)  
Distribución: Holártica (Europea, Mongolia y Neártica septentrional).
- *Lauroppia similifallax* Subías y Mínguez, 1986  
Distribución: Europa centromeridional.
- *Lauroppia tenuipectinata* Subías y Rodríguez, 1988  
Distribución: Paleártica meridional.
- ♣ *Moritzoppia* Subías y Rodríguez, 1988  
Especie tipo: *Oppia keilbachi* Moritz, 1969  
*Moritzoppia (Moritzoppia)* Subías y Rodríguez, 1988 (= *Moritzziella* Balogh, 1983, “*nom. praec.*” por Börner, 1908) (= *Tetropia* Gordeeva, 1999)  
Distribución: Holártica.
- *Moritzoppia (M.) acuta* Toluk y Ayyildiz, 2010  
Distribución: Turquía.
- *Moritzoppia (M.) escotata* (Subías y Rodríguez, 1986) (*Moritzziella*)  
Distribución: Mediterránea.
- *Moritzoppia (M.) keilbachi* (Moritz, 1969) (*Oppia*) (= *Moritzziella uherkovichi* Mahunka, 1985)  
Distribución: Paleártica.
- *Moritzoppia (M.) longilamellata* (Subías y Rodríguez, 1986) (*Moritzziella*)  
Distribución: España.
- *Moritzoppia (M.) longohisterosoma* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)  
Distribución: Cáucaso.
- *Moritzoppia (M.) oreia* Colloff y Seyd, 1991  
Distribución: Euroatlántica.
- *Moritzoppia (M.) problematica* Mahunka y Mahunka-Papp, 2002  
Distribución: Hungría y Turquía.
- *Moritzoppia (M.) sitnikovae* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)  
Distribución: Cáucaso.
- *Moritzoppia (M.) tridentata* (Forsslund, 1942) (*Oppia*)  
Distribución: Paleártica occidental (Euroatlántica y Cáucaso).
- *Moritzoppia (M.) turcica* Toluk y Ayyildiz, 2010  
Distribución: Turquía.
- Moritzoppia (M.) unicarinata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
- *Moritzoppia (M.) unicarinata unicarinata* (Paoli, 1908) (= *Oppia fixa* Mihelčič, 1956) (= *Dameosoma formosum* Hull, 1914) (= *Dameosoma minus lamellata* Halbert, 1923)  
Distribución: Holártica (frecuente en Paleártica).
- *Moritzoppia (M.) unicarinata clavigera* (Hammer, 1952) (*Oppia c.*)  
Distribución: Boreoalpina.
- *Moritzoppia (M.) unicarinata cristata* (Subías y Rodríguez, 1986) (*Moritzziella*)  
Distribución: España.
- *Moritzoppia (M.) unicarinata unicarinatoides* (Subías y Rodríguez, 1986) (*Moritzziella*)  
Distribución: Paleártica (Europa centromeridional y Este de Paleártica oriental).
- *Moritzoppia (M.) unicarinata yozgatensis* Toluk, Ayyildiz y Subías, 2007  
Distribución: Turquía.

**Moritzoppia (Moritzoppiella)** Gordeeva, 2000  
(=*Dentoppia* Gordeeva, 2001)  
(=*Drukoppia* Gordeeva, 2001)

Especie tipo: *Moritzziella microdentata*  
Gordeeva y Grishina, 1991

Distribución: Holártica, Neotropical y  
“Australiana”.

• *Moritzoppia (Moritzoppiella) neerlandica*  
(Oudemans, 1900) (*Eremaeus longilamellatus*  
n.)

(=*Oppia carniolica* Tarman, 1958)

(=*Dameosoma translamellatum* Willmann, 1923)

Distribución: Holártica (menos frecuente en  
el Sur)

• *Moritzoppia (Moritzoppiella) splendens* (Koch,  
1841) (*Oppia*)

(=*Oppia lignivora* Jacot, 1939)

(=*Moritzziella nikolskii* Gordeeva y Grishina,  
1991)

Distribución: Holártica y “Australiana”.

♣ **Neotrichoppia** Subías e Iturrondobeitia, 1980

Especie tipo: *Neotrichoppia pseudoconfinis*  
Subías e Iturrondobeitia, 1980

**Neotrichoppia (Neotrichoppia)** Subías e  
Iturrondobeitia, 1980

Distribución: Paleártica.

• *Neotrichoppia (N.) pseudoconfinis* Subías e  
Iturrondobeitia, 1980

Distribución: Ibérica.

**Neotrichoppia (Ancestroppia)** Subías y  
Rodríguez, 1986

Especie tipo: *Neotrichoppia (Ancestroppia)*  
*berninii* Subías y Rodríguez, 1986

Distribución: Paleártica.

• *Neotrichoppia (Ancestroppia) berninii* Subías y  
Rodríguez, 1986

Distribución: Mediterránea occidental.

**Neotrichoppia (Confinoppia)** Subías y  
Rodríguez, 1986

Especie tipo: *Dameosoma confine* Paoli,  
1908

Distribución: Paleártica.

• *Neotrichoppia (Confinoppia) adanata*  
Iturrondobeitia y Saloña, 1988

Distribución: España.

*Neotrichoppia (Confinoppia) confinis* (Paoli,  
1908) (*Dameosoma*)

• *Neotrichoppia (Confinoppia) confinis confinis*  
(Paoli, 1908)

Distribución: Europa centromeridional.

• *Neotrichoppia (Confinoppia) confinis tenuiseta*  
Subías y Rodríguez, 1986

Distribución: Mediterránea.

• *Neotrichoppia (Confinoppia) gibber* (Mahunka,  
1982) (*Oppia*)

Distribución: Grecia.

• *Neotrichoppia (Confinoppia) variabilis*  
Iturrondobeitia y Subías, 1981

Distribución: España.

♣ **Oppiella** Jacot, 1937

Especie tipo: (*Dameosoma corrugatum*  
Berlese, 1904) =*Eremaeus novus* Oudemans,  
1902

**Oppiella (Oppiella)** Jacot, 1937

Distribución: Cosmopolita.

*Oppiella (O.) nova* (Oudemans, 1902)  
(*Eremaeus*)

• *Oppiella (O.) nova nova* (Oudemans, 1902)  
(=*Oppiella aegyptiaca* Elbadry y Nasr, 1974)

(=*Oppiella chistyakovi* Rjabinin, 1975)

(=*Dameosoma corrugatum* Berlese, 1904)

(=*Oppiella corrugata apicalis* Jacot, 1937)

(=*Dameosoma corrugatum intralamellatum*  
Thamdrup, 1932)

(=*Oppiella corrugata squarrosa* Jacot, 1937)

(=*Dameosoma krygeri* Trägårdh, 1931)

(=*Oppia neerlandica sumatrensis* Willmann,  
1931)

(=*Oppiella orientata* Rjabinin, 1975)

(=*Oppia rossica* Bulanova-Zachvatkina, 1964)

(=*Notaspis sculptilis* Warburton y Pearce, 1905)

(=*Oppia washburni* Hammer, 1952)

Distribución: Cosmopolita (frecuente).

• *Oppiella (O.) nova palustris* Laskova, 1980

Distribución: Sureste de Europa.

• *Oppiella (O.) nova uliginosa* (Willmann, 1919)  
(*Dameosoma u.*)

Distribución: Europa centromeridional.

• *Oppiella (O.) primorica* (Golosova, 1969)  
(*Oppia*)

Distribución: Paleártica (Europa  
centrooriental y Paleártica oriental meridional).

• *Oppiella (O.) propinqua* Mahunka y Mahunka-  
Papp, 2000

Distribución: Suroeste de Europa.

**Oppiella (Perspicuoppia)** Pérez-Íñigo, 1971

Especie tipo: *Oppia perspicua* Mihelčič,  
1956

Distribución: Paleártica.

• *Oppiella (Perspicuoppia) minidentata* (Subías,  
1977) (*P.*)

Distribución: Europea.

• *Oppiella (Perspicuoppia) perspicua* (Mihelčič,  
1956) (*Oppia*)

Distribución: Mediterránea.

• *Oppiella (Perspicuoppia) turcica* Toluk y  
Ayyildiz, 2009

Distribución: Turquía.

[**Oxyoppiinae**] Subías, 1989

Distribución: Cosmopolita.

♣ **Foraminoppia** Subías y Arillo, 1998

Especie tipo: *Foraminoppia iturrondobeitai*  
Subías y Arillo, 1998

Distribución: Paleártica.

• *Foraminoppia iturrondobeitai* Subías y Arillo,  
1998

Distribución: España.

• *Foraminoppia saloniae* Subías y Arillo, 1998

Distribución: España.

♣ **Oxybrachioppia** Subías, 1989

Especie tipo: *Brachioppiella ctenifera*

- barbata* Choi, 1986  
Distribución: Paleártica.
- *Oxybrachioppia ctenifera* (Golosova, 1970) (*Oppia*)  
Distribución: Paleártica: Europa centromeridional (excepto Oeste) y Este de Paleártica oriental.
- ♣ *Oxymystroppia* Subías y Shtanchaeva, 2011  
Especie tipo: *Oxymystroppia phylloseta* Subías y Shtanchaeva, 2011  
Distribución: Paleártica.
- *Oxymystroppia phylloseta* Subías y Shtanchaeva, 2011  
Distribución: Marruecos.
- ♣ *Oxyoppia* Balogh y Mahunka, 1969  
*Oxyoppia (Dzarogneta)* Kulijev, 1978 (= *Fineoppia* Khanbekyan y Gordeeva, 1991) (= *Pectinoppia* Subías y Rodríguez, 1986)  
Especie tipo: *Oppia dubia* Kulijev, 1966  
Distribución: Tropical (Etiópica y Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Oxyoppia (Dzarogneta) baranae* Toluk y Ayyıldız, 2008  
Distribución: Turquía.
  - *Oxyoppia (Dzarogneta) dubia* (Kulijev, 1966) (*Oppia*)  
Distribución: Cáucaso.
  - *Oxyoppia (Dzarogneta) ilicaensis* Baran y Ayyıldız, 2007  
Distribución: Turquía.
  - *Oxyoppia (Dzarogneta) intermedia* Subías y Rodríguez, 1986 (*O. (Pectinoppia)*)  
Distribución: España.
  - *Oxyoppia (Dzarogneta) khosrovica* (Khanbekyan y Gordeeva, 1991) (*Fineoppia*)  
Distribución: Cáucaso.
  - *Oxyoppia (Dzarogneta) yepesensis* Muñoz-Mingarro, 1987 (*O.*)  
Distribución: Mediterránea occidental.
- ♣ *Oxyoppioides* Subías y Mínguez, 1985  
Especie tipo: *Dameosoma decipiens* Paoli, 1908  
Distribución: Paleártica.
- *Oxyoppioides decipiens* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)  
Distribución: Paleártica meridional (Paleártica occidental: excepto Norte, y Sur de Siberia).
- ♣ *Subiasella* Balogh, 1983  
Especie tipo: *Oppia exigua* Hammer, 1971  
*Subiasella (Subiasella)* Balogh, 1983  
Distribución: Tropical (Australiana y Neotropical) y subtropical.
- *Subiasella (S.) segmella* (Golosova, 1970) (*Oppia*)  
Distribución: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental).
- Subiasella (Lalmoppia)* Subías y Rodríguez, 1986  
(= *Cassioppia* Poltavskaja, 1994)  
(= *Pararectoppia* Mahunka, 1987)  
Especie tipo: (*Oppia ventronodosa* Hammer, 1962) = *Oppia maculata* Hammer, 1952  
Distribución: Holártica y Neotropical.
- *Subiasella (Lalmoppia) gracilis* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)  
Distribución: Holártica (Paleártica occidental: Bulgaria, y U.S.A.: Misuri).
  - *Subiasella (Lalmoppia) krivolutskyi* (Poltavskaja, 1994) (*Cassioppia*)  
Distribución: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental).
  - *Subiasella (Lalmoppia) maculata* (Hammer, 1952) (*Oppia*) (= *Oppia ventronodosa* Hammer, 1962)  
Distribución: Holártica (Este de Paleártica occidental, Paleártica oriental y Neártica septentrional) y Chile.
  - *Subiasella (Lalmoppia) quadrimaculata* (Evans, 1952) (*Oppia*)  
Distribución: Paleártica (Europa y Paleártica oriental meridional).
- [**Mystropiinae**] Balogh, 1983  
Distribución: Pantropical y subtropical.
- ♣ *Corynoppia* Balogh, 1983  
Especie tipo: *Stachyoppia kosarovi* Jeleva, 1962  
Distribución: Tropical (Oriental y Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Corynoppia foliata* (Mihelčič, 1957) (*Damaeolus*)  
Distribución: España.
  - *Corynoppia foliatoides* Subías y Rodríguez, 1986  
Distribución: España.
  - *Corynoppia hispanica* Subías y Shtanchaeva, 2011  
Distribución: España.
- Corynoppia kosarovi* (Jeleva, 1962) (*Stachyoppia*)
- *Corynoppia kosarovi kosarovi* (Jeleva, 1962)  
Distribución: Mediterránea y Panamá.
  - *Corynoppia kosarovi matritensis* (Pérez-Íñigo, 1967) (*Stachyoppia*)  
Distribución: Mediterránea.
  - *Corynoppia maritima* Pérez-Íñigo jr., 1991 (*C. kosarovi m.*)  
Distribución: España (I. Baleares).
  - *Corynoppia papillisetigera* Iturrondobeitia y Saloña, 1998  
Distribución: España.
  - *Corynoppia weigmanni* (Murvanidze y Behan-Pelletier, 2011) (*Striatoppia*)  
Distribución: Cáucaso.
- ♣ *Mystroppia* Balogh, 1959  
Especie tipo: *Mystroppia sellnicki* Balogh, 1959

- Distribución: Paleártica y Oriental.
- *Mystroppia dallaii* Bernini, 1973  
Distribución: Mediterránea occidental.
  - *Mystroppia sellnicki* Balogh, 1959  
Distribución: Europa centromeridional e India (Tripura).
- ♣ ***Stachyoppia*** Balogh, 1961  
Especie tipo: *Stachyoppia muscicola*  
Balogh, 1961  
Distribución: Etiópica y Paleártica meridional.
- *Stachyoppia muscicola* Balogh, 1961  
Distribución: Congo y Cáucaso.
- ♣ ***Striatoppia*** Balogh, 1958  
Especie tipo: *Striatoppia machadoi* Balogh, 1958  
Distribución: Pantropical y subtropical.
- *Striatoppia niliaca* (Popp, 1960) (*Oppiella*)  
Distribución: Mediterránea oriental e India (Bengala Occidental).
  - *Striatoppia papillata* Balogh y Mahunka, 1966  
Distribución: Congo, Egipto y Vietnam.
- ♦ **Epimerellidae** Ayyildiz y Luxton, 1989  
Distribución: Oriental y subtropical (Paleártica meridional).
- ♣ ***Enisella*** Ayyildiz y Luxton, 1989  
Especie tipo: *Enisella turcica* Ayyildiz y Luxton, 1989  
Distribución: Paleártica meridional.
- *Enisella turcica* Ayyildiz y Luxton, 1989  
Distribución: Turquía.
- ♣ ***Epimerella*** Kulijev, 1967  
Especie tipo: *Oppia smirnovi* Kulijev, 1962  
Distribución: Paleártica meridional.
- *Epimerella distenta* Ayyildiz y Luxton, 1989  
Distribución: Turquía.
  - *Epimerella luxtoni* Toluk, Ayyildiz y Baran, 2008  
Distribución: Turquía.
  - *Epimerella puzanovi* Gordeeva y Karppinen, 1988  
Distribución: Ucrania (Crimea).
  - *Epimerella rubeni* Khanbekjan y Gordeeva, 1991  
Distribución: Cáucaso.
- Epimerella smirnovi* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)
- *Epimerella smirnovi smirnovi* (Kulijev, 1962)  
Distribución: Mediterránea oriental.
  - *Epimerella smirnovi longisetosa* Kulijev, 1967  
Distribución: Mediterránea oriental.
  - *Epimerella subiasi* Toluk, Ayyildiz y Baran, 2008  
Distribución: Turquía.
- ♦ **Machuellidae** Balogh, 1983  
Distribución: Pantropical y Paleártica.
- ♣ ***Gredosella*** Gil-Martín, Arillo y Subías, 2000  
Especie tipo: *Gredosella fraternalis* Gil-Martín, Subías y Arillo, 2000  
Distribución: Paleártica.
- *Gredosella capitata* (Kulijev, 1967) (*Machuella*)  
Distribución: Mediterránea oriental.
  - *Gredosella fraternalis* Gil-Martín, Arillo y Subías, 2000  
Distribución: España.
- ♣ ***Machuella*** Hammer, 1961  
Especie tipo: *Machuella ventrisetosa* Hammer, 1961  
Distribución: Pantropical y Paleártica.
- *Machuella draconis* Hammer, 1961 (= *Machuella africana* Mahunka, 1978)  
Distribución: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte), Malgache (I. Reunión) y Méjico.
  - *Machuella turcica* Baran y Ayyildiz, 2007  
Distribución: Turquía.
- Machuella ventrisetosa* Hammer, 1961
- *Machuella ventrisetosa ventrisetosa* Hammer, 1961 (= *Machuella hellenica* Mahunka, 1982) (= *Machuella hippy* Niemi y Gordeeva, 1991)  
Distribución: Pantropical (excepto Etiópica) y Paleártica meridional.
  - *Machuella ventrisetosa bilineata* Weigmann, 1976 (*M. b.*)  
Distribución: Europea.
- ♦ **Quadroppiidae** Balogh, 1983  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- ♣ ***Quadroppia*** Jacot, 1939  
Especie tipo: *Notaspis quadricarinata* Michael, 1885  
***Quadroppia (Quadroppia)*** Jacot, 1939  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Quadroppia (Q.) hammerae* Mínguez, Ruiz y Subías, 1985  
Distribución: Semicosmopolita (Paleártica centromeridional, U.S.A.: Carolina del Norte, Australiana: Nueva Zelanda y Hawái, y Costa Rica).
  - *Quadroppia (Q.) longisetosa* Mínguez, Ruiz y Subías, 1985  
Distribución: Mediterránea occidental.
  - *Quadroppia (Q.) maritalis* Lions, 1982 (*Q. quadricarinata m.*)  
Distribución: Europa centromeridional.
  - *Quadroppia (Q.) obsoleta* Mínguez, Ruiz y Subías, 1985 (*Q. longisetosa o.*)  
Distribución: España.
  - *Quadroppia (Q.) quadricarinata* (Michael, 1885) (*Notaspis*) (= *Quadroppia skookumchucki* Jacot, 1939) (= *Quadroppia quadricarinata virginalis* Lions, 1982)  
Distribución: Holártica (frecuente), China

suroriental y Malgache (I. Mauricio).

- *Quadroppia (Q.) squarrosa* Toluk y Ayyildiz, 2009

Distribución: Turquía.

***Quadroppia (Coronoquadroppia)*** Ohkubo, 1995

Especie tipo: (*Coronoquadroppia parallela*

Ohkubo, 1995) = *Oppia circumita* Hammer, 1961

Distribución: Cosmopolita (excepto

Antártica).

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) abchasica* Gordeeva y Tarba, 1990 (*Q.*)

Distribución: Cáucaso.

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) circumita* (Hammer, 1961) (*Oppia*)

(?= *Oppia quadricarinata ferrumequina* Jacot, 1938 “sp. inq.”)

(= *Coronoquadroppia parallela* Ohkubo, 1995)

Distribución: Pantropical (excepto Etiópica) y subtropical.

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) crenata* Mahunka, 1984 (*Q.*)

Distribución: Tanzania y Cáucaso.

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) erzurumensis* (Baran y Ayyildiz, 2007) (*C.*)

Distribución: Turquía.

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) foveolata* Toluk y Ayyildiz, 2009

Distribución: Turquía.

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) galaica* Mínguez, Ruiz y Subías, 1985 (*Q. pseudocircumita* g.)

(= *Quadroppia bellula* Luxton, 1987)

Distribución: Europa occidental y Cuba.

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) guttata* (Weigmann, 2010) (*C.*)

Distribución: Portugal.

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) media* Gordeeva, 1983 (*Q.*)

(= *Quadroppia ritza* Gordeeva y Tarba, 1990)

Distribución: Mediterránea oriental.

*Quadroppia (Coronoquadroppia) michaeli*

Mahunka, 1977 (*Q.*)

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) michaeli michaeli* Mahunka, 1977

Distribución: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) michaeli turcica* Baran, Toluk y Ayyildiz, 2009

Distribución: Turquía.

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) monstruosa* Hammer, 1979 (*Q.*)

(= *Quadroppia lesleyae* Monson, 2000)

(= *Quadroppia mahunkai* Mínguez, 1981)

(= *Quadroppia omodeoi* Mahunka y Paoletti, 1984)

(= *Quadroppia paolii* Woas, 1986)

Distribución: Holártica (Europa: excepto Norte, y U.S.A.: Carolina del Norte) y Java.

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) nana* Gordeeva, 1983 (*Q.*)

Distribución: Cáucaso.

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) nasalis* Gordeeva, 1983 (*Q.*)

(= *Quadroppia gumista* Gordeeva y Tarba, 1990)

Distribución: Mediterránea.

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) pseudocircumita* Mínguez, Ruiz y Subías, 1985 (*Q.*)

Distribución: Holártica (Oeste de Paleártica occidental y Canadá) y Perú.

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) sezeki* Baran y Ayyildiz, 2009

Distribución: Turquía.

#### ▲ **Trizetoidea** Ewing, 1917

#### ◆ **Suctobelbidae** Jacot, 1938

Distribución: Cosmopolita.

#### ♠ **Allosuctobelba** Moritz, 1970

Especie tipo: *Suctobelba grandis* Paoli, 1908

Distribución: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Allosuctobelba grandis* (Paoli, 1908) (*Suctobelba*)

Distribución: Holártica y Noreste de Oriental.

#### ♠ **Rhynchobelba** Willmann, 1953

Especie tipo: *Rhynchobelba inexpectata* Willmann, 1953

Distribución: Paleártica.

- *Rhynchobelba altaica* Krivolutsky, 1971
- Distribución: Paleártica meridional (Asia central rusa y Eslovenia).

- *Rhynchobelba inexpectata* Willmann, 1953

Distribución: Europa centrooriental.

- *Rhynchobelba machadoi* Pérez-Íñigo, 1976

Distribución: I. Canarias.

- *Rhynchobelba ornithorhyncha* (Willmann, 1953) (*Suctobelba*)

Distribución: Europa centromeridional.

#### ♠ **Suctobelba** Paoli, 1908

Especie tipo: *Notaspis trigona* Michael, 1888

Distribución: Holártica.

- *Suctobelba aliena* Moritz, 1970

Distribución: Europea.

- *Suctobelba altvateri* Moritz, 1970

Distribución: Europa centromeridional.

- *Suctobelba atomaria* Moritz, 1970

Distribución: Europa centromeridional.

- *Suctobelba beringiana* Krivolutsky, 1974

Distribución: Paleártica (I. Kuriles, Polonia y Turquía).

- *Suctobelba cornigera* Shtanchaeva y Subías, 2009

(= *Suctobelba cornuta* Shtanchaeva y Subías, 2009, “nom. praeoc.” por Hammer, 1962)

Distribución: Cáucaso.

- *Suctobelba discrepans* Moritz, 1970

Distribución: Europa centromeridional.

- *Suctobelba flagelliseta* Shtanchaeva y Subías, 2009

- Distribución: Cáucaso.
- *Suctobelba granulata* Hammen, 1952 (*S. trigona granulata*) (= *Suctobelba saetosa* Kulijev, 1965)  
Distribución: Europa centromeridional.
  - *Suctobelba lapidaria* Moritz, 1970  
Distribución: Europa centromeridional.
  - *Suctobelba regia* Moritz, 1970  
Distribución: Europea.
  - *Suctobelba reticulata* Moritz, 1970  
Distribución: Europa centromeridional.
  - Suctobelba scalpellata* Moritz, 1970
  - *Suctobelba scalpellata scalpellata* Moritz, 1970  
Distribución: Europa centromeridional.
  - *Suctobelba scalpellata caucasica* Shtanchaeva y Subías, 2009  
Distribución: Cáucaso.
  - *Suctobelba secta* Moritz, 1970  
Distribución: Europa centromeridional.
  - *Suctobelba sorrentensis* Hammer, 1961  
Distribución: Europa centromeridional.
  - *Suctobelba trigona* (Michael, 1888) (*Notaspis*)  
Distribución: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental).
- ♣ *Suctobelbata* Gordeeva, 1991  
(= *Unicobelba* Mahunka y Mahunka-Papp, 1999)  
Especie tipo: *Suctobelbata nova* Gordeeva, 1991  
Distribución: Holártica y Australiana.
- *Suctobelbata prelli* (Märkel y Meyer, 1958) (*Suctobelba*)  
Distribución: Holártica (Europa centrooccidental y Canadá).
- ♣ *Suctobelbella* Jacot, 1937  
Especie tipo: *Suctobelbella serratirostrum* Jacot, 1937
- Suctobelbella* (*Suctobelbella*) Jacot, 1937  
Distribución: Cosmopolita.
- *Suctobelbella* (*S.*) *acutidens* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)
  - *Suctobelbella* (*S.*) *acutidens acutidens* (Forsslund, 1941)  
(?= *Dameosoma cornigerum* Berlese, 1902 “*sp. inq.*”)  
(= *Suctobelba perpendiculata* Forsslund, 1958)  
Distribución: Holártica (frecuente) y Argentina.
  - *Suctobelbella* (*S.*) *acutidens duplex* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba d.*)  
(= *Suctobelba brachyodon* Mihelčič, 1958)  
(= *Suctobelba glabroclava* Kulijev, 1965)  
(= *Suctobelba hammerae* Krivolutsky, 1965)  
(= *Suctobelba tuberosa* Mihelčič, 1956)  
Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y Canadá).
  - *Suctobelbella* (*S.*) *acutidens lobata* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)  
Distribución: Europea.
  - *Suctobelbella* (*S.*) *acutidens pilosetososa* Shtanchaeva y Subías, 2009  
Distribución: Mediterránea (Cáucaso y España).
  - *Suctobelbella* (*S.*) *acutidens sarekensis* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba s.*)  
Distribución: Holártica (Paleártica occidental y Neártica).
  - *Suctobelbella* (*S.*) *arcana* Moritz, 1970  
Distribución: Holártica: Paleártica (Europa centromeridional y Este de Rusia asiática) y Neártica (U.S.A.: Luisiana, y Canadá).
  - *Suctobelbella* (*S.*) *carcharodon* Moritz, 1966  
Distribución: Europa centromeridional e India (Tripura).
  - *Suctobelbella* (*S.*) *dargoltsiana* (Krivolutsky, 1966) (*Suctobelba*)  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
  - *Suctobelbella* (*S.*) *granifera* Chinone, 2003  
Distribución: Paleártica meridional (Japón, Cáucaso y España).
  - *Suctobelbella* (*S.*) *hamata* Moritz, 1970  
Distribución: Holártica (Europa centrooccidental y U.S.A.: Luisiana).
  - *Suctobelbella* (*S.*) *harteni* Mahunka, 1991  
Distribución: Macaronésica (Cabo Verde).
  - *Suctobelbella* (*S.*) *italica* (Mahunka, 1966) (*Suctobelba*)  
(= *Suctobelbella diffissa* Moritz, 1974)  
Distribución: Paleártica occidental (excepto Norte).
  - *Suctobelbella* (*S.*) *latirostris* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)  
Distribución: Paleártica (Europa y Oeste de Siberia) y Vietnam.
  - *Suctobelbella* (*S.*) *liacariformis* Shtanchaeva y Subías, 2009  
Distribución: Mediterránea (Cáucaso y España).
  - *Suctobelbella* (*S.*) *longicuspis* Jacot, 1937  
(= *Suctobela falcata* Forsslund, 1941)  
Distribución: Semicosmopolita: Holártica (Neártica oriental, Europa: frecuente, e I. Kuriles), El Salvador y Nueva Zelanda.
  - *Suctobelbella* (*S.*) *longirostris* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)  
Distribución: Holártica: Paleártica (Europa: frecuente en el Norte, y Paleártica oriental) y Neártica (U.S.A. Alaska y Carolina del Norte).
  - *Suctobelbella* (*S.*) *messneri* Moritz, 1971  
Distribución: Europa centromeridional.
  - *Suctobelbella* (*S.*) *opistudentata* (Golosova, 1970) (*Suctobelba*)  
Distribución: Paleártica (Europa meridional y Este de Paleártica oriental).
  - *Suctobelbella* (*S.*) *palustris* (Forsslund, 1953) (*Suctobelba*)  
Distribución: Holártica.
  - *Suctobelbella* (*S.*) *perforata* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)  
Distribución: Paleártica.
  - *Suctobelbella* (*S.*) *prominens* (Moritz, 1966)

*(Suctobelba)*

Distribución: Europa centromeridional.

- *Suctobelbella (S.) similis* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)

Distribución: Paleártica (Europa y Este de Rusia asiática).

- *Suctobelbella (S.) singularis* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)

Distribución: Paleártica (Europa: excepto Oeste, y Este de Paleártica oriental) y Taiwán [Formosa].

*Suctobelbella (S.) subcornigera* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)

- *Suctobelbella (S.) subcornigera subcornigera* (Forsslund, 1941)

(?= *Suctobelbella laxtoni* Jacot, 1937 “*sp. inq.*”) (= *Suctobelba macrodon* Mihelčič, 1956)

Distribución: Semicosmopolita: Holártica (frecuente en Paleártica), Oriental y Nueva Zelanda.

- *Suctobelbella (S.) subcornigera maculata* Shtanchaeva y Subías, 2009

Distribución: Mediterránea (Cáucaso y España).

- *Suctobelbella (S.) subcornigera vera* (Moritz, 1964) (*Suctobelba v.*)

Distribución: Paleártica (Europa y Oeste de Siberia).

- *Suctobelbella (S.) subtrigona* (Oudemans, 1900) (*Eremaeus*)

(= *Suctobelba intermedia* Willmann, 1939)

Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente en Paleártica occidental, y Neártica septentrional) y Méjico.

- *Suctobelbella (S.) tschabovskyi* (Krivolutsky, 1966) (*Suctobelba*)

Distribución: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Asia centrooccidental).

- *Suctobelbella (S.) tuberculata* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)

Distribución: Paleártica (Europa y Este de Paleártica oriental).

***Suctobelbella (Flagrosuctobelba)* Hammer, 1979**

Especie tipo: *Flagrosuctobelba multiplumosa* Hammer, 1979

Distribución: Cosmopolita.

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) alloenasuta* Moritz, 1971 (*S.*)

Distribución: Holártica meridional (Europa centromeridional y U.S.A.: Carolina del Norte).

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) ancorhina* Chinone, 2003 (*S.*)

Distribución: Paleártica (Cáucaso y Japón).

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) baloghi* (Forsslund, 1958) (*Suctobelba*)

Distribución: Paleártica occidental.

*Suctobelbella (Flagrosuctobelba) diversosetosa* (Hammer, 1979) (*F.*)

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) diversosetosa arilloi* Shtanchaeva y Subías, 2009

Distribución: Cáucaso.

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) elegantula* (Hammer, 1958) (*Suctobelba*)

(= *Suctobelba naginata* Aoki, 1961)

(= *Suctobelba quadricarina* Hammer, 1958)

Distribución: Neotropical, Norte de Oriental y Holártica meridional (Paleártica meridional y U.S.A.: Luisiana).

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) flagellifera* Chinone, 2003 (*S.*)

Distribución: Paleártica (Cáucaso y Japón).

*Suctobelbella (Flagrosuctobelba) forsslundi* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) forsslundi forsslundi* (Strenzke, 1950)

(= *Suctobelbella besucheti* Mahunka y Mahunka-Papp, 2001)

Distribución: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental).

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) forsslundi moritzi* Mahunka, 1987 (*S. m.*)

Distribución: Europa centromeridional.

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) hastata* Pankov, 1986 (*S.*)

Distribución: Paleártica (Cáucaso y Este de Paleártica oriental).

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) meridionalis* (Kahwash, Subías y Ruiz, 1991) (*F.*)

Distribución: España.

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) multiplumosa* (Hammer, 1979) (*F.*)

Distribución: Oriental (Indonesia), Norte de Neotropical y Cáucaso.

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) nana* Shtanchaeva y Subías, 2009

Distribución: Mediterránea (Cáucaso y España).

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) nasalis* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)

(?= *Dameosoma bellum* Berlese, 1904 “*sp. inq.*”)

Distribución: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental) y Nueva Zelanda.

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) quinquentata* (Hammer, 1970) (*Suctobelba*)

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).

- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) sensillinuda* Shtanchaeva y Subías, 2009

Distribución: Cáucaso.

♠ ***Suctobelbilla* Jacot, 1937**

(= *Reticobella* Hammer, 1962)

(= *Rhynchobella* Hammer, 1961)

(= *Suctoppia* Balogh, 1958)

Especie tipo: *Suctobelbilla punctillata* Jacot, 1937

Distribución: Pantropical y subtropical.

*Suctobelbilla dentata* (Hammer, 1961)

(*Rhynchobella*)

- *Suctobelbilla dentata europaea* Moritz, 1974

Distribución: Europa centromeridional.

- *Suctobelbilla fonticula* Hammer, 1975

Distribución: Argelia y Congo.

♦ **Trizetidae** Ewing, 1917

Distribución: Subtropical (Paleártica)

meridional).

♣ **Trizetes** Berlese, 1904

Especie tipo: *Trizetes pyramidalis* Berlese, 1904

Distribución: Subtropical (Paleártica meridional).

• *Trizetes pyramidalis* Berlese, 1904

Distribución: Mediterránea occidental.

▲ **Otocephoidea** Balogh, 1961

◆ **Dampfiellidae** Balogh, 1961

Distribución: Pantropical.

♣ **Dampfiella** Sellnick, 1931

Especie tipo: *Dampfiella procera* Sellnick, 1931

Distribución: Pantropical.

• *Dampfiella ambigua* Pérez-Íñigo, 1976

Distribución: I. Canarias.

◆ **Tetracondylidae** Aoki, 1961

Distribución: Pantropical y subtropical.

♣ **Dolicheremaeus** Jacot, 1938

(=*Dicondyla* Aoki, 1965)

(=*Tetracondyla* Newell, 1956)

Especie tipo: *Dolicheremaeus rubripedes* Jacot, 1938

Distribución: Pantropical y subtropical.

• *Dolicheremaeus dorni* (Balogh, 1937) (*Oppia*)

Distribución: Europa meridional.

◆ **Otocephidae** Balogh, 1961

Distribución: Australianooriental y subtropical (Paleártica meridional).

♣ **Otocephus** Berlese, 1905

Especie tipo: *Carabodes (Otocephus) longior* Berlese, 1905

Distribución: Tropical (Oriental, Australiana y “Neotropical”) y subtropical (Paleártica meridional).

• *Otocephus longior* (Berlese, 1905) (*Carabodes (O.)*)

Distribución: Oriental (Java y Tailandia) y Cáucaso.

▲ **Carabodoidea** Koch, 1837

◆ **Carabodidae** Koch, 1837

Distribución: Cosmopolita.

♣ **Austrocarabodes** Hammer, 1966

Especie tipo: *Carabodes ensifer* Sellnick, 1931

Distribución: Cosmopolita (excepto Boreal).

• *Austrocarabodes arrogans* Pérez-Íñigo, 1967

Distribución: Mediterránea.

• *Austrocarabodes ensifer* (Sellnick, 1931) (*Carabodes*)

Distribución: Paleártica meridional

(Mediterránea y Asia centrooccidental).

*Austrocarabodes foliaceisetus* Krivolutsky, 1971

• *Austrocarabodes foliaceisetus foliaceisetus* Krivolutsky, 1971

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).

• *Austrocarabodes foliaceisetus georgiensis*

Murvanidze y Weigmann, 2007

Distribución: Cáucaso.

• *Austrocarabodes intermedius* Ruiz, Subías y Kahwash, 1989

Distribución: España.

♣ **Carabodes** Koch, 1835

Especie tipo: *Carabodes coriaceus* Koch, 1835

**Carabodes (Carabodes)** Koch, 1835

(=*Neocephus* Willmann, 1936)

Distribución: Semicosmopolita: Holártica y pantropical (excepto Australiana).

• *Carabodes (C.) affinis* Berlese, 1913

Distribución: Mediterránea.

• *Carabodes (C.) apuanicus* Bernini, 1979

Distribución: Italia.

• *Carabodes (C.) arduinii* Valle, 1955

Distribución: Mediterránea occidental.

• *Carabodes (C.) areolatus* Berlese, 1916

Distribución: Paleártica (frecuente).

• *Carabodes (C.) auriculatus* Mahunka, 1987

Distribución: Cáucaso.

• *Carabodes (C.) azoricus* C. y C., jr. Pérez-Íñigo, 1996

Distribución: I. Azores.

• *Carabodes (C.) bellus* Aoki, 1959

Distribución: Paleártica meridional (Este de Paleártica oriental y Cáucaso).

• *Carabodes (C.) berninii* Mahunka, 1983

Distribución: Europa centromeridional.

• *Carabodes (C.) chirstlus* Mahunka, 1987

(=*Carabodes foliatus* Morell, 1990)

Distribución: Mediterránea occidental.

• *Carabodes (C.) comas* Kulijev, 1979

Distribución: Cáucaso.

• *Carabodes (C.) coriaceus* Koch, 1835

(=*Carabodes nepos* Hull, 1914)

(=*Carabodes papillosus* Lucas, 1849)

Distribución: Paleártica occidental

(frecuente) y “U.S.A. (Virginia)”.

• *Carabodes (C.) csikii* Mahunka y Mahunka-Papp, 2008

Distribución: Albania.

• *Carabodes (C.) egregius* Djaparidze, 1990

Distribución: Cáucaso.

• *Carabodes (C.) femoralis* (Nicolet, 1855) (*Tegeocranus*)

Distribución: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Paleártica oriental meridional).

• *Carabodes (C.) grandjeani* Bernini, 1977

Distribución: Italia.

• *Carabodes (C.) granulatus* Banks, 1895

(=*Carabodes omo* Jacot, 1937)

Distribución: Holártica (Neártica oriental y



Paleártica occidental: Cáucaso).

- *Carabodes (C.) gregorioi* Gil-Martín y Subías, 1997

Distribución: España.

- *Carabodes (C.) gadarramicus* Subías y Arillo, 2001

Distribución: España.

- *Carabodes (C.) hispanicus* Pérez-Íñigo, 1966

Distribución: España.

- *Carabodes (C.) hungaricus* Balogh, 1943

Distribución: Europa meridional.

- *Carabodes (C.) kintrishiana* Murvanidze, 2008

Distribución: Cáucaso.

- *Carabodes (C.) labyrinthicus* (Michael, 1879) (*Tegeocranus*)

(=*Cepheus heimi* Oudemans, 1903)

(=*Carabodes marginepunctatus* Trägårdh, 1902)

(=*Carabodes scymnus* Hull, 1914)

(=*Carabodes vermiculatus* Berlese, 1916)

Distribución: Holártica (frecuente).

- *Carabodes (C.) magnus* Kunst, 1961

Distribución: Sureste de Europa.

- *Carabodes (C.) marginatus* (Michael, 1884) (*Tegeocranus*)

(=*Carabodes pontiger* Berlese, 1913)

Distribución: Paleártica (Paleártica

occidental: frecuente, y Noroeste de Siberia).

- *Carabodes (C.) montanus* Bernini, 1979

Distribución: Suroeste de Europa.

- *Carabodes (C.) ornatus* Štokán, 1925

(=*Carabodes forsslundi* Sellnick, 1953)

Distribución: Paleártica (excepto Este de Paleártica oriental): frecuente.

- *Carabodes (C.) palmifer* Berlese, 1904

(=*Carabodes peniculatus* Aoki, 1970)

Distribución: Holártica (Paleártica:

Mediterránea occidental y Este de Paleártica oriental, y Neártica oriental) y Noreste de Oriental.

- *Carabodes (C.) perezinigo* Salinas, 1971

Distribución: España.

- *Carabodes (C.) pirenaicus* Subías y Arillo, 2001

Distribución: España.

- *Carabodes (C.) pirinensis* Kunst, 1961

Distribución: Bulgaria.

- *Carabodes (C.) procerus* Weigmann y

Murvanidze, 2003

Distribución: Cáucaso.

- *Carabodes (C.) quadrangulus* Bernini, 1979

(=?*Carabodes flagellifer* Mihelčič, 1966 “*sp. inq.*”)

Distribución: Mediterránea (excepto Este).

- *Carabodes (C.) reticulatus* Berlese, 1913 (*C. coriaceus r.*)

Distribución: Paleártica occidental.

- *Carabodes (C.) rugosior* Berlese, 1916 (*C. femoralis r.*)

Distribución: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional).

- *Carabodes (C.) subarcticus* Trägårdh, 1902 (*C. elongatus s.*)

Distribución: Paleártica (Europa: menos

frecuente en el Sur, y Paleártica oriental).

- *Carabodes (C.) tenuis* Forsslund, 1953

Distribución: Paleártica: Europa (menos frecuente en el Sur) y Paquistán.

- *Carabodes (C.) tyrrhenicus* Salomone, Avanzati, Baratti y Bernini, 2003

Distribución: Italia.

- *Carabodes (Flexa)* Kulijev, 1977

Especie tipo: *Carabodes dubius* Kulijev, 1968

Distribución: Paleártica.

- *Carabodes (Flexa) bidens* (Djaparidze, 1990) (*F.*)

Distribución: Cáucaso.

- *Carabodes (Flexa) djaparidzae* Murvanidze y Weigmann, 2007 (*C.*)

Distribución: Cáucaso.

- *Carabodes (Flexa) dubius* Kulijev, 1968 (*C.*)

Distribución: Cáucaso.

- *Carabodes (Flexa) horreo* (Djaparidze, 1990) (*F.*)

Distribución: Cáucaso.

- *Carabodes (Flexa) intermedius* Willmann, 1951 (*C.*)

(=*Carabodes tenuis longisetosus* Kulijev, 1968)

Distribución: Europa centromeridional.

- *Carabodes (Flexa) scopulae* Kulijev, 1968 (*C.*)

Distribución: Cáucaso.

- *Carabodes (Flexa) tarbae* (Shtanchaeva, 2004) (*F.*)

Distribución: Cáucaso.

- *Carabodes (Klapperiches)* Mahunka, 1979

Especie tipo: *Klapperiches nigrosetosus*

Mahunka, 1979

Distribución: Cosmopolita (excepto

Antártica).

- *Carabodes (Klapperiches) dissimilis* Bernini, 1976 (*C.*)

Distribución: Suroeste de Europa.

- *Carabodes (Klapperiches) manganoi* Bernini, 1976 (*C.*)

Distribución: Italia.

- *Carabodes (Klapperiches) minusculus* Berlese, 1923 (*C.*)

(=*Carabodes castrii* Mahunka, 1966)

Distribución: Paleártica (Paleártica

occidental: frecuente, y Paleártica oriental meridional) y “U.S.A.”

- *Carabodes (Klapperiches) poggii* Bernini, 1976 (*C.*)

Distribución: Mediterránea occidental.

- *Carabodes (Klapperiches) pulcher* Bernini, 1976 (*C.*)

- *Carabodes (Klapperiches) pulcher pulcher* Bernini, 1976

Distribución: Mediterránea.

- *Carabodes (Klapperiches) pulcher occidentalis* Pérez-Íñigo y Peña, 1996 (*C.*)

Distribución: I. Canarias.

- *Carabodes (Klapperiches) purpurarius* Pérez-Íñigo y Peña, 1996 (*C.*)

Distribución: I. Canarias.

- *Carabodes (Klapperiches) schatzi* Bernini,

1976 (C.)

Distribución: Europa meridional.

- *Carabodes (Klapperiches) similis* Ruiz, Subías y Kahwash, 1989 (C.)

(=*Carabodes translamellatus* Pérez-Íñigo jr., 1990)

Distribución: Mediterránea (España y Cáucaso).

- *Carabodes (Klapperiches) tenerifensis* Pérez-Íñigo, 1976 (C.)

Distribución: Mediterránea occidental.

- *Carabodes (Klapperiches) willmanni* Bernini, 1975 (C.)

(?= *Carabodes paraspinosus* Kulijev, 1968 “*sp. inq.*”)

Distribución: Holártica (Paleártica occidental y Neártica septentrional).

#### ♣ *Cavernocarabodes* Mahunka, 1974

Especie tipo: *Cavernocarabodes perreti*

Mahunka, 1974

Distribución: Etiópica y Paleártica meridional.

- *Cavernocarabodes trigonosternum* (Pérez-Íñigo, 1976) (*Carabodes*)

Distribución: I. Canarias.

#### ♣ *Odontocephus* Berlese, 1913

Especie tipo: *Tegeocranus elongatus*

Michael, 1879

Distribución: Holártica y Australiana.

- *Odontocephus bandae* Subías y Arillo, 2001

Distribución: Marruecos.

- *Odontocephus curtisetia* Ruiz, Subías y Kahwash, 1989

Distribución: España.

- *Odontocephus elongatus* (Michael, 1879) (*Tegeocranus*)

(=*Hermannia oblonga* Karpelles, 1893)

Distribución: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, y Sureste de U.S.A.).

- *Odontocephus espatulatus* Saloña e Iturrondobeitia, 1989

Distribución: España.

- *Odontocephus hungaricus* Mahunka, 1991

Distribución: Europa meridional.

- *Odontocephus laeviusculus* (Canestrini y Fanzago, 1877) (*Claviceps*) “*sp. inq.*”

Distribución: Italia.

- *Odontocephus oglasae* Baratti y Bernini, 1994

Distribución: Italia.

- *Odontocephus piramidalis* Mahunka, 1987

Distribución: Mediterránea occidental.

- *Odontocephus ruber* (Canestrini y Fanzago, 1877) (*Claviceps*) “*sp. inq.*”

Distribución: Italia.

- *Odontocephus villosus* Mahunka, 1987

Distribución: Mediterránea occidental.

- *Odontocephus zaballosi* Subías y Arillo, 2001

Distribución: Marruecos.

#### ▲ *Tectocephoidea* Grandjean, 1954

#### ◆ *Tectocephidae* Grandjean, 1954

Distribución: Cosmopolita.

#### ♣ *Tectocephus* Berlese, 1896

Especie tipo: *Tegeocranus velatus* Michael, 1880

Distribución: Cosmopolita.

- *Tectocephus alatus* Berlese, 1913

Distribución: Paleártica (excepto Norte).

- *Tectocephus knuellei* Vaněk, 1960

Distribución: Paleártica.

- *Tectocephus minor* Berlese, 1903

(=*Tectocephus bisignatus* Moritz, 1968)

(=*Tectocephus cuspidentatus* Knülle, 1954)

(=*Tectocephus velatus novus* Hammer, 1967)

Distribución: Semicosmopolita: Paleártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, y Japón), U.S.A. (Virginia), Oriental, I. Galápagos y Nueva Zelanda.

- *Tectocephus punctulatus* Djaparidze, 1985

Distribución: Paleártica (Cáucaso y Este de Rusia asiática).

*Tectocephus velatus* (Michael, 1880)

(*Tegeocranus*)

- *Tectocephus velatus velatus* (Michael, 1880)

(=*Tectocephus translamellaris* Kardar, 1974)

Distribución: Cosmopolita (frecuente).

- *Tectocephus velatus clavatus* Mahunka, 1983 (*T. c.*)

Distribución: Europa meridional e India (Tripura).

- *Tectocephus velatus sarekensis* Trägårdh, 1910

(=*Tectocephus latilamellaris* Kardar, 1974)

(=*Tectocephus velatus angulatus* Mihelčič, 1957)

(=*Tectocephus velatus ibericus* Mihelčič, 1957)

(=*Tectocephus velatus inflexus* Mihelčič, 1957)

Distribución: Cosmopolita (frecuente).

- *Tectocephus velatus universitatum* Abdel-Hamid, 1964

Distribución: Egipto.

#### ◆ *Tegeocranellidae* P. Balogh, 1987

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

#### ♣ *Tegeocranellus* Berlese, 1913

Especie tipo: *Tegeocranus laevis* Berlese, 1905

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Tegeocranellus bosniae* (Frank, 1961) (*Carabodes*)

Distribución: Bosnia-Herzegovina.

- *Tegeocranellus laevis* (Berlese, 1905) (*Tegeocranus*)

Distribución: Mediterránea, Oriental: Filipinas y Ceilán [Sri Lanka], y Melanesia (I. Fiji).

#### ▲ *Hydrozetoidea* Grandjean, 1954

- ♦ **Hydrozetidae** Grandjean, 1954  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- ♣ **Hydrozetes** Berlese, 1902  
(=**Argentinobates** Fernández, 1984)  
(=**Heloribates** Grandjean, 1966)  
(=**Ojaithrus** Habeeb, 1982)  
Especie tipo: *Notaspis lacustris* Michael, 1882  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Hydrozetes confervae* (Schrank, 1781) (*Acarus*) (= *Hydrozetes terrestris* Berlese, 1910)  
Distribución: Holártica.
  - *Hydrozetes eichhornia* (Soliman, Hussein y Ramadan, 1991) (*Linobia*) “*sp. inq.*”  
Distribución: Egipto.
  - *Hydrozetes inquirenda* Subías, 2010 “*sp. inq.*” (= *Linobia nilotica* Soliman, Hussein y Ramadan, 1991, “*nom. praeoc.*” por Trägårdh, 1905)  
Distribución: Egipto.
- Hydrozetes lacustris* (Michael, 1882) (*Notaspis*)
- *Hydrozetes lacustris lacustris* (Michael, 1882)  
Distribución: Boreal (Paleártica occidental: menos frecuente en el Sur, Siberia centrooccidental, Japón y Canadá).
  - *Hydrozetes lacustris parisiensis* Grandjean, 1948 (*H. p.*)  
Distribución: Mediterránea.
  - *Hydrozetes lemnae* (Coggi, 1897) (*Notaspis*) (= *Hydrozetes mollicoma* Hammer, 1958)  
Distribución: Semicosmopolita (Paleártica occidental: frecuente, Oriental: Bali, Australiana: frecuente, y Neotropical: frecuente).
  - *Hydrozetes replacemantica* (Soliman, Hussein y Ramadan, 1991) (*Linobia*) “*sp. inq.*”  
Distribución: Egipto.
  - *Hydrozetes tridactylus* Abdel-Hamid, 1964  
Distribución: Egipto.
- ▲ **Ameronothroidea** Willmann, 1931
- ♦ **Ameronothridae** Willmann, 1931  
Distribución: Cosmopolita.
- ♣ **Ameronothrus** Berlese, 1896  
(=**Hygroribates** Jacot, 1934)  
Especie tipo: *Eremaeus lineatus* Thorell, 1871  
Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).
- *Ameronothrus maculatus* (Michael, 1882) (*Scutovertex*) (= *Scutovertex maculatus groenlandicus* Trägårdh, 1904) (= *Scutovertex pseudomaculatus* Hull, 1914) (= *Scutovertex pseudomaculatus insularis* Hull, 1914)  
Distribución: Holártica septentrional (excepto Paleártica oriental) y Pequeñas Antillas.
  - *Ameronothrus marinus* (Banks, 1896) (*Nothrus*) (?= *Ameronothrus fuciculum* Brady, 1875 “*sp. inq.*”)  
(=*Scutovertex spoofi* Oudemans, 1900)  
Distribución: Holártica septentrional (excepto Paleártica oriental).
  - *Ameronothrus oblongus* Sitnikova, 1975  
Distribución: Paleártica (Este de Paleártica occidental y Este de Paleártica oriental).
  - *Ameronothrus schneideri* (Oudemans, 1903) (*Scutovertex*)  
Distribución: Euroatlántica.
  - *Ameronothrus schusteri* Schubart, 1970  
Distribución: Croacia.
- ♦ **Selenoribatidae** Schuster, 1963  
Distribución: Pantropical (excepto Australiana) y Paleártica meridional.
- ♣ **Selenoribates** Strenzke, 1961  
Especie tipo: *Selenoribates foveiventris* Strenzke, 1961  
Distribución: Paleártica.
- *Selenoribates foveiventris* Strenzke, 1961  
Distribución: Egipto.
  - *Selenoribates ghardaqensis* Abdel-Hamid, 1973  
Distribución: Egipto.
  - *Selenoribates mediterraneus* Grandjean, 1966  
Distribución: Europa meridional.
- ♣ **Thalassozetes** Schuster, 1963  
(=**Rhizophobates** Karasawa y Aoki, 2005)  
Especie tipo: *Thalassozetes riparius* Schuster, 1963  
Distribución: Paleotropical y subtropical.
- *Thalassozetes riparius* Schuster, 1963  
Distribución: Croacia.
- ▲ **Cymbaeremaeoidea** Sellnick, 1928
- ♦ **Cymbaeremaeidae** Sellnick, 1928  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- ♣ **Cymbaeremaeus** Berlese, 1896  
Especie tipo: *Eremaeus cymba* Nicolet, 1855  
Distribución: Paleártica, Oriental y Neotropical.
- *Cymbaeremaeus cymba* (Nicolet, 1855) (*Eremaeus*) (= *Cymbaeremaeus pulvillifer* Willmann, 1931)  
Distribución: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Paleártica oriental: excepto Este) e India (Sikkim).
- ♣ **Scapheremaeus** Berlese, 1910  
Especie tipo: *Eremaeus patella* Berlese, 1886  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Scapheremaeus corniger* (Berlese, 1908) (*Cymbaeremaeus*) (= *Scapheremaeus madeirensis* Willmann, 1939)  
Distribución: Mediterránea occidental.

- *Scapheremaeus fimbriatus* (Michael, 1890) (*Eremaeus*)  
Distribución: Argelia.
- *Scapheremaeus guerini* (Berlese, 1908) (*Cymbaeremaeus*)  
(=*Cymbaeremaeus (Scapheremaeus) reticulatus* Berlese, 1910)  
Distribución: Europa centromeridional.
- *Scapheremaeus palustris* (Sellnick, 1924) (*Cymbaeremaeus (S.)*)  
Distribución: Holártica (Paleártica occidental y Neártica) e I. Santa Helena.
- *Scapheremaeus patella* (Berlese, 1886) (*Eremaeus*)  
(=*Scapheremaeus hammerae* J. y P. Balogh, 2002)  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) y Nueva Zelanda.
- *Scapheremaeus subcorniger* Pérez-Íñigo y Peña, 1996  
Distribución: I. Canarias.
- *Scapheremaeus tricarinatus* Sitnikova, 1975  
Distribución: Mediterránea.

Infraorden PORONOTICAE Grandjean, 1954

▲ **Licneremaeoidea** Grandjean, 1931

◆ **Micreremidae** Grandjean, 1954

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

♣ **Micreremus** Berlese, 1908

Especie tipo: *Eremaeus brevipes* Michael, 1888

Distribución: Semicosmopolita (Paleártica y Paleotropical).

- *Micreremus brevipes* (Michael, 1888) (*Eremaeus*)  
(=*Micreremus gracilior* Willmann, 1931)  
(=*Eremaeus minimus* Berlese, 1891)  
(=*Eremaeus minutipes* Berlese, 1902)

Distribución: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental).

◆ **Lamellareidae** Balogh, 1972

Distribución: Cosmopolita.

• **Tenuelamellarea** Subías e Iturrondobeitia, 1978

Especie tipo: *Tenuelamellarea hispanica* Subías e Iturrondobeitia, 1978

Distribución: Cosmopolita.

• **Tenuelamellara hispanica** Subías e Iturrondobeitia, 1978

Distribución: España, Sudáfrica y subantártica (I. San Pablo y Amsterdam).

◆ **Licneremaeidae** Grandjean, 1931

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

♣ **Licneremaeus** Paoli, 1908

Especie tipo: *Notaspis licnophorus* Michael,

1882

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• **Licneremaeus embeyisztini** Mahunka, 1980

Distribución: Mediterránea occidental.

• **Licneremaeus giustii** Bernini, 1973

Distribución: Italia (Sicilia).

• **Licneremaeus licnophorus** (Michael, 1882) (*Notaspis*)

Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Carolina del Norte) y Méjico.

• **Licneremaeus novus** Karppinen y Shtanchaeva, 1987

(=*Licneremaeus similis* Pérez-Íñigo jr., 1990)

Distribución: Mediterránea.

• **Licneremaeus prodigiosus** Schuster, 1958

Distribución: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Asia centrooccidental).

◆ **Scutoverticidae** Grandjean, 1954

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

♣ **Ethiovertex** Mahunka, 1982

Especie tipo: *Ethiovertex macrosetosus* Mahunka, 1982

Distribución: Etiópica y Paleártica meridional.

• **Ethiovertex elisae** Pérez-Íñigo y Peña, 1996

Distribución: I. Canarias.

♣ **Hypovertex** Krivolutsky, 1969

Especie tipo: *Hypovertex mirabilis* Krivolutsky, 1969

Distribución: Paleártica meridional, Etiópica y Neotropical.

• **Hypovertex lenticulatus** Kahwash, Ruiz y Subías, 1990

Distribución: España.

• **Hypovertex mirabilis** Krivolutsky, 1969

Distribución: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).

• **Hypovertex saxicola** Sitnikova, 1975

Distribución: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).

♣ **Lamellovertex** Bernini, 1976

Especie tipo: *Scutovertex caelatus* Berlese, 1895

Distribución: Paleártica.

• **Lamellovertex caelatus** (Berlese, 1895) (*Scutovertex*)

Distribución: Mediterránea.

♣ **Provertex** Mihelčič, 1959

Especie tipo: *Provertex kuehnelti* Mihelčič, 1959

Distribución: Paleártica meridional.

• **Provertex delamarei** Travé, 1963

Distribución: Europa suroccidental.

• **Provertex kuehnelti** Mihelčič, 1959

Distribución: Europa centromeridional.

- *Provertex mailloli* Travé, 1965  
Distribución: Francia.
- ♠ *Scutovertex* Michael, 1879  
(=*Neoscutovortex* Mihelčič, 1957)  
Especie tipo: *Scutovertex sculptus* Michael, 1879  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Scutovertex arenocolus* Pflingstl y Schäffer, 2009  
Distribución: Europa centrooccidental.
- *Scutovertex bulgaricus* Kunst, 1961  
Distribución: Bulgaria.
- *Scutovertex glaber* Mihelčič, 1957  
(*S. (Neoscutovortex)*)  
(=*Scutovertex perforatulus* Mihelčič, 1958)  
Distribución: Mediterránea.
- *Scutovertex granulatus* Mihelčič, 1957  
(*S. (Neoscutovortex)*)  
Distribución: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Asia central rusa).
- *Scutovertex inlenticulatus* Sitnikova, 1975  
Distribución: Cáucaso y Asia centrooccidental.
- *Scutovertex mikoï* Weigmann, 2009  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Scutovertex minutus* (Koch, 1836) (*Cepheus*)  
(=*Eremaeus ovalis siculus* Berlese, 1887)  
Distribución: Paleártica (frecuente).
- *Scutovertex neonominatus* Subías, 2004  
(=*Scutovertex perforatus* Sitnikova, 1975, “*nom. praec.*” por Berlese, 1910)  
Distribución: Paleártica occidental (excepto Oeste).
- *Scutovertex pannonicus* Schuster, 1958  
Distribución: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Paleártica oriental meridional).
- *Scutovertex pictus* Kunst, 1959  
Distribución: Mediterránea.
- *Scutovertex punctatus* Sitnikova, 1975  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea, Asia centrooccidental y Mongolia).
- *Scutovertex sculptus* Michael, 1879  
(?= *Eremaeus ovalis* Koch, 1841 “*sp. inq.*”)  
(=*Scutovertex (Neoscutovortex) rugosus* Mihelčič, 1957)  
(=*Scutovertex steineri* Mihelčič, 1956)  
Distribución: Paleártica (menos frecuente en el Norte) y Nueva Zelanda.
- *Scutovertex serratus* Sitnikova, 1975  
Distribución: Paleártica (Este de Paleártica occidental y Paleártica oriental meridional).
- ♠ *Scutoverticosus* Kok, 1968  
Especie tipo: *Scutoverticosus arcanus* Kok, 1968  
Distribución: Etiópica y Paleártica meridional.
- *Scutoverticosus insperatus* Pérez-Íñigo y Peña, 1996  
Distribución: I. Canarias.
- ♦ **Passalozetidae** Grandjean, 1954  
Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).
- ♠ *Bipassalozetes* Mihelčič, 1957  
Especie tipo: *Passalozetes (Bipassalozetes) permixtus* Mihelčič, 1957  
***Bipassalozetes (Bipassalozetes)*** Mihelčič, 1957  
(=*Salpasozetes* Mahunka, 1977)  
Distribución: Holártica y Etiópica.
- *Bipassalozetes (B.) bidactylus* (Coggi, 1900) (*Scutovertex*)  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea, Asia centrooccidental y Mongolia).
- *Bipassalozetes (B.) intermedius* (Mihelčič, 1954) (*Passalozetes*)  
(=*Passalozetes variatepictus* Mihelčič, 1956)  
Distribución: Paleártica (excepto Norte).
- *Bipassalozetes (B.) nitidus* (Bayoumi y Al-Khalifa, 1984) (*Passalozetes*)  
Distribución: Arabia Saudita.
- *Bipassalozetes (B.) perforatus* (Berlese, 1910) (*Scutovertex*)  
(=*Passalozetes granulatus* Mihelčič, 1955)  
(=*Passalozetes propinquus* Mihelčič, 1956)  
Distribución: Paleártica centromeridional.
- *Bipassalozetes (B.) reticulatus* (Mihelčič, 1957) (*Passalozetes*)  
Distribución: Paleártica meridional.
- *Bipassalozetes (B.) strenzkei* (Weigmann, 2006) (*Passalozetes*)  
Distribución: Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Mongolia y Etiópica (Kenia).
- *Bipassalozetes (B.) striatus* (Mihelčič, 1955) (*Passalozetes*)  
(=*Passalozetes kaszabi* Mahunka, 1964)  
Distribución: Paleártica meridional.
- *Bipassalozetes (B.) vicinus* (Mihelčič, 1957) (*Passalozetes*)  
Distribución: Paleártica centromeridional (Europa centromeridional y Asia centrooccidental).
- Bipassalozetes (Passalobates)*** Pérez-Íñigo y Peña, 1996  
Especie tipo: *Passalobates asper* Pérez-Íñigo y Peña, 1996  
Distribución: Holártica.
- *Bipassalozetes (Passalobates) asper* (Pérez-Íñigo y Peña, 1996) (*P.*)  
Distribución: I. Canarias.
- *Bipassalozetes (Passalobates) linearis* (Higgins y Woolley, 1962) (*Passalozetes*)  
Distribución: Holártica meridional (U.S.A.: Utah, y Mediterránea).
- *Bipassalozete (Passalobates) sabulosus* (Shtanchaeva, 1986) (*Passalozetes*)  
Distribución: Cáucaso.
- ♠ ***Passalozetes*** Grandjean, 1932

Especie tipo: *Passalozetes africanus*  
Grandjean, 1932

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).

- *Passalozetes africanus* Grandjean, 1932  
Distribución: Paleártica centromeridional (frecuente) y Guinea Ecuatorial.
- *Passalozetes agricola* Mínguez y Subías, 1983  
Distribución: España.
- *Passalozetes hauseri* Mahunka, 1977  
Distribución: Mediterránea oriental.
- *Passalozetes hispanicus* Mihelčič, 1955  
Distribución: Mediterránea.
- *Passalozetes imperfectus* Pérez-Íñigo jr., 1991  
Distribución: España.
- *Passalozetes inlenticulatus* Mihelčič, 1959  
Distribución: Mediterránea.
- *Passalozetes macedonicus* Tarman, 1962  
Distribución: Macedonia.
- *Passalozetes nesebarensis* Vaněk, 1966  
Distribución: Bulgaria.
- *Passalozetes onubensis* Subías, Ruiz y Kahwash, 1990  
Distribución: España.
- *Passalozetes paucesculptus* Bernini, 1973  
Distribución: Italia (Sicilia).
- *Passalozetes ruderalis* Mínguez y Subías, 1983  
Distribución: España.
- *Passalozetes scholzi* Pérez-Íñigo y Peña, 1996  
Distribución: I. Canarias.
- *Passalozetes stellifer* Pérez-Íñigo y Peña, 1997  
Distribución: Mediterránea occidental.

#### ▲ **Phenopelopoidea** Petrunkevitch, 1955

#### ◆ **Phenopelopidae** Petrunkevitch, 1955

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

#### ♠ *Eupelops* Ewing, 1917

- (=*Allopelops* Hammer, 1952)
- (=*Celaeno* Koch, 1835, “*nom. praeoc.*” por Leach, 1821)
- (=*Globonothrus* Tseng, 1982)
- (=*Pelops* Koch, 1836, “*nom. praeoc.*” por Gistel, 1834)
- (=*Phenopelops* Petrunkevitch, 1955)
- (=*Tectopelops* Jacot, 1929)
- Especie tipo: (*Pelops hirsutus* Koch, 1844)
- =*Notaspis acromios* Hermann, 1804
- Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Eupelops acromios* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)  
(=*Pelops hirsutus* Koch, 1844)
- (=*Pelops kochi* Jacot, 1929)
- (=*Pelops phytophilus* Berlese, 1916)
- (=*Celaeno spinosa* Koch, 1835)
- Distribución: Paleártica (frecuente), Norte de Oriental y Sudáfrica.
- *Eupelops berleseii* (Oudemans, 1929) (*Peloptulus*) “*sp. inq.*”  
Distribución: Italia.
- *Eupelops caucasicus* Sitnikova, 1975

Distribución: Mediterránea oriental.

- *Eupelops claviger* (Berlese, 1916) (*Pelops*)
- *Eupelops claviger claviger* (Berlese, 1916)  
Distribución: Paleártica (Europa y Este de Paleártica oriental).
- *Eupelops claviger fuerteventurae* Pérez-Íñigo y Peña, 1996  
Distribución: I. Canarias.
- *Eupelops geminus* (Berlese, 1916) (*Pelops*)  
Distribución: Paleártica (Paleártica occidental y Este de Rusia asiática).
- *Eupelops gibbus* (Mihelčič, 1957) (*Pelops*)  
Distribución: España.
- *Eupelops halophilus* Pérez-Íñigo, 1969  
Distribución: Mediterránea.
- *Eupelops hygrophilus* (Knülle, 1954) (*Pelops*)  
Distribución: Europa centromeridional.
- *Eupelops latipilosus* (Ewing, 1909) (*Pelops*)  
Distribución: Holártica (U.S.A. centrooriental, Cáucaso y Asia centrooccidental).
- *Eupelops major* (Hull, 1914) (*Pelops*)  
(=*Pelops differens* Mihelčič, 1953)  
(=*Pelops hirtus* Berlese, 1916)  
(=*Pelops perarmatus* Hull, 1916)  
(=*Pelops simplex* Berlese, 1916)  
Distribución: Holártica (Europa centromeridional: frecuente, Paquistán y Canadá).
- *Eupelops occultus* (Koch, 1835) (*Pelops*)  
(=*Pelops brevicuspis* Knülle, 1954)  
Distribución: Paleártica: frecuente.
- *Eupelops plicatus* (Koch, 1835) (*Celaeno*)  
(=*Pelops acromios diversipilus* Mihelčič, 1957)  
(=*Pelops affinis* Berlese, 1916)  
(=*Pelops approximatus* Hull, 1916)  
(=*Pelops auritus* Koch, 1839)  
(=*Pelops diversus* Mihelčič, 1957)  
(=*Pelops fuliginus* Koch, 1839)  
(=*Pelops fusiger* Mihelčič, 1957)  
(=*Pelops laevigatus* Nicolet, 1855)  
(=*Pelops siculus* Berlese, 1916)  
Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Alaska y Virginia).
- *Eupelops reticulatus* (Willmann, 1939) (*Pelops*)  
Distribución: Macaronésica (Madeira).
- *Eupelops similis* (Berlese, 1916) (*Pelops*)  
Distribución: Europa meridional.
- *Eupelops somalicus* (Berlese, 1916) (*Pelops curtipilus s.*)  
Distribución: Somalia y Mediterránea (Portugal y Cáucaso).
- *Eupelops subexutus* (Berlese, 1916) (*Pelops*)  
(=?=*Pelops glaber* G. y R. Canestrini, 1882 “*sp. inq.*”)  
Distribución: Europa centromeridional.
- *Eupelops subuliger* (Berlese, 1916) (*Pelops*)  
(=*Pelops longifissus* Willmann, 1951)  
Distribución: Europa centromeridional.
- *Eupelops sulcatus* (Oudemans, 1914) (*Pelops*)  
(=*Pelops bilobus* Sellnick, 1928)  
(=*Pelops curtipilus* Berlese, 1916)  
(=*Pelops depilatus* Berlese, 1916)  
Distribución: Paleártica (excepto Este) y

## Groenlandia.

- *Eupelops tardus* (Koch, 1835) (*Pelops*) (= *Pelops nepotulus* Berlese, 1916) (= *Pelops pulchellus* Berlese, 1916)

Distribución: Paleártica (excepto Este).

- Eupelops torulosus* (Koch, 1839) (*Pelops*)
- *Eupelops torulosus torulosus* (Koch, 1839) (= *Pelops duplex* Berlese, 1916) (= *Pelops variolosus* Nicolet, 1855)

Distribución: Paleártica (excepto Este): frecuente.

- *Eupelops torulosus macroporosus* Pérez-Íñigo jr., 1991

Distribución: España.

- *Eupelops torulosus meridionalis* Pérez-Íñigo, 1969

Distribución: Mediterránea.

- *Eupelops uraceus* (Koch, 1839) (*Pelops*)
- Distribución: Paleártica (Europa y Asia centrooccidental) y Groenlandia.
- *Eupelops variatus* (Mihelčič, 1957) (*Pelops*)
- Distribución: Mediterránea.

♣ ***Peloptulus*** Berlese, 1908

Especie tipo: *Pelops phaeonotus* Koch, 1844

Distribución: Holártica y Neotropical.

- *Peloptulus borgesii* C. y C., jr. Pérez-Íñigo, 1996
- Distribución: I. Azores.
- *Peloptulus gibbus* Mihelčič, 1957
- Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).
- *Peloptulus latirostris* Pérez-Íñigo, 1969
- Distribución: España.
- *Peloptulus montanus* Hull, 1914
- Distribución: Paleártica (Europa y Asia centrooccidental).
- *Peloptulus phaeonotus* (Koch, 1844) (*Pelops*)
- Distribución: Paleártica (frecuente).
- *Peloptulus reticulatus* Mihelčič, 1957 (= *Peloptulus trinacriae* Arcidiacono, 1975)
- Distribución: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Peloptulus sacculiferus* Weigmann, 2008
- Distribución: Portugal.

▲ **Unduloribatoidea** Kunst, 1971♦ **Unduloribatidae** Kunst, 1971

Distribución: Paleártica meridional y Norte de Oriental.

♣ ***Unduloribates*** Balogh, 1943

Especie tipo: *Sphaerozetes (Tectoribates) undulatus* Berlese, 1914

Distribución: Paleártica alpina y Norte de Oriental.

- *Unduloribates undulatus* (Berlese, 1914) (*Sphaerozetes (Tectoribates)*)
- Distribución: Paleártica (Europa centromeridional e Himalaya).

▲ **Limnozetoidea** Thor, 1937♦ **Limnozetidae** Thor, 1937

Distribución: Cosmopolita (excepto Australiana).

♣ ***Limnozetes*** Hull, 1916

(= *Vietobates* Mahunka, 1987)

Especie tipo: (*Oribata sphagni* Michael, 1880) = *Acarus ciliatus* Schrank, 1803

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Oriental y Neotropical).

- *Limnozetes amnicus* Behan-Pelletier, 1989

Distribución: Holártica (Neártica septentrional e Ibérica).

- *Limnozetes ciliatus* (Schrank, 1803) (*Acarus*) (= *Limnozetes canadensis* Hammer, 1952) (= *Limnozetes ciliatus foveolatus* Willmann, 1939) (= *Oribata sphagni* Michael, 1880)

Distribución: Holártica y ¿Centroamérica?.

- *Limnozetes onondaga* Behan-Pelletier, 1989

Distribución: Holártica (Neártica septentrional y España).

- *Limnozetes rugosus* (Sellnick, 1923) (*Ceratozetes*)

Distribución: Paleártica: Europa (menos frecuente en el Sur) y Japón.

♦ **Austrachipteriidae** Luxton, 1985

Distribución: Tropical y subtropical.

♣ ***Lamellobates*** Hammer, 1958

Especie tipo: (*Lamellobates palustris* Hammer, 1958) = *Achipteria molecula* Berlese, 1916

***Lamellobates (Lamellobates)*** Hammer, 1958

Distribución: Pantropical y subtropical.

*Lamellobates (L.) molecula* (Berlese, 1916) (*Achipteria*)

- *Lamellobates (L.) molecula aegypticus* Bayoumi, 1979 (*L. hauseri* a.)

Distribución: Mediterránea oriental.

- *Lamellobates (L.) orientalis* Csiszár, 1961

Distribución: Oriental (frecuente) y Paleártica meridional (Egipto y Japón).

***Lamellobates (Paralamellobates)*** Bhaduri y Raychaudhuri, 1968

Especie tipo: *Lamellobates*

(*Paralamellobates*) *bengalensis* Bhaduri y Raychaudhuri, 1968

Distribución: Pantropical y Paleártica meridional.

- *Lamellobates (Paralamellobates) misella* (Berlese, 1910) (*Oribatella*)

(= *Oribatella ceylanica* Oudemans, 1915)

(= *Oribatella schoutedeni* Balogh, 1959)

Distribución: Pantropical: frecuente, y Paleártica meridional.

♣ ***Palmitalia*** Pérez-Íñigo y Peña, 1997

Especie tipo: *Palmitalia latilamellata* Pérez-Íñigo y Peña, 1997

Distribución: Paleártica meridional.

- *Palmitalia latilamellata* Pérez-Íñigo y Peña, 1997

Distribución: I. Canarias.

▲ **Achipterioidea** Thor, 1929

◆ **Achipteriidae** Thor, 1929

Distribución: Holártica, Oriental y Neotropical.

♠ **Achipteria** Berlese, 1885

Especie tipo: (*Oribata nicoleti* Berlese, 1883) = *Acarus coleopratus* Linnaeus, 1758

Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Oriental y Neotropical)).

• *Achipteria acuta* Berlese, 1908 (= *Notaspis anglicus* Oudemans, 1914) (= *Notaspis mixtus* Sellnick, 1943) (= *Oribata nitens* Nicolet, 1855, "nom. praeoc." por Gervais, 1844) (= *Oribata nitens* L. Koch, 1879, "nom. praeoc." por Gervais, 1844)

(= *Achipteria nitens* Kishida, 1930, "nom. praeoc." por Nicolet, 1855)

Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Virginia).

• *Achipteria coleoprata* (Linnaeus, 1758) (*Acarus*)

(= *Oribata intermedia* Michael, 1898)

(= *Oribata nicoleti* Berlese, 1883)

(= *Oribata ovalis* Nicolet, 1855, "nom. praeoc." por Koch, 1835)

(= *Oribata redux* Hull, 1914)

Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y Neártica septentrional), India (Sikkim) e I. Santa Helena.

• *Achipteria holomonensis* Cancela da Fonseca y Stamou, 1987

Distribución: Grecia.

• *Achipteria italica* (Oudemans, 1914) (*Notaspis*)

Distribución: Europea.

• *Achipteria longesensillus* Schweizer, 1956

Distribución: Europa centromeridional.

• *Achipteria longisetosa* Weigmann y Murvanidze, 2003

Distribución: Cáucaso.

• *Achipteria moderatior* Berlese, 1923 (*A. nitens* m.) "sp. inq."

Distribución: Oeste de Europa.

• *Achipteria praeoccupata* Subías, 2004 (= *Achipteria oudemansi* Hammen, 1952, "nom. praeoc." por Jacot, 1929)

Distribución: Mediterránea.

• *Achipteria regalis* Berlese, 1908

Distribución: Oeste de Europa.

• *Achipteria sellnicki* Hammen, 1952

Distribución: Europea y Mongolia.

♠ **Anachipteria** Grandjean, 1932

Especie tipo: *Anachipteria deficiens* Grandjean, 1932

Distribución: Holártica, Oriental y Neotropical.

• *Anachipteria aegyptiaca* Abdel-Hamid, 1964

Distribución: Egipto.

• *Anachipteria deficiens* Grandjean, 1932

Distribución: Paleártica centromeridional.

• *Anachipteria grandis* Aoki, 1961

Distribución: Paleártica (Cáucaso y Este de Paleártica oriental).

• *Anachipteria howardi* (Berlese, 1908)

(*Sphaerozetes*)

(= *Anachipteria achipteroides milleri* Jacot, 1936)

(= *Oribata corpuscula* Ewing, 1908)

(= *Sphaerozetes latitectus* Berlese, 1908)

(= *Oribata major* Mihelčič, 1956)

(= *Oribata perisi* Mihelčič, 1956)

Distribución: Holártica (Europa, Asia centrooccidental y Neártica).

• *Anachipteria shtanchaevae* Subías, 2009

(= *Oribata tecta alpina* Schweizer, 1922, "nom. praeoc." por Halbert, 1915)

Distribución: Europa centromeridional.

♠ **Campachipteria** Aoki, 1995

Especie tipo: *Campachipteria uenoi* Aoki, 1995

Distribución: Holártica y Oriental.

• *Campachipteria bella* (Sellnick, 1928) (*Notaspis*)

Distribución: Holártica.

• *Campachipteria fanzagoi* (Jacot, 1929) (*Achipteria*)

(= *Parachipteria willmanni* Hammen, 1952)

Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Virginia) y Centroamérica.

• *Campachipteria patavina* (Oudemans, 1914) (*Notaspis*)

Distribución: Paleártica (Europa centromeridional y Rusia asiática).

• *Campachipteria perproxima* (Sellnick, 1931) (*Notaspis*)

(= *Parachipteria georgica* Murvanidze y Weigmann, 2003)

Distribución: Europa meridional.

• *Campachipteria petiti* (Travé, 1960) (*Parachipteria*)

Distribución: Mediterránea.

• *Campachipteria weigmanni* (Pérez-Íñigo, 1987) (*Parachipteria*)

Distribución: I. Azores.

♠ **Cerachipteria** Grandjean, 1935

(= *Zygachipteria* Mihelčič, 1956)

Especie tipo: *Cerachipteria digita* Grandjean, 1935

Distribución: Paleártica.

*Cerachipteria digita* Grandjean, 1935

• *Cerachipteria digita digita* Grandjean, 1935

Distribución: Oeste de Europa.

• *Cerachipteria digita jugata* Mihelčič, 1956 (*C. (Zygachipteria) j.*)

Distribución: España.

• *Cerachipteria minuscula* (Berlese, 1902) (*Oribata*)

Distribución: Italia.

• *Cerachipteria pyrenaica* Pérez-Íñigo jr., 1991 (*C. digita p.*)



(?=*Cerachipteria fusiger* Mihelčič, 1957 “*sp. inq.*”)

Distribución: España.

♣ ***Parachipteria*** Hammen, 1952

(=*Pseudachipteria* Travé, 1960)

Especie tipo: *Oribata punctata* Nicolet, 1855

Distribución: Holártica y Oriental.

• *Parachipteria agenjoi* (Pérez-Íñigo, 1976) (*Pseudachipteria*)

Distribución: I. Canarias.

• *Parachipteria floresiana* (Pérez-Íñigo, 1992) (*Pseudachipteria*)

Distribución: I. Azores.

• *Parachipteria insularis* (Pérez-Íñigo, 1992) (*Pseudachipteria*)

Distribución: I. Azores.

• *Parachipteria magna* (Sellnick, 1928) (*Notaspis*)

Distribución: Europea.

• *Parachipteria punctata* (Nicolet, 1855) (*Oribata*)

Distribución: Holártica (frecuente en Paleártica) e I. Santa Helena.

♣ ***Plakoribates*** Popp, 1960

Especie tipo: *Plakoribates multicuspidatus* Popp, 1960

Distribución: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical (Paleártica meridional).

• *Plakoribates multicuspidatus* Popp, 1960

Distribución: Egipto.

♦ **Tegoribatidae** Grandjean, 1954

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

♣ ***Lepidozetes*** Berlese, 1910

(=*Onazetes* Bugrov, 1991)

Especie tipo: *Lepidozetes singularis* Berlese, 1910

Distribución: Holártica.

• *Lepidozetes latipilosus* Hammer, 1952

Distribución: Holártica (Neártica septentrional, Mediterránea oriental y Paleártica oriental: excepto Este).

• *Lepidozetes singularis* Berlese, 1910 (=*Lepidozetes conjunctus* Schweizer, 1922)

(=*Lepidozetes chernovi* Rjabinin, 1974)

Distribución: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional): frecuente.

♣ ***Scutozetes*** Hammer, 1952

(=*Neolepidozetes* Hammer, 1977)

Especie tipo: *Scutozetes lanceolatus* Hammer, 1952

Distribución: Holártica y Neotropical.

• *Scutozetes lanceolatus* Hammer, 1952

Distribución: Holártica (Neártica septentrional: frecuente, Paleártica occidental: Mediterránea oriental, y Paleártica oriental:

frecuente) y Surinám.

♣ ***Tegoribates*** Ewing, 1917

(=*Lepidoribates* Sellnick, 1920)

Especie tipo: *Tegoribates subniger* Ewing, 1917

Distribución: Holártica y Neotropical.

• *Tegoribates latirostris* (Koch, 1844) (*Zetes*) (=*Oribata alzanii* Coggi, 1900)

Distribución: Paleártica (menos frecuente en el Sur).

♣ ***Umbellozetes*** Krivolutsky, 1969

Especie tipo: *Umbellozetes fuscus* Krivolutsky, 1969

Distribución: Paleártica.

• *Umbellozetes fuscus* Krivolutsky, 1969

Distribución: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).

▲ **Oribatelloidea** Jacot, 1925

♦ **Oribatellidae** Jacot, 1925

Distribución: Cosmopolita.

♣ ***Ferolocella*** Grabowski, 1971

(=*Genzella* Kulijev, 1977)

Especie tipo: (*Oribatella carolina* Banks, 1947) =*Oribatella tessellata* Berlese, 1908

Distribución: Holártica.

• *Ferolocella cribraria* (Kulijev, 1977) (*Genzella*)

(=*Oribatella sitnikovae* Djaparidze, 1989)

Distribución: Cáucaso.

♣ ***Joelia*** Oudemans, 1906

(=*Coggiella* Berlese, 1916)

Especie tipo: *Oribata fiorii* Coggi, 1898

Distribución: “Holártica” y Neotropical.

• *Joelia dubia* (Kulijev, 1967) (*Oribatella*)

Distribución: Cáucaso y Méjico?.

• *Joelia fiorii* (Coggi, 1898) (*Oribata*)

Distribución: Mediterránea y Méjico.

• *Joelia spina* Kulijev, 1979

Distribución: Cáucaso.

♣ ***Ophidiotrichus*** Grandjean, 1953

Especie tipo: (*Oribata connexa* Berleser, 1904) =*Oribata tecta* Michael, 1884

Distribución: Holártica.

• *Ophidiotrichus corsicanus* Bernini y Avanzati, 1983

Distribución: Francia (Córcega).

• *Ophidiotrichus oglasae* Bernini, 1975

Distribución: Mediterránea occidental.

• *Ophidiotrichus tectus* (Michael, 1884) (*Oribata*) (=*Notaspis borussicus* Sellnick, 1908)

(=*Oribata connexa* Berlese, 1904)

Distribución: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).

• *Ophidiotrichus vindobonensis* Piffel, 1961 (*O. connexus* v.)

Distribución: Europa centromeridional.

♣ **Oribatella** Banks, 1895

Especie tipo: *Oribatella quadridentata*

Banks, 1895

**Oribatella (Oribatella)** Banks, 1895

Distribución: Cosmopolita.

- *Oribatella (O.) abdurachmanovi* Shtanchaeva, 2009  
Distribución: Cáucaso.
- *Oribatella (O.) angulosa* Csiszár, 1962  
Distribución: Mediterránea oriental.
- *Oribatella (O.) arabia* Kardar, 1988  
Distribución: Arabia Saudita.
- *Oribatella (O.) asiatica* Krivolutsky, 1974  
Distribución: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).
- *Oribatella (O.) azizia* Kardar y Mattu, 1999  
Distribución: Arabia Saudita.
- *Oribatella (O.) berlesei* (Michael, 1898) (*Oribata*)  
Distribución: Paleártica occidental, Este de Rusia asiática y Canadá?
- *Oribatella (O.) berninii* Pérez-Íñigo, 1989  
Distribución: España.
- *Oribatella (O.) brevicuspidis* Bernini, 1972  
Distribución: Suroeste de Europa.
- *Oribatella (O.) bulanovae* Kulijev, 1967  
Distribución: Europa centrooriental.
- *Oribatella (O.) calcarata* (Koch, 1835) (*Oribata*) (= *Oribatella decumana* Berlese, 1910)  
Distribución: Holártica (Paleártica, Canadá y "U.S.A").
- *Oribatella (O.) colchica* Krivolutsky, 1974  
Distribución: Mediterránea oriental.
- *Oribatella (O.) crassipilosa* Bernini, 1975  
Distribución: Suroeste de Europa.
- *Oribatella (O.) eutricha* Berlese, 1908 (= *Oribatella producta quadrimucronata* Berlese, 1910)  
Distribución: Europa centromeridional.
- *Oribatella (O.) exilicornis* Berlese, 1910  
Distribución: Mediterránea.
- *Oribatella (O.) foliata* Krivolutsky, 1974 (= *Oribatella brevipila* Bernini, 1977)  
Distribución: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Este de Rusia oriental).
- *Oribatella (O.) gomerae* Pérez-Íñigo, 1986  
Distribución: I. Canarias.
- *Oribatella (O.) heterodontata* Karppinen y Shtanchaeva, 1987  
Distribución: Cáucaso.
- *Oribatella (O.) hungarica* Balogh, 1943  
Distribución: Mediterránea.
- *Oribatella (O.) ichnusae* Bernini y Avanzati, 1983  
Distribución: Italia (Cerdeña).
- *Oribatella (O.) inflexa* Mihelčič, 1957  
Distribución: Mediterránea.
- *Oribatella (O.) krivolutskyi* Karppinen y Shtanchaeva, 1987  
Distribución: Cáucaso.
- *Oribatella (O.) kunsti* Bernini, 1972

- Distribución: Suroeste de Europa.
- *Oribatella (O.) longispina* Berlese, 1914  
Distribución: Oeste de Europa.
- *Oribatella (O.) luisae* Bernini, 1979  
Distribución: Mediterránea.
- *Oribatella (O.) mahani* Pérez-Íñigo y Peña, 1996  
Distribución: I. Canarias.
- *Oribatella (O.) nigra* Kulijev, 1967  
Distribución: Cáucaso.
- *Oribatella (O.) nugarica* Bernini y Avanzati, 1983  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Oribatella (O.) ornata* (Coggi, 1900) (*Oribata*) (= *Oribatella producta* Berlese, 1908)  
Distribución: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Oribatella (O.) parvula* Bernini, 1974  
Distribución: Italia.
- *Oribatella (O.) phyllophora* Jeleva, 1962  
Distribución: Sureste de Europa.
- *Oribatella (O.) pulchra* Bernini, 1974  
Distribución: Europa meridional.
- *Oribatella (O.) quadricornuta* (Michael, 1880) (*Oribata*) (?= *Oribata flammula* Koch, 1839 "sp. inq.") (?= *Oribata quadricuspis* Grube, 1859 "sp. inq.")  
Distribución: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional): frecuente.
- *Oribatella (O.) reticulata* Berlese, 1916  
Distribución: Holártica meridional: Europa centromeridional, Paleártica oriental meridional y Neártica (U.S.A.: Misuri, y Canadá?).
- *Oribatella (O.) sardoa* Bernini, 1979  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Oribatella (O.) sexdentata* Berlese, 1916  
Distribución: Holártica (Europa, Este de Rusia asiática y U.S.A.: Virginia).
- *Oribatella (O.) shaldybiniae* Rjabinin, 1974  
Distribución: Sureste de Paleártica oriental.
- *Oribatella (O.) superbula* (Berlese, 1904) (*Oribata*) (= *Oribatella meridionalis* Berlese, 1908)  
Distribución: Paleártica meridional (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, y Paleártica oriental meridional) y Norte de Oriental.
- *Oribatella (O.) tenerifensis* Pérez-Íñigo, 1986  
Distribución: I. Canarias.
- *Oribatella (O.) tenuis* Csiszár, 1962  
Distribución: Mediterránea oriental.
- *Oribatella (O.) triangulata* Pérez-Íñigo jr., 1990  
Distribución: España.
- *Oribatella (O.) tridactyla* Ruiz, Subías y Kahwash, 1991  
Distribución: Suroeste de Europa.
- *Oribatella (O.) tyrrhenica* Bernini, 1975  
Distribución: Suroeste de Europa.
- *Oribatella (O.) valeriae* Mahunka y Mahunka-Papp, 2010  
Distribución: Grecia.
- *Oribatella (O.) willmanni* Subías y Gil-Martín, 1995

(=*Oribatella similesuperbula* Weigmann, 2001)

Distribución: Europa centromeridional.

***Oribatella (Fbernina)*** Özdikmen, 2008

(=*Cavernella* Bernini, 1975, “*nom. praeoc.*” por Morozova, 1975)

(=*Berniniella* Özdikmen, 2008, “*nom. praeoc.*” por Balogh, 1983)

Especie tipo: *Cavernella helenae* Bernini, 1975

Distribución: Paleártica.

• *Oribatella (Fbernina) helenae* (Bernini, 1975) (*Cavernella*)

Distribución: Suroeste de Europa.

***Oribatella (Fenestrobates)*** Balogh y Mahunka, 1969

Especie tipo: *Fenestrobates capucinus* Balogh y Mahunka, 1969

Distribución: Neotropical y Paleártica meridional.

• *Oribatella (Fenestrobates) rossica* (Krivolutsky, 1974) (*F.*)

Distribución: Paleártica oriental meridional y Cáucaso.

***Oribatella (Multoribatella)*** Subías, 2004

Especie tipo: *Oribatella bromeliarum* Behan-Pelletier y Paoletti, 1993

Distribución: Neotropical y Paleártica meridional.

• *Oribatella (Multoribatella) kurchevae* Krivolutsky, 1974 (*O.*)

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Oribatella (Multoribatella) pseudonigra* Subías y Shtanchaeva, 2011

Distribución: Cáucaso

♣ ***Pseudotectoribates*** Subías, 1977

Especie tipo: (*Pseudotectoribates bellus* Subías, 1977) =*Anachipteria subsimilis* Mihelčič, 1956

Distribución: Paleártica y Etiópica.

• *Pseudotectoribates minidentatus* Ruiz, Subías y Kahwash, 1991

Distribución: Mediterránea occidental.

• *Pseudotectoribates subsimilis* (Mihelčič, 1956) (*Anachipteria*)

(=*Pseudotectoribates bellus* Subías, 1977)

(=*Anachipteria kittenbergeri* Balogh, 1959)

Distribución: Mediterránea occidental y Etiópica (Tanzania y Sudáfrica).

♣ ***Siciliotrichus*** Bernini, 1983

Especie tipo: *Siciliotrichus sculus* Bernini, 1983

Distribución: Paleártica.

• *Siciliotrichus sculus* Bernini, 1983

Distribución: Mediterránea occidental.

♣ ***Tectoribates*** Berlese, 1910

(=*Anoribatella* Kunst, 1962)

Especie tipo: *Sphaerozetes (Tectoribates) proximus* Berlese, 1910

Distribución: Paleártica y Neotropical.

• *Tectoribates ornatus* (Schuster, 1958)

(*Anachipteria*)

Distribución: Paleártica y Neotropical (Argentina y Uruguay).

• *Tectoribates proximus* (Berlese, 1910)

(*Sphaerozetes (T.)*)

(=*Tectoribates punctatus* Sellnick, 1943)

Distribución: Mediterránea occidental.

▲ **Ceratozetoidea** Jacot, 1925

◆ **Heterozetidae** Kunst, 1971

Distribución: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).

♠ ***Farchacarus*** Wallwork, 1967

(=*Africacarus* Wallwork, 1965)

Especie tipo: *Africacarus calcaratus* Wallwork, 1965

Distribución: Paleotropical.

• *Farchacarus calcaratus* (Wallwork, 1965) (*Africacarus*)

Distribución: Etiópica (Tchad y Senegal) y Macaronésica (Cabo Verde).

♠ ***Heterozetes*** Willmann, 1917

Especie tipo: *Ceratozetes (Heterozetes) palustris* Willmann, 1917

Distribución: Holártica, Oriental y Neotropical.

• *Heterozetes palustris* (Willmann, 1917) (*Ceratozetes (H.)*)

Distribución: Paleártica.

◆ **Ceratozetidae** Jacot, 1925

Distribución: Cosmopolita.

♠ ***Ceratozetella*** Shaldybina, 1966

(=*Ceratozetoides* Shaldybina, 1966)

(=*Ceresella* Paulitchenko, 1993)

Especie tipo: *Ceratozetes sellnicki* Rajska, 1958

Distribución: Holártica, Neotropical y Australiana.

• *Ceratozetella bregetovae* Shaldybina, 1970

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Sur de Siberia).

• *Ceratozetella cisalpina* (Berlese, 1908) (*Ceratozetes*)

Distribución: Holártica (Europa: menos frecuente en el Oeste, Paleártica oriental y U.S.A.: Minesota).

• *Ceratozetella cuspidodenticulata* (Kulijev, 1962) (*Ceratozetes*)

Distribución: Mediterránea.

• *Ceratozetella djaparidzae* Shaldybina, 1979

Distribución: Cáucaso.

• *Ceratozetella fjellbergi* (Behan-Pelletier, 1986) (*Ceratozetes*)

(=*Ceratozetella helenae* Paulitchenko, 1993)

Distribución: Holártica: Neártica septentrional y Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental: excepto Norte).

- *Ceratozetella maxima* (Berlese, 1908) (*Ceratozetes*) (= *Sphaerozetes major* Irk, 1939) (= *Sphaerozetes maximus* Willmann, 1953, “*nom. praeoc.*” por Berlese, 1908) (= *Ceratozetes maximus jeanneli* Trägårdh, 1925) (?= *Acarus spinipes* Müller, 1776 “*sp. inq.*”) (?= *Sphaerobates subseminulum* Oudemans, 1902 “*sp. inq.*”) Distribución: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Ceratozetella minima* (Sellnick, 1928) (*Ceratozetes*) Distribución: Paleártica (Europa: menos frecuente en el Norte, y Paleártica oriental meridional)
- *Ceratozetella redempta* (Caroli y Maffia, 1934) (*Ceratozetes*) Distribución: Italia.
- *Ceratozetella sellnicki* (Rajski, 1958) (*Ceratozetes*) Distribución: Paleártica (Europa: excepto Oeste, y Paleártica oriental): frecuente.
- *Ceratozetella thienemanni* (Willmann, 1943) (*Ceratozetes*) (= *Ceratozetes aelleni* Mahunka, 1983) Distribución: Holártica septentrional (frecuente Boreal) y Neotropical.
- ♣ *Ceratozetes* Berlese, 1908  
Especie tipo: *Oribata gracilis* Michael, 1884  
Distribución: Cosmopolita.
- *Ceratozetes armatus* Mihelčič, 1956  
Distribución: Paleártica (Europa centromeridional y Asia centrooccidental).
- *Ceratozetes campestris* Mihelčič, 1956 (= *Ceratozetes obtusus* Mihelčič, 1956)  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Ceratozetes colchica* Murvanidze y Weigmann, 2003  
Distribución: Cáucaso.
- *Ceratozetes conjunctus* Mihelčič, 1956 (= *Ceratozetes contiguus* Jeleva, 1962)  
Distribución: Mediterránea (frecuente).
- *Ceratozetes gemmula* Pérez-Íñigo jr., 1990  
Distribución: España.
- *Ceratozetes gracilis* (Michael, 1884) (*Oribata*) (= *Ceratozetes fusiger* Mihelčič, 1956) (= *Ceratozetes grandis* Berlese, 1908) (= *Ceratozetes longocuspidadus* Kulijev, 1962)  
Distribución: Cosmopolita: Holártica (frecuente), I. Santa Helena, Oriental, Nueva Zelanda, Neotropical (Chile y Panamá) y Antártica (I. Shetland del Sur).
- *Ceratozetes guadarramicus* Pérez-Íñigo, 1991  
Distribución: España.
- *Ceratozetes lagrecai* Bernini, 1973 (?= *Sphaerozetes elongatissimus* Berlese, 1908 “*sp. inq.*”) Distribución: Mediterránea.
- *Ceratozetes laticuspidadus* Menke, 1964 (?= *Oribata myrmobates* Berlese, 1903 “*sp. inq.*”)
- (?= *Ceratozetes petrovi* Kulijev, 1962 “*sp. inq.*”) Distribución: Europa centromeridional (frecuente).
- *Ceratozetes macromediocris* Shaldybina, 1970  
Distribución: Europa oriental.
- *Ceratozetes mediocris* Berlese, 1908 (= *Ceratozetes dubius* Mihelčič, 1956) (= *Ceratozetes japonicus* Aoki, 1961)  
Distribución: Semicosmopolita: Holártica (frecuente en Paleártica), Oriental y Australiana (Nueva Zelanda).
- *Ceratozetes microsetosus* Ayyildiz y Luxton, 1989  
Distribución: Turquía.
- *Ceratozetes minutissimus* Willmann, 1951  
Distribución: Paleártica centromeridional.
- *Ceratozetes nanus* Subías, 2001 (= *Ceratozetes minutissimus* Subías y Arillo, 2000, “*nom. praeoc.*” por Willmann, 1951)  
Distribución: España.
- *Ceratozetes nasutus* Subías, Kahwash y Ruiz, 1990  
Distribución: España.
- *Ceratozetes parvulus* Sellnick, 1922  
*C. (Allozetes)*  
Distribución: Boreoalpina (Euro Siberiana, Cáucaso y Neártica septentrional).
- *Ceratozetes peritus* Grandjean, 1951  
Distribución: Holártica (Europa y Canadá).
- *Ceratozetes psammophilus* Horak, 2000  
Distribución: Europa occidental.
- *Ceratozetes simulator* Pérez-Íñigo, 1970 (= *Ceratozetes petri* Weigmann, 1976)  
Distribución: Mediterránea.
- ♣ *Edwardzetes* Berlese, 1914  
Especie tipo: *Oribata edwardsi* Nicolet, 1855  
Distribución: Semicosmopolita (excepto paleotropical).
- *Edwardzetes edwardsi* (Nicolet, 1855) (*Oribata*) (= *Notaspis edwardsi lapponicus* Trägårdh, 1902)  
Distribución: Boreoalpina: Euroatlántica (frecuente), Cáucaso y Groenlandia.
- *Edwardzetes ubali* Iturrondobeitia y Caballero, 2000  
Distribución: España.
- ♣ *Euzetes* Berlese, 1908  
Especie tipo: *Oribata globula* Nicolet, 1855  
Distribución: Holártica y Neotropical.
- *Euzetes globulus* (Nicolet, 1855) (*Oribata*) (= *Oribata nitens* Johnston, 1853, “*nom. praeoc.*” por Gervais, 1844)  
Distribución: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Este de Paleártica oriental) y Neotropical (Argentina).
- ♣ *Fuscozetes* Sellnick, 1928  
Especie tipo: *Oribata fuscipes* Koch, 1844  
Distribución: Holártica y Oriental.
- *Fuscozetes fuscipes* (Koch, 1844) (*Oribata*) (= *Galumna slossonae* Banks, 1906)

Distribución: Holártica (menos frecuente en el Sur), ¿Costa Rica? y Vietnam.

- *Fuscozetes intermedius* Caroli y Maffia, 1934 (?=*Oribata rubens* Koch, 1839 “*sp. inq.*”)

Distribución: Paleártica occidental (excepto Este).

- *Fuscozetes novus* Shaldybina, 1969

Distribución: Mediterránea oriental.

- *Fuscozetes pini* Dalenius, 1964

Distribución: Paleártica occidental (Suecia y Cáucaso).

- *Fuscozetes setosus* (Koch, 1839) (*Oribata*)

Distribución: Holártica (Paleártica y Neártica nororiental) y China (Tíbet).

♣ ***Ghilarovizetes*** Shaldybina, 1969

Especie tipo: *Ghilarovizetes obtusus* Shaldybina, 1969

Distribución: Holártica y Etiópica.

- *Ghilarovizetes obtusus* Shaldybina, 1969

Distribución: Paleártica (Cáucaso y Paleártica oriental).

- *Ghilarovizetes rostralis* Shaldybina, 1969

Distribución: Asia centrooccidental y Cáucaso.

♣ ***Hispanozetes*** Subías y Shtanchaeva, 2011

Especie tipo: *Ceratozetes aragonensis* Pérez-Íñigo jr., Herrero y Pérez-Íñigo, 1988

Distribución: Paleártica.

- *Hispanozetes aragonensis* (Pérez-Íñigo jr., Herrero y Pérez-Íñigo, 1988) (*Ceratozetes*)

Distribución: Suroeste de Europa.

- *Hispanozetes bicarinatus* Subías y Shtanchaeva, 2011

Distribución: España.

- *Hispanozetes bicorniculatus* Subías y Shtanchaeva, 2011

Distribución: España.

- *Hispanozetes foveolatus* Subías y Shtanchaeva, 2011

Distribución: España.

- *Hispanozetes punctulatus* Subías y Shtanchaeva, 2011

Distribución: Francia.

- *Hispanozetes striatus* Subías y Shtanchaeva, 2011

Distribución: España.

♣ ***Macrogena*** Wallwork, 1966

(=*Lophozetes* P. Balogh, 1985)

Especie tipo: *Macrogena monodactyla* Wallwork, 1966

Distribución: Antártica, Australiana austral y Paleártica meridional.

- *Macrogena minor* (Subías, Kahwash y Ruiz, 1990) (*Mycobates*)

Distribución: Mediterránea occidental.

♣ ***Melanozetes*** Hull, 1916

(=*Alphypochthonius* Schweizer, 1956)

(=*Sculptozetes* Mahunka, 1984)

Especie tipo: *Oribata mollicomus* Koch,

1839

Distribución: Holártica y Etiópica.

- *Melanozetes azoricus* Weigmann, 1976

- *Melanozetes azoricus azoricus* Weigmann, 1976

Distribución: I. Azores.

- *Melanozetes azoricus floresianus* Pérez-Íñigo, 1992

Distribución: I. Azores.

- *Melanozetes azoricus sanctaemariae* Pérez-Íñigo, 1992

Distribución: I. Azores.

- *Melanozetes meridianus* Sellnick, 1928

Distribución: Holártica (menos frecuente en el Sur).

- *Melanozetes mollicomus* (Koch, 1839) (*Oribata*)

(=*Melanozetes mollisimilis* Schweizer, 1956)

Distribución: Boreoalpina (Paleártica occidental: menos frecuente en el Sur, Paleártica oriental: excepto Este, y Neártica septentrional).

♣ ***Oromurcia*** Thor, 1930

Especie tipo: *Oromurcia bicuspidata* Thor, 1930

Distribución: Holártica.

- *Oromurcia bicuspidata* Thor, 1930

(?=*Trichoribates lucens distinguendus* Berleser, 1923 “*sp. inq.*”)

(=*Oromurcia sudetica* Willmann, 1939)

Distribución: Paleártica occidental (frecuente en Norte de Europa), Noroeste de Siberia y Groenlandia.

- *Oromurcia lucens* (Koch, 1879) (*Oribata*)

(=*Notaspis setosa curta* Trägårdh, 1902)

(=*Claviceps trimaculatus* L. Koch, 1879)

Distribución: Boreoalpina.

♣ ***Sphaerozetes*** Berlese, 1885

(=*Incudozetes* J. y P. Balogh, 2002)

(=*Sphaerozetella* Jacot, 1929)

Especie tipo: *Oribata orbicularis* Koch, 1835

Distribución: Holártica, Neotropical y Australiana.

- *Sphaerozetes comelicensis* Lombardini, 1963

Distribución: Italia.

*Sphaerozetes globularis* Lombardini, 1963 “*sp. inq.*”

- *Sphaerozetes (S.) globularis globularis*

Lombardini, 1963 “*sp. inq.*”

Distribución: Italia.

- *Sphaerozetes (S.) globularis neominatus* Subías, 2004 “*sp. inq.*”

(=*Sphaerozetes globularis maior* Lombardini, 1963, “*nom. praeoc.*” por Irk, 1939)

Distribución: Italia.

- *Sphaerozetes neglectus* (Kulijev, 1979) (*Trichoribates*)

Distribución: Cáucaso.

- *Sphaerozetes orbicularis* (Koch, 1835) (*Oribata*)

(=*Sphaerozetes italiensis* Jacot, 1939)

Distribución: Paleártica (excepto Este de

Paleártica oriental): frecuente.

- *Sphaerozetes perezinigo* Gómez-Llusá, 1988

Distribución: España.

- *Sphaerozetes piriformis* (Nicolet, 1855)

(*Oribata*)

Distribución: Paleártica (Europa: frecuente, y Noroeste de Siberia).

- *Sphaerozetes subintectus* Sellnick, 1931 “*sp. inq.*”

Distribución: Grecia.

- *Sphaerozetes tricuspoidatus* Willmann, 1923

Distribución: Paleártica (Europa y Asia central rusa).

#### ♣ *Trichoribates* Berlese, 1910

Especie tipo: *Sphaerozetes (Trichoribates) berlesei* Jacot, 1929

***Trichoribates (Trichoribates)* Berlese, 1910**

(?=*Claviceps* Canestrini y Fanzago, 1877 “*gen. inq.*”)

(?=*Murcia* Koch, 1835 “*gen. inq.*”)

Distribución: Holártica, Neotropical y Oriental.

- *Trichoribates (T.) angulatus* (Koch, 1839)

(*Oribata*)

(=*Jugatala rotunda* Willmann, 1953)

Distribución: Europa centrooccidental.

- *Trichoribates (T.) angustatus* Mihelčič, 1957

(?=*Sphaerozetes prudens* Berlese, 1913 “*sp. inq.*”)

Distribución: Mediterránea.

- *Trichoribates (T.) berlesei* (Jacot, 1929)

(*Sphaerozetes (T.)*)

(?=*Murcia trimaculata* Koch, 1835 “*sp. inq.*”)

Distribución: Holártica (frecuente en Paleártica).

- *Trichoribates (T.) brevicuspis* Mihelčič, 1958

(=*Trichoribates longipilis* Mihelčič, 1956, “*nom. praeoc.*” por Willmann, 1951)

(=*Trichoribates pilosus* Mihelčič, 1966)

Distribución: Mediterránea occidental.

- *Trichoribates (T.) caucasicus* Shaldybina, 1971

Distribución: Cáucaso.

- *Trichoribates (T.) hirtus* (Canestrini y Fanzago, 1877) (*Claviceps*) “*sp. inq.*”

Distribución: Italia.

- *Trichoribates (T.) longipilis* Willmann, 1951

Distribución: Europa meridional.

- *Trichoribates (T.) monticola* (Trägårdh, 1902)

(*Notaspis*)

(=*Trichoribates montanus* Irk, 1939)

Distribución: Euroatlántica y Cáucaso.

- Trichoribates (T.) novus* (Sellnick, 1928)

(*Murcia*)

- *Trichoribates (T.) novus novus* (Sellnick, 1928)

Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Virginia).

- *Trichoribates (T.) novus dentatus* Mihelčič, 1957

Distribución: Mediterránea (España y Cáucaso).

- *Trichoribates (T.) punctatus* Shaldybina, 1971

Distribución: Paleártica meridional (Europa

suroriental y Paleártica oriental meridional).

- *Trichoribates (T.) ruber* (Canestrini y Fanzago, 1877) (*Claviceps*) “*sp. inq.*”

Distribución: Italia.

- *Trichoribates (T.) scilierensis* Bayartogtokh y Schatz, 2008

Distribución: Europa centromeridional.

- *Trichoribates (T.) zingerlei* Bayartogtokh y Schatz, 2008

Distribución: Italia.

***Trichoribates (Latilamellobates)* Shaldybina, 1971**

(=*Trichoribatella* Mahunka, 1983)

(=*Vicinebates* Paulitchenko, 1991)

Especie tipo: *Oribata incisella* Kramer, 1897

Distribución: Holártica.

- *Trichoribates (Latilamellobates) algarvensis* (Subías y Gil-Martín, 1990) (*L.*)

Distribución: Suroeste de Europa.

- *Trichoribates (Latilamellobates) clavatus* Mihelčič, 1956 (*T.*)

Distribución: Mediterránea.

- *Trichoribates (Latilamellobates) columbreti* (Mínguez y Subías, 1986) (*L.*)

Distribución: España (I. Columbretes).

- *Trichoribates (Latilamellobates) incisellus* (Kramer, 1897) (*Oribata*)

(=*Trichoribatella baloghi* Mahunka, 1983)

(=*Sphaerozetes (Trichoribates) oxypterus* Berlese, 1910)

(=*Sphaerozetes (Trichoribates) oxypterus meridionalis* Berlese, 1910)

(=*Trichoribates setosus apenninicus* Berlese, 1923)

Distribución: Holártica: Paleártica (frecuente) y Canadá.

- *Trichoribates (Latilamellobates) latilamellatus* Mihelčič, 1956 (*T.*)

(=*Trichoribates latilamellatus angustissima* Mihelčič, 1957)

Distribución: Mediterránea (frecuente).

- *Trichoribates (Latilamellobates) naltshicki* (Shaldybina, 1971) (*L.*)

Distribución: Mediterránea oriental, Irán y Suroeste de Rusia asiática.

- *Trichoribates (Latilamellobates) sergienkoae* (Paulitchenko, 1991) (*Vicinebates*)

Distribución: Mediterránea oriental.

#### ♣ *Zetomimus* Hull, 1916

Especie tipo: *Oribata furcata* Warburton y Pearce, 1905

***Zetomimus (Zetomimus)* Hull, 1916**

(=*Hamobates* Hammer, 1962)

Distribución: Holártica y Neotropical.

- *Zetomimus (Z.) furcatus* (Warburton y Pearce, 1905) (*Oribata*)

(=*Ceratozetes argentinensis* Hammer, 1958)

(?=*Oribata avenifera* Michael, 1884 “*sp. inq.*”)

(=*Ceratozetes magnificus* Berlese, 1910)

Distribución: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte) y Argentina.

**Zetomimus (Protozetomimus) Pérez-Íñigo, 1990**

Especie tipo: *Ceratozetes acutirostris* Mihelčič, 1957

Distribución: Paleártica y Neotropical.

• *Zetomimus (Protozetomimus) acutirostris* (Mihelčič, 1957) (*Ceratozetes*)

(=*Ceratozetes bulanovae* Kulijev, 1962)

Distribución: Mediterránea.

♦ **Chamobatidae** Thor, 1937

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

♠ **Chamobates** Hull, 1916

Especie tipo: *Oribata cuspidata* Michael, 1884

**Chamobates (Chamobates)** Hull, 1916

Distribución: Holártica y Paleotropical.

• *Chamobates (C.) birulai* (Kulczynski, 1902) (*Notaspis*)

(=*Chamobates cuspidatus alpinus* Schweizer, 1956)

(=*Chamobates tricuspdatum* Willmann, 1953)

Distribución: Paleártica (Europa y Noroeste de Siberia).

• *Chamobates (C.) caucasicus* Shaldybina, 1969

Distribución: Mediterránea (Cáucaso y España).

• *Chamobates (C.) confusus* Subías, 2000

(?=*Chamobates angulatus* Mihelčič, 1957 “*sp. inq.*”)

(?=*Chamobates triangularis* Mihelčič, 1957 “*sp. inq.*”)

Distribución: Paleártica occidental (excepto Norte): frecuente, Este de Paleártica oriental y Alaska.

• *Chamobates (C.) cuspidatiformis* (Trägårdh, 1904) (*Notaspis*)

Distribución: Paleártica occidental.

• *Chamobates (C.) cuspidatus* (Michael, 1884) (*Oribata*)

(=*Oribata dominae* Hull, 1914)

(=*Oribata lucifer* Hull, 1914)

Distribución: Holártica (frecuente en Paleártica) e I. Seychelles.

• *Chamobates (C.) dentatus* Mihelčič, 1956

Distribución: Mediterránea.

• *Chamobates (C.) dentotutorii* Shaldybina, 1969

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).

• *Chamobates (C.) hauseri* Mahunka, 1980

Distribución: Marruecos.

• *Chamobates (C.) lapidarius* (Lucas, 1849) (*Oribata*) “*sp. inq.*”

Distribución: Argelia.

• *Chamobates (C.) pedemontanus* (Berlese, 1910) (*Sphaerozetes*) “*sp. inq.*”

Distribución: Italia.

• *Chamobates (C.) perezinigoii* Subías, 1977

Distribución: Suroeste de Europa.

• *Chamobates (C.) pusillus* (Berlese, 1895) (*Oribata*)

(=*Notaspis cuspidatus borealis* Trägårdh, 1902)

(=*Chamobates incisus* Hammen, 1952)

Distribución: Paleártica (frecuente).

• *Chamobates (C.) schuetzi* (Oudemans, 1902) (*Notaspis*)

Distribución: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Este de Rusia asiática y U.S.A.: Virginia y Alaska).

• *Chamobates (C.) subglobulus* (Oudemans, 1900) (*Notaspis*)

(?=*Oribata facula* Koch, 1839 “*sp. inq.*”)

(=*Chamobates nasutus* Mihelčič, 1957)

(=*Euzetes nigerrimus* Berlese, 1908)

(=*Oribata omissa* Warburton y Pearce, 1905)

Distribución: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Este de Rusia asiática).

**Chamobates (Xiphobates)** Paulitschenko, 1993

Especie tipo: *Notaspis voigtsi* Oudemans, 1902

Distribución: Paleártica.

• *Chamobates (Xiphobates) dactyloscopicus* Bernini y Mahunka, 1982 (C.)

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Chamobates (Xiphobates) depauperatus* (Berlese, 1886) (*Oribata*)

Distribución: Mediterránea.

• *Chamobates (Xiphobates) interpositus* Pschorn-Walcher, 1953

(=*Chamobates kieviensis* Shaldybina, 1980)

(=*Chamobates longipilis* Willmann, 1953)

Distribución: Mediterránea.

• *Chamobates (Xiphobates) latissimus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2008

Distribución: Albania.

• *Chamobates (Xiphobates) rastratus* (Hull, 1914) (*Oribata*)

(=*Chamobates spinosus* Sellnick, 1928) (C.)

Distribución: Paleártica (Europa: frecuente, y Siberia centrooccidental).

• *Chamobates (Xiphobates) sergienkoae* Shaldybina, 1980 (C.)

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Chamobates (Xiphobates) voigtsi* (Oudemans, 1902) (*Notaspis*)

Distribución: Paleártica (Europa: frecuente, y Siberia centrooccidental).

♠ **Globozetes** Sellnick, 1928

Especie tipo: *Globozetes longipilus* Sellnick, 1928

Distribución: Paleártica.

• *Globozetes longipilus* Sellnick, 1928

(?=*Euzetes paolii* Berlese, 1910 “*sp. inq.*”)

Distribución: Europa centromeridional.

• *Globozetes microtus* Shaldybina, 1969

Distribución: Cáucaso.

• *Globozetes petrinjensis* (Willmann, 1940) (*Chamobates*)

Distribución: Europa meridional.

♠ **Hypozetes** Balogh, 1959

Especie tipo: *Hypozetes imitator* Balogh, 1959

Distribución: Pantropical (excepto

Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).

- *Hypozetes bulgaricus* Jeleva, 1962  
Distribución: Europa meridional e India (Orissa).

*Hypozetes translamellatus* Wallwork, 1965

- *Hypozetes translamellatus saudicus* Bayoumi y Al-Khalifa, 1984

Distribución: Arabia Saudita.

♣ ***Iugoribates*** Sellnick, 1944

Especie tipo: *Iugoribates gracilis* Sellnick, 1944

Distribución: Holártica.

- *Iugoribates cornutus* Mínguez, 1981 (= *Chamobates incisus* Mihelčič, 1957, “*nom. praeoc.*” por Hammen, 1952) (= *Chamobates mihelcici* Paulitchenko, 1992)

Distribución: Mediterránea.

♣ ***Ocesobates*** Aoki, 1965

(= *Chamozetes* Sellnick, 1974)

(= *Danobates* Gjelstrup, 1978)

Especie tipo: *Ocesobates kumadai* Aoki, 1965

Distribución: Paleártica.

- *Ocesobates boedvarrsoni* (Sellnick, 1974) (*Chamozetes*)

(= *Danobates insignitus* Gjelstrup, 1978)

Distribución: Europa.

- *Ocesobates bregetovae* Shaldybina, 1974

Distribución: Paleártica meridional (España y Este de Rusia asiática).

♦ **Humerobatidae** Grandjean, 1970

Distribución: Cosmopolita.

♣ ***Anellozetes*** Hammer, 1962

(= *Kilimabates* Mahunka, 1984)

Especie tipo: *Anellozetes muscicola* Hammer, 1962

Distribución: Pantropical (excepto Oriental) y subtropical.

- *Anellozetes translamellatus* (Shaldybina, 1971) (*Humerobates*)

Distribución: Asia centrooccidental y Cáucaso.

♣ ***Diapterobates*** Grandjean, 1936

Especie tipo: (*Sphaerozetes (Trichoribates) numerosus* Sellnick, 1924) = *Notaspis humeralis* Hermann, 1804

Distribución: Holártica.

- *Diapterobates arnoldii* Krivolutsky, 1966

Distribución: Paleártica meridional (Cáucaso y Rusia asiática).

- *Diapterobates dubinini* Shaldybina, 1971

Distribución: Este de Paleártica occidental.

- *Diapterobates humeralis* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)

(= *Sphaerozetes (Trichoribates) numerosus* Sellnick, 1924)

(= *Oribata picipes* Koch, 1839)

Distribución: Holártica (frecuente en Paleártica).

- *Diapterobates notatus* (Thorell, 1871) (*Oribata*) (= *Claviceps bimaculatus* L. Koch, 1879) (= *Sphaerozetes strandi* Berlese, 1910)

Distribución: Boreoalpina (frecuente).

- *Diapterobates oblongus* (L. Koch, 1879) (*Oppia*)

Distribución: Paleártica: Europa (excepto Oeste) y Paleártica oriental.

- *Diapterobates reticulatus* (L. Koch, 1879) (*Oribata*)

(= *Sphaerozetes (Trichoribates) principalis* Berlese, 1914)

Distribución: Holártica (Europa meridional, “Siberia”, Mongolia y Canadá).

- *Diapterobates rostralis* Shaldybina, 1971

Distribución: Paleártica (Mediterránea oriental y Este de Paleártica oriental).

- *Diapterobates sitnikovae* Shaldybina, 1970

Distribución: Paleártica oriental y “Alaska”.

♣ ***Humerobates*** Sellnick, 1928

(= *Antarctozetes* Balogh, 1961)

(= *Baloghobates* Hammer, 1967)

(= *Banksinus* Jacot, 1938)

(= *Jeannelia* Dalenius, 1958, “*nom. praeoc.*” por Raffray, 1913)

(= *Trihumerozetes* Sellnick, 1959)

Especie tipo: (*Notaspis humeralis* Hermann “*sensu*” Sellnick, 1928) = *Humerobates*

*rostromellatus* Grandjean, 1936

Distribución: Cosmopolita.

- *Humerobates pomboi* Pérez-Íñigo, 1992

Distribución: I. Azores.

*Humerobates rostromellatus* Grandjean, 1936

• *Humerobates rostromellatus rostromellatus* Grandjean, 1936

(? = *Oribata arborea* Banks, 1895 “*sp. inq.*”)

(= *Sphaerobates dentatus* Mihelčič, 1957)

(? = *Murcia rubra* Koch, 1841 “*sp. inq.*”)

Distribución: Semicosmopolita (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte,

Neártica,

Etiópica, Islas de Pacífico y Méjico).

- *Humerobates rostromellatus giganteus* Willmann, 1939 (*H. fungorum* g.)

Distribución: Macaronésica (Madeira).

- *Humerobates rostromellatus guadarramicus* Pérez-Íñigo, 1972

(? = *Chamobates magnus* Mihelčič, 1957 “*sp. inq.*”)

Distribución: Mediterránea occidental.

♣ ***Svalbardia*** Thor, 1930

Especie tipo: *Svalbardia paludicola* Thor, 1930

Distribución: Boreoalpina.

- *Svalbardia paludicola* Thor, 1930

Distribución: Boreoalpina (Norte de Europa, Sur de Siberia y Neártica septentrional: frecuente) y Cáucaso.



**Punctoribatidae** Thor, 1937

Distribución: Cosmopolita.

♣ **Ellipsozetes** Bernini, 1980Especie tipo: *Ellipsozetes sphaerulus* Bernini, 1980

Distribución: Paleártica.

• *Ellipsozetes sphaerulus* Bernini, 1980

Distribución: Italia.

♣ **Feiderzetes** Subías, 1977(=*Allozetes* Feider, Vasiliu y Călugăr, 1971, “*nom. praeoc.*” por Berlese, 1913)Especie tipo: *Punctoribates (Minunthozetes) latus* Schweizer, 1956

Distribución: Paleártica.

• *Feiderzetes latus* (Schweizer, 1956) (*Punctoribates (Minunthozetes)*)

Distribución: Europa meridional.

♣ **Minunthozetes** Hull, 1916Especie tipo: (*Oribata fusigera* Michael, 1884) = *Zetes semirufus* Koch, 1841***Minunthozetes (Minunthozetes)*** Hull, 1916(=*Jurabates* Jacot, 1929)

Distribución: Holártica.

• *Minunthozetes (M.) pseudofusiger* (Schweizer, 1922) (*Oribata*)

Distribución: Paleártica (frecuente).

• *Minunthozetes (M.) quadriareatus* Mínguez, Subías y Ruiz, 1986(=?*Punctoribates atomus* Berlese, 1908 “*sp. inq.*”)

Distribución: Mediterránea occidental.

• *Minunthozetes (M.) semirufus* (Koch, 1841) (*Zetes*)(=*Punctoribates bicornis* Berlese, 1908)(=*Oribata fusigera* Michael, 1884)(=*Minunthozetes major* Mihelčič, 1957)

Distribución: Holártica: Paleártica

(Paleártica occidental: frecuente, y Asia centrooccidental) y Canadá.

• *Minunthozetes (M.) tarmani* Feider, Vasiliu y Călugăr, 1971

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea y Este de Rusia asiática).

***Minunthozetes (Inigozetes)*** Subías, 2000Especie tipo: *Minunthozetes reticulatus* Pérez-Iñigo, 1969

Distribución: Paleártica.

• *Minunthozetes (Inigozetes) reticulatus* Pérez-Iñigo, 1969 (*M.*)

Distribución: Oeste de Europa.

♣ **Mycobates** Hull, 1916Especie tipo: *Oribata parmeliae* Michael, 1884***Mycobates (Mycobates)*** Hull, 1916

Distribución: Holártica y Neotropical.

• *Mycobates (M.) carli* (Schweizer, 1922) (*Oribata*)

Distribución: Europa meridional.

• *Mycobates (M.) integer* Mihelčič, 1957

Distribución: Mediterránea.

• *Mycobates (M.) parmeliae* (Michael, 1884) (*Oribata*)(=*Sphaerozetes (Trichoribates) lenicomus* Berlese, 1910)(=*Mycobates nadiji* Paulitschenko, 1991)

Distribución: Holártica (Europa: frecuente, Paleártica oriental y Canadá).

• *Mycobates (M.) tridentatus* Weigmann, 1976

Distribución: I. Azores.

***Mycobates (Calyptozetes)*** Thor, 1930(=*Permycobates* Strenzke, 1954)Especie tipo: *Oribata sarekensis* Trägårdh, 1910

Distribución: Holártica y Oriental.

• *Mycobates (Calyptozetes) alpinus* (Willmann, 1951) (*C.*)

Distribución: Europa meridional.

• *Mycobates (Calyptozetes) bicornis* (Strenzke, 1954) (*Permycobates*)

Distribución: Paleártica centromeridional.

• *Mycobates (Calyptozetes) cribelliger* (Berlese, 1904) (*Oribata*)

Distribución: Europa suroccidental.

• *Mycobates (Calyptozetes) patrius* Shaldybina, 1970 (*M.*)

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional).

• *Mycobates (Calyptozetes) sarekensis* (Trägårdh, 1910) (*Oribata*)(=*Mycobates consimilis* Hammer, 1952)

Distribución: Boreoalpina (Euroatlántica: frecuente, Asia central rusa y Neártica septentrional: frecuente).

• *Mycobates (Calyptozetes) tridactylus* Willmann, 1929 (*M.*)

Distribución: Paleártica y Oriental (India: Tripura).

♣ **Punctoribates** Berlese, 1908Especie tipo: *Oribata punctum* Koch, 1839***Punctoribates (Punctoribates)*** Berlese, 1908

Distribución: Semicosmopolita (Holártica y Australianooriental).

• *Punctoribates (P.) angulatus* Bayartogtokh, Grobler y Cobanoglu, 2000

Distribución: Turquía.

• *Punctoribates (P.) aveiroensis* Weigmann, 2009

Distribución: Portugal.

• *Punctoribates (P.) ghilarovi* Shaldybina, 1969

Distribución: Este de Paleártica occidental y Mongolia.

• *Punctoribates (P.) grishinae* Shaldybina, 1977

Distribución: Paleártica (Cáucaso y Siberia central).

• *Punctoribates (P.) liber* Paulitschenko, 1991

Distribución: Mediterránea.

• *Punctoribates (P.) meridianus* Shaldybina, 1973

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Punctoribates (P.) minimus* Shaldybina, 1969

Distribución: Paleártica meridional (excepto Este).

- *Punctoribates (P.) mundus* Shaldybina, 1973  
Distribución: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental: excepto Norte).
- *Punctoribates (P.) palustris* (Banks, 1895) (*Oribata*)  
(=*Galumna armipes* (Banks, 1906)  
Distribución: Noreste de U.S.A e Italia.
- *Punctoribates (P.) punctum* (Koch, 1839) (*Oribata*)  
(=*Punctoribates latilobatus* Kunst, 1958)  
Distribución: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, U.S.A.: Virginia, Oriental y Nueva Zelanda).
- *Punctoribates (P.) selgae* (Pérez-Íñigo, 1976) (*Minunthozetes*)  
Distribución: I. Canarias.
- *Punctoribates (P.) sellnicki* Willmann, 1928  
Distribución: Europea (frecuente) y Mongolia.
- *Punctoribates (P.) sphaericus* Shaldybina, 1987  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia central).
- Punctoribates (Minguezetes)*** Subías, Kahwash y Ruiz, 1990  
Especie tipo: *Minguezetes conjunctus* Subías, Kahwash y Ruiz, 1990  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Punctoribates (Minguezetes) conjunctus* (Subías, Kahwash y Ruiz, 1990) (*M.*)  
Distribución: Suroeste de Europa.
- *Punctoribates (Minguezetes) hexagonus* Berlese, 1908 (*P.*)  
(=*Punctoribates hygrophilus* Mihelčič, 1957)  
Distribución: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Paleártica oriental meridional y Neártica septentrional) y Vietnam.
- *Punctoribates (Minguezetes) insignis* Berlese, 1910 (*P.*)  
(=*Punctoribates manzanoensis* Hammer, 1958)  
Distribución: Neotropical y subtropical (excepto Etiópica).
- Punctoribates (Semipunctoribates)*** Mahunka, 1987  
Especie tipo: *Semipunctoribates hungaricus* Mahunka, 1987  
Distribución: Paleártica.
- *Punctoribates (Semipunctoribates) zachvatkini* Shaldybina, 1969 (*P.*)  
Distribución: Mediterránea y Mongolia.
- ♣ ***Zachvatkinibates*** Shaldybina, 1973  
Especie tipo: *Zachvatkinibates nemoralis* Shaldybina, 1973  
***Zachvatkinibates (Zachvatkinibates)*** Shaldybina, 1973  
(=*Eupunctoribates* Hammer, 1977)  
Distribución: Holártica.
- *Zachvatkinibates (Z.) maritimus* Shaldybina, 1973  
Distribución: Boreoalpina (Este de Paleártica oriental y Neártica septentrional) y Cáucaso.
- *Zachvatkinibates (Z.) quadrivertex* (Halbert, 1920) (*Oribata*)  
Distribución: Holártica septentrional: Paleártica occidental (Euroatlántica), Paleártica oriental (I. Kuriles) y Neártica septentrional.  
***Zachvatkinibates (Alpizetes)*** Mahunka, 2001  
(=*Schweizerzetes* Mahunka, 2001)  
Especie tipo: *Alpizetes behanae* Mahunka, 2001  
Distribución: Paleártica.
- *Zachvatkinibates (Alpizetes) perlongus* (Balogh, 1959) (*Punctoribates*)  
Distribución: Europa meridional.
- ▲ **Zetomotrichoidea** Grandjean, 1934
- ♦ **Zetomotrichidae** Grandjean, 1934  
Distribución: Pantropical y subtropical.
- ♣ ***Ghilarovus*** Krivolutsky, 1966  
Especie tipo: *Ghilarovus humeridens* Krivolutsky, 1966  
Distribución: Subtropical (Holártica, Oriental y Neotropical).  
*Ghilarovus hispanicus* Subías y Pérez-Íñigo, 1977
- *Ghilarovus hispanicus hispanicus* Subías y Pérez-Íñigo, 1977  
Distribución: España.
- *Ghilarovus hispanicus gadarramicus* Subías, 1977  
Distribución: Mediterránea occidental.
- *Ghilarovus humeridens* Krivolutsky, 1966  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional).
- ♣ ***Mikizetes*** Hammer, 1958  
***Mikizetes (Oglasacarus)*** Bernini, 1979  
Especie tipo: *Oglasacarus oglasae* Bernini, 1979  
Distribución: Paleártica subtropical.
- *Mikizetes (Oglasacarus) oglasae* (Bernini, 1979) (*M.*)  
Distribución: Suroeste de Europa.
- ♣ ***Zetomotrichus*** Grandjean, 1934  
Especie tipo: *Zetomotrichus lacrimans* Grandjean, 1934  
Distribución: Paleotropical y subtropical (Paleártica meridional).
- *Zetomotrichus lacrimans* Grandjean, 1934  
Distribución: Mediterránea, Sudáfrica y Filipinas.
- ▲ **Oripodoidea** Jacot, 1925
- ♦ **Mochlozetidae** Grandjean, 1960  
Distribución: Pantropical y subtropical.
- ♣ ***Podoribates*** Berlese, 1908  
(=*Cardioribates* Jacot, 1934)  
(=*Falsolobozetes* Tseng, 1984)

(=*Sphaerobates* Sellnick, 1928)

Especie tipo: *Oribata longipes* Berlese, 1887

Distribución: Pantropical y subtropical.

• *Podoribates longipes* (Berlese, 1887) (*Oribata*) (= *Sphaerozetes gratus* Sellnick, 1921)

Distribución: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Asia central rusa y Canadá).

♣ *Unguizetes* Sellnick, 1925

(=*Terrazetes* Jacot, 1929)

Especie tipo: *Oribata sphaerula* Berlese, 1905

Distribución: Pantropical y subtropical.

• *Unguizetes reticulatus* Wallwork, 1965

Distribución: Etiópica (Tchad y Congo) y Arabia Saudita.

♦ **Oribatulidae** Thor, 1929

Distribución: Cosmopolita.

♣ *Lucoppia* Berlese, 1908

(=*Romanobates* Feider, Vasiliu y Călugăr, 1970)

Especie tipo: (*Zetes lucorum* Koch "sensu" Berlese, 1892) = *Notaspis burrowsi* Michael, 1890

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• *Lucoppia burrowsi* (Michael, 1890) (*Notaspis*) (= *Zygoribatula apletosa* Higgins y Woolley, 1975)

(=*Romanobates maiensis* Choi, 1995)

(=*Lucoppia orientalis* Djaparidze, 1985)

(=*Notaspis pectinata* Hall, 1912, "nom. praeoc." por Michael, 1885)

(=*Eremaeus sanremensis* Oudemans, 1900)

(=*Zygoribatula spinosissima* Mihelčič, 1956)

Distribución: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Corea y Neártica), China suroriental y Hawai.

• *Lucoppia feideri* Subías, 2009

(=*Romanobates reticulatus* Feider, Vasiliu y Călugăr, 1970, "nom. praeoc." por Willmann, 1933)

Distribución: Mediterránea oriental y Chile.

• *Lucoppia nicora* Djaparidze, 1986

Distribución: Cáucaso.

♣ *Oribatula* Berlese, 1896

Especie tipo: *Notaspis tibialis* Nicolet, 1855

***Oribatula* (*Oribatula*)** Berlese, 1896

(=*Ceroribatula* Lee y Birchby, 1989)

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• *Oribatula* (*O.*) *angustolamellata* Iordansky, 1991

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).

• *Oribatula* (*O.*) *exsudans* Travé, 1961

Distribución: Suroeste de Europa.

• *Oribatula* (*O.*) *incerta* Pérez-Íñigo y Peña, 1996

Distribución: I. Canarias.

• *Oribatula* (*O.*) *intermedia* Mihelčič, 1969

Distribución: Suroeste de Europa.

*Oribatula* (*O.*) *interrupta* (Willmann, 1939) (*Zygoribatula*)

• *Oribatula* (*O.*) *interrupta interrupta* (Willmann, 1939)

(=*Zygoribatula bulanovae* Kulijev, 1961)

(=*Oribatula sitnikovae* Iordansky, 1991)

Distribución: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional).

• *Oribatula* (*O.*) *interrupta major* Mihelčič, 1963

(=*Zygoribatula saxicola* Kunst, 1959, "nom. praeoc." por Halbert, 1920)

Distribución: Paleártica meridional

(Mediterránea y Asia centrooccidental).

• *Oribatula* (*O.*) *macrostega* Iturrondobeitia, 1985

(=*Oribatula longilamellata* Subías, 1977, "nom. praeoc." por Schweizer, 1956)

(?= *Eporibatula nodifer* Mihelčič, 1956 "sp. inq.")

Distribución: España.

• *Oribatula* (*O.*) *pannonica* Willmann, 1949

(=*Oribatula tenella* Mihelčič, 1956)

(=*Oribatula tenella longipilus* Mihelčič, 1966)

Distribución: Paleártica.

• *Oribatula* (*O.*) *parisi* Travé, 1961

(=*Oribatula saljanica* Kulijev, 1962)

Distribución: Mediterránea.

• *Oribatula* (*O.*) *praeoccupata* Subías, 2004

(=*Oribatula dentata* Grobler y Skubala, 2000, "nom. praeoc." por Mihelčič, 1969)

Distribución: España.

• *Oribatula* (*O.*) *robusta* Iordansky, 1991

Distribución: Mediterránea oriental.

*Oribatula* (*O.*) *tibialis* (Nicolet, 1855) (*Notaspis*)

• *Oribatula* (*O.*) *tibialis tibialis* (Nicolet, 1855)

(=*Oribatula affinis* Hull, 1914)

(=*Oribatula alpina* Schweizer, 1956)

(=*Oribatula amblyptera* Berlese, 1916)

(=*Oribatula coggii* Jacot, 1929)

(=*Oribata crassipes* L. Koch, 1879)

(=*Zygoribatula incurva* Mihelčič, 1969)

(=*Liacarus minutus* Ewing, 1909)

(=*Oribatula pallida* Banks, 1906)

(=*Oribatula tibialis azerbeidjanica* Kulijev, 1962)

(=*Oribatula tibialis sardoa* Berlese, 1916)

(=*Oribatula venusta* Berlese, 1908)

Distribución: Holártica (frecuente) e India (Sikkim).

• *Oribatula* (*O.*) *tibialis allifera* Subías, 2000

(?= *Oribatula beccus* Djaparidze, 1990 "sp. inq.")

(?= *Oribatula caliptera* Berlese, 1902 "sp. inq.")

(=*Oribatula tibialis alata* Iordansky, 1991, "nom. praeoc." por Mihelčič, 1956)

(?= *Zygoribatula vera* Bulanova-Zachvatkina, 1967 "sp. inq.")

Distribución: Holártica (Mediterránea, Irán y Neártica septentrional).

• *Oribatula* (*O.*) *torrijosi* Subías, Ruiz y Kahwash, 1990

Distribución: Mediterránea occidental.

*Oribatula (Zygoribatula)* Berlese, 1916

(=*Fovoribatula* Lee y Birchby, 1991)

(=*Neoribatula* Ewing, 1917)

(=*Zetobelba* Hull, 1916)

Especie tipo: *Oribatula connexa* Berlese, 1904

Distribución: Cosmopolita.

• *Oribatula (Zygoribatula) arcuatissima* Berlese, 1916

(?=*Notaspis aequalis* Michael, 1890 “*sp. inq.*”)

(=*Zygoribatula gozmanyi* Mahunka, 1980)

Distribución: Holártica (Mediterránea occidental y “U.S.A.: Illinois”).

• *Oribatula (Zygoribatula) caspica* Shtanchaeva, Grikurova y Subías, 2011

Distribución: Cáucaso.

• *Oribatula (Zygoribatula) cognata* (Oudemans, 1902) (*Eremaeus*)

(=*Zygoribatula diversa* Mihelčič, 1956)

(=*Oribatula (Zygoribatula) socia* Berlese, 1916)

Distribución: Paleártica centromeridional.

*Oribatula (Zygoribatula) connexa* Berlese, 1904 (O.)

• *Oribatula (Zygoribatula) connexa connexa* Berlese, 1904

(?=*Notaspis bisignata* Coggi, 1898 “*sp. inq.*”)

(=*Zygoribatula concinna* Iordansky, 1990)

(=*Oribatula (Zygoribatula) excavata* Berlese, 1916)

(=*Zygoribatula magna* Ramsay, 1966)

(=*Zygoribatula striatissima* Hammer, 1962)

(=*Zygoribatula terricola* Hammen, 1952)

(=*Zygoribatula trichosa* Mihelčič, 1956)

Distribución: Subtropical (Paleártica meridional y austral: América austral, Australia y Nueva Zelanda).

• *Oribatula (Zygoribatula) connexa ucrainica* (Iordansky, 1990) (Z. *terricola* u.)

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Oribatula (Zygoribatula) dactylaris* (Subías, Ruiz y Kahwash, 1990) (Z.)

Distribución: Mediterránea occidental.

• *Oribatula (Zygoribatula) exarata* Berlese, 1916

(=*Oribatula rugifrons* Sellnick, 1943)

(=*Oribatula rugifrons striata* Mihelčič, 1955)

(=*Oribatula rugosa* Kulijev, 1979)

Distribución: Paleártica meridional (frecuente).

• *Oribatula (Zygoribatula) excavata* Berlese, 1916

Distribución: Mediterránea.

*Oribatula (Zygoribatula) exilis* (Nicolet, 1855) (*Notaspis*)

• *Oribatula (Zygoribatula) exilis exilis* (Nicolet, 1855)

(=*Dameosoma jugorum* Hull, 1914)

(=*Oribatula (Zygoribatula) lineola* Berlese, 1916)

Distribución: Holártica (frecuente) e I. Santa Helena.

• *Oribatula (Zygoribatula) exilis clavatotrichobothria* (Kulijev, 1962) (Z. c.)

Distribución: Cáucaso.

• *Oribatula (Zygoribatula) frisiae* (Oudemans, 1900) (*Eremaeus*)

(=*Zygoribatula debilitranslamellata* Kulijev, 1962)

(=*Zygoribatula frisiae insularis* Travé, 1961)

(=*Zygoribatula kelbadjarica* Kulijev, 1962)

(=*Notaspis pyrostigmata* Ewing, 1909)

(=*Zygoribatula tenuelamellata* Mihelčič, 1956)

(=*Oribatula variabilis* Berlese, 1908)

Distribución: Holártica (frecuente en Paleártica meridional).

• *Oribatula (Zygoribatula) glabra* (Michael, 1890) (*Notaspis*)

(=*Oribatula (Zygoribatula) angulata* Berlese, 1916)

(=*Eremaeus brauni* Sellnick, 1908)

(=*Zygoribatula extremodontata* Kulijev, 1962)

(=*Zygoribatula hortobagyensis* Mahunka, 1983)

(=*Zygoribatula laubieri* Travé, 1961)

(=*Zygoribatula laubieri canariensis* Pérez-Íñigo y Peña, 1997)

(=*Zygoribatula laubieri meridionalis* Travé, 1961)

(=*Zygoribatula matritensis* Mihelčič, 1966)

(=*Eremaeus propinquus* Oudemans, 1902)

(=*Eremaeus varius* Oudemans y Voigts, 1904)

Distribución: Paleártica (menos frecuente en el Norte).

• *Oribatula (Zygoribatula) grandjeani* (Nawar y El-Borolossy, 1990) (Z.)

Distribución: Egipto.

• *Oribatula (Zygoribatula) granulata* (Kunst, 1958) (Z.)

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Oribatula (Zygoribatula) guadarramica* (E. Pérez-Íñigo, 1978) (Z.)

Distribución: España.

• *Oribatula (Zygoribatula) hispanica* Subías y Arillo, 1998

Distribución: Mediterránea (España y Cáucaso).

• *Oribatula (Zygoribatula) lanceolata* (Grobler, Bayram y Cobanoglu, 2004) (Z.)

(=*Zygoribatula longa* Mahunka y Mahunka-Papp, 2010)

(?=*Zygoribatula longisensilla* Djaparidze, 1985 “*sp. inq.*”)

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Oribatula (Zygoribatula) lenticulata* (Mínguez y Subías, 1986) (Z.)

Distribución: Mediterránea.

• *Oribatula (Zygoribatula) mabar* (Mahunka, 2000) (Z.)

Distribución: Península Arábiga.

• *Oribatula (Zygoribatula) microporosa* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (Z.)

Distribución: Paleártica (Este de Paleártica occidental y Este de Rusia asiática).

• *Oribatula (Zygoribatula) niliaca* (Bayoumi, 1980) (Z.)

Distribución: Egipto.

• *Oribatula (Zygoribatula) ruchljadevi*

- (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (Z.)  
Distribución: Mediterránea oriental.
- *Oribatula (Zygoribatula) sayedi* (Elbadry y Nasr, 1974) (Z.)  
Distribución: Egipto.
  - *Oribatula (Zygoribatula) skrjabini* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (Z.)  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental: frecuente).
  - *Oribatula (Zygoribatula) smirnovi* (Bulanova-Zachvatkina, 1978) (Z.)  
Distribución: Mediterránea oriental.
  - *Oribatula (Zygoribatula) spherisensilla* (Djaparidze, 1985) (Z.)  
Distribución: Cáucaso.
  - *Oribatula (Zygoribatula) tameyei* (Elbadry y Nasr, 1974) (Z.)  
Distribución: Egipto.
  - *Oribatula (Zygoribatula) thalassophila* Grandjean, 1935  
(=*Oribatula travei* Bernini, 1969)  
Distribución: Europa centromeridional.
  - *Oribatula (Zygoribatula) tritici* (Elbadry y Nasr, 1974) (Z.)  
Distribución: Egipto.
  - *Oribatula (Zygoribatula) undulata* Berlese, 1916  
(=*Zygoribatula dubita* Coetzer, 1968)  
(=*Zygoribatula heteroporosa* Wallwork, 1972)  
(=*Zygoribatula longiporosa* Hammer, 1953)  
(=*Zygoribatula tadrosi* Popp, 1960)  
Distribución: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical.
  - *Oribatula (Zygoribatula) vulgaris* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (Z.)  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia central rusa).
- ♣ *Phauloppia* Berlese, 1908  
(=*Calvoppia* Jacot, 1934)  
(=*Eporibatula* Sellnick, 1928)  
(=*Imparatoppia* Jacot, 1934)  
(?=*Oribata* Latreille, 1802 “*gen. inq.*”)  
(=*Paraliodes* Hall, 1911)  
(=*Trichoribatula* Balogh, 1961)  
Especie tipo: (*Oppia conformis* Berlese, 1895) =*Zetes lucorum* Koch, 1841  
Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Australiana y Neotropical).
- *Phauloppia incomperta* (Pérez-Íñigo y Peña, 1996) (*Zygoribatula*)  
Distribución: I. Canarias.
  - *Phauloppia knoepffleri* Travé, 1961  
Distribución: Francia (Córcega).
  - *Phauloppia lucorum* (Koch, 1841) (*Zetes*)  
(=*Lucoppia (Phauloppia) asperula* Berlese, 1916)  
(=*Oppia berleseii* Leonardi, 1896)  
(=*Oppia conformis* Berlese, 1895)  
(=*Eremaeus conjunctus* Oudemans, 1902)  
(?=*Acarus corticalis* De Geer, 1778 “*sp. inq.*”)  
(=*Phauloppia dzaparidzei* Mahunka, 1997)
- (?=*Acarus geniculatus* Linnaeus, 1758 “*sp. inq.*”)  
(=*Paraliodes incurvata* Hall, 1911)  
(=*Phauloppia longiporosa* Kulijev, 1968)  
(=*Eporibatula longiporosa* Pérez-Íñigo, 1976)  
(=*Phauloppia longiporosa* Mahunka, 1982, “*nom. praeoc.*” por Kulijev, 1968)  
(=*Phauloppia longiporosa* Djaparidze, 1985, “*nom. praeoc.*” por Kulijev, 1968)  
(=*Liacarus modestus* Banks, 1904)  
(=*Eremaeus modestus* Banks, 1910)  
(?=*Acarus musci* Schrank, 1781 “*sp. inq.*”)  
(=*Phauloppia ohat* Mahunka, 1997)  
(=*Phauloppia saakadzei* Djaparidze, 1985)  
(=*Eremaeus schneideri* Oudemans, 1896)  
Distribución: Holártica (frecuente en Paleártica occidental).
- *Phauloppia nemoralis* (Berlese, 1916) (*Lucoppia (P.)*)  
(=*Phauloppia coineaui* Travé, 1961)  
Distribución: Europea (frecuente).
  - *Phauloppia pilosa* (Koch, 1841) (*Zetes*)  
Distribución: Holártica (Europa centromeridional y U.S.A.: Virginia).
  - *Phauloppia rauschenensis* (Sellnick, 1908) (*Eremaeus*)  
=*Eporibatula gessneri* Willmann, 1932)  
(=*Oribatula lucida* Sellnick, 1921)  
(=*Phauloppia paspalevi* Csiszár, 1962)  
(=*Phauloppia saxicola* Travé, 1961)  
Distribución: Paleártica occidental y Asia central rusa.
  - *Phauloppia vallei* Bernini, 1973  
Distribución: Italia (Sicilia).
- ♣ *Phauloppiella* Subías, 1977  
(=*Ausoribula* Lee, 1992)  
Especie tipo: *Phauloppiella striata* Subías, 1977  
Distribución: Paleártica meridional, Etiópica y Australiana.
- *Phauloppiella striata* Subías, 1977  
Distribución: España.
- ♦ *Pseudoppiidae* Mahunka, 1975  
Distribución: Tropical (Etiópica) y subtropical (Paleártica meridional).
- ♣ *Pseudoppia* Pérez-Íñigo, 1966  
(=*Micropirnodus* Weigmann, 2009)  
(=*Symphauloppia* Balogh, 1972)  
Especie tipo: *Lucoppia mediocris* Mihelčič, 1957  
Distribución: Paleártica meridional y Etiópica.
- *Pseudoppia interrupta* (Jeleva, 1962) (*Phauloppia*)  
Distribución: Mediterránea y Etiópica (Congo).
  - *Pseudoppia longissima* (Weigmann, 2009) (*Micropirnodus*)  
Distribución: Portugal.
  - *Pseudoppia mediocris* (Mihelčič, 1957) (*Lucoppia*)

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).

◆ **Parapirnodidae** Aoki y Ohkubo, 1974

Distribución: Semicosmopolita (Pantropical: excepto Etiópica, y Holártica).

♣ **Gerloubia** Coetzer, 1968

(=**Monophauloppia** P. Balogh, 1988)

(=**Fuerteventuria** Pérez-Íñigo y Peña, 1996)

Especie tipo: *Eporibatula bicuspidata* Hammer, 1958

Distribución: ¿Holártica? meridional, Oriental y Neotropical.

• *Gerloubia hispanica* Subías, 1977

(=*Liebstadia ahumerata* Mahunka, 1987)

(=*Fuerteventuria mirabilis* Pérez-Íñigo y Peña, 1996)

Distribución: Mediterránea.

◆ **Hemileiidae** J. y P. Balogh, 1984

Distribución: Cosmopolita.

♣ **Domatorina** Grandjean, 1951

(=**Cryptozetes** Hammer, 1962)

Especie tipo: *Oribatula plantivaga* Berlese, 1895

Distribución: Cosmopolita.

*Domatorina plantivaga* (Berlese, 1895)

(*Oribatula*)

• *Domatorina plantivaga plantivaga* (Berlese, 1895)

Distribución: Cosmopolita (Neártica, Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Paleártica oriental, Etiópica: Yemen, Oriental y Neotropical: frecuente).

• *Domatorina plantivaga insularis* Travé, 1969

Distribución: Macaronésica (I. Salvajes).

• *Domatorina plantivaga saxicola* Grandjean, 1951

Distribución: Europa meridional.

♣ **Exoribatula** Jacot, 1936

**Exoribatula** (**Multoribates**) Hammer, 1961

Especie tipo: *Multoribates chavinensis* Hammer, 1961

Distribución: Tropical (Neotropical y Oriental) y subtropical (Paleártica meridional).

• *Exoribatula* (*Multoribates*) *chavinensis*

(Hammer, 1961) (*M.*)

Distribución: Perú y Cáucaso.

♣ **Hemileius** Berlese, 1916

Especie tipo: *Protoribates* (*Scheloribates*) *initialis* Berlese, 1908

**Hemileius** (**Hemileius**) Berlese, 1916

Distribución: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

• *Hemileius* (*H.*) *eperezinigoae* Subías, 2010

(=*Hemileius elongatus* E. Pérez-Íñigo, 1978, “*nom. praeoc.*” por Krivolutsky, 1969)

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea y Mongolia)

• *Hemileius* (*H.*) *hierrensis* Pérez-Íñigo, 1984

Distribución: Mediterránea.

• *Hemileius* (*H.*) *humeralis* Pérez-Íñigo jr., 1991  
(?=*Simkinia montana* Krivolutsky y Grishina, 1970 “*sp. inq.*”)

Distribución: Paleártica (Mediterránea y Paleártica oriental).

• *Hemileius* (*H.*) *initialis* (Berlese, 1908)

(*Protoribates* (*Scheloribates*))

(=*Scheloribates confundatus* Sellnick, 1928)

Distribución: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, ¿U.S.A. (Nuevo Méjico)?, Oriental: Bali, y Neotropical).

• *Hemileius* (*H.*) *robustus* Pérez-Íñigo, 1969

Distribución: Mediterránea occidental.

**Hemileius** (**Simkinia**) Krivolutsky, 1966

(=**Tenuileius** Lee, 1989)

(=**Turcibates** Ayyildiz y Luxton, 1989)

Especie tipo: *Simkinia turanica* Krivolutsky, 1966

Distribución: Paleártica meridional y Australiana.

• *Hemileius* (*Simkinia*) *ovalis* Kulijev, 1968 (*H.*)

(=*Hemileius lanceolatus* Bayartogtokh y Aoki, 1997)

(=*Turcibates parvus* Ayyildiz y Luxton, 1989)

(?=*Domatorina rossica* Bashkirova, 1958 “*sp. inq.*”)

(=*Urubambates xerophilus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2007)

Distribución: Paleártica meridional.

• *Hemileius* (*Simkinia*) *tianschanicus*

(Krivolutsky, 1971) (*S.*)

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).

• *Hemileius* (*Simkinia*) *turanicus* (Krivolutsky, 1966) (*S.*)

Distribución: Paleártica meridional.

**Hemileius** (**Tuberemaeus**) Sellnick, 1930

(=**Anisochthodes** Newell, 1957)

(=**Setulobates** Mahunka, 1984)

Especie tipo: *Tuberemaeus singularis* Sellnick, 1930

Distribución: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).

• *Hemileius* (*Tuberemaeus*) *scrobina* (Berlese, 1916) (*Oribatula* (*H.*))

Distribución: Italia.

**Hemileius** (**Urubambates**) Hammer, 1961

Especie tipo: *Urubambates punctatus* Hammer, 1961

Distribución: Paleártica meridional, Etiópica y Neotropical.

• *Hemileius* (*Urbambates*) *schachtachtinskoi* (Kulijev, 1961) (*Oribatula*)

Distribución: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).

♣ **Paraleius** Travé, 1960

Especie tipo: *Oribella leontonycha* Berlese, 1910

**Paraleius** (**Paraleius**) Travé, 1960

- Distribución: Paleártica.
- *Paraleius (P.) leontonychus* (Berlese, 1910) (*Oribella*)  
Distribución: Paleártica.
- Paraleius (Metaleius)** Travé, 1960  
Especie tipo: *Metaleius strenzkei* Travé, 1960  
Distribución: Paleártica.
- *Paraleius (Metaleius) strenzkei* (Travé, 1960) (*M.*)  
(?= *Oribatula (Hemileius) sternalis* Berlese, 1916 “*sp. inq.*”)  
Distribución: Mediterránea.
- ♣ **Siculobata** Grandjean, 1953  
(= *Floribates* Norton y Kethley, 1989)  
Especie tipo: *Oppia tibialis sicula* Berlese, 1892  
Distribución: Pantropical y subtropical.
- *Siculobata sicula* (Berlese, 1892) (*Oppia tibialis s.*)  
Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea, Polonia e Irán), Islas del Pacífico y Sudáfrica.
- ♦ **Liebstadidae** J. y P. Balogh, 1984  
Distribución: Cosmopolita.
- ♣ **Areozetes** Hammer, 1961  
Especie tipo: *Areozetes altimontanus* Hammer, 1961  
Distribución: Tropical (Oriental y Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).
- *Areozetes altimontanus* Hammer, 1961  
Distribución: Perú e I. Canarias.
- ♣ **Haloribatula** Schuster, 1957  
Especie tipo: *Haloribatula tenareae* Schuster, 1957  
Distribución: Paleártica y Oriental.
- *Haloribatula tenareae* Schuster, 1957  
Distribución: Francia e India (Tripura).
- ♣ **Liebstadia** Oudemans, 1906  
Especie tipo: *Notaspis similis* Michael, 1888  
**Liebstadia (Liebstadia)** Oudemans, 1906  
(= *Irinobates* Krivolutsky y Christov, 1970)  
(= *Rajskibates* J. y P. Balogh, 1984)  
Especie tipo: *Notaspis similis* Michael, 1888  
Distribución: Semicosmopolita (Holártica, Oriental, “Etiópica” y Australiana).
- *Liebstadia (L.) gallardoi* (Morell, 1987) (*Protoribates*)  
Distribución: Mediterránea occidental.
  - *Liebstadia (L.) humerata* Sellnick, 1928  
Distribución: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Asia centooccidental y Neártica) y Vietnam.
  - *Liebstadia (L.) longior* (Berlese, 1908) (*Protoribates*)  
(= *Protoribates badensis* Sellnick, 1928)  
Distribución: Holártica (Paleártica y
- Canadá).
- Liebstadia (L.) pannonica** (Willmann, 1951) (*Protoribates*)
- *Liebstadia (L.) pannonica pannonica* (Willmann, 1951)  
(= *Protoribates austriacus* Willmann, 1953)  
(= *Protoribates divergens* Mihelčič, 1955)  
(= *Protoribates novus* Willmann, 1953)  
(= *Protoribates variabilis* Rajski, 1958)  
(= *Liebstadia willmanni* Miko y Weigmann, 1966)  
Distribución: Holártica: Paleártica (frecuente) y U.S.A. (Carolina del Norte).
  - *Liebstadia (L.) pannonica microptera* (Mihelčič, 1957) (*Protoribates*)  
(?= *Oribatula alata* Mihelčič, 1956 “*sp. inq.*”)  
Distribución: Mediterránea.
  - *Liebstadia (L.) parabadensis* (Kulijev, 1968) (*Protoribates*)  
Distribución: Cáucaso.
  - *Liebstadia (L.) saifulmalukensis* (Hammer, 1977) (*Gerlobia*)  
(= *Liebstadia khugniensis* Bayartogtokh, 2001)  
Distribución: Paleártica meridional (Ibérica y Paleártica oriental meridional).
  - *Liebstadia (L.) similis* (Michael, 1888) (*Notaspis*)  
(= *Oribatula anomala* Hull, 1916)  
(= *Protoribates serratomarginatus* Mahunka, 1983)  
(= *Protoribates silesius* Sellnick, 1925)  
Distribución: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional): frecuente, India (Sikkim) y Nueva Zelanda.
  - *Liebstadia (L.) tenuis* (Ayyildiz y Luxton, 1989) (*Rajskibates*)  
Distribución: Turquía.
- Liebstadia (Lagenobates)** Weigmann y Miko, 2002  
(= *Pseudoprotoribates* Weigmann y Monson, 2004)  
Especie tipo: *Oribata lagenula* Berlese, 1904  
Distribución: ¿Holártica?.
- *Liebstadia (Lagenobates) lagenula* (Berlese, 1904) (*Oribata*)  
(?= *Protoribates pupula* Berlese, 1910 “*sp. inq.*”)  
Distribución: Paleártica (menos frecuente en el Norte) ¿y Canadá?.
- ♣ **Poroschelorbates** Arillo, Gil-Martín y Subías, 1994  
Especie tipo: *Poroschelorbates canariensis* Arillo, Gil-Martín y Subías, 1994  
Distribución: Paleártica.
- *Poroschelorbates canariensis* Arillo, Gil-Martín y Subías, 1994  
Distribución: I. Canarias.
- ♦ **Schelorbatiidae** Jacot, 1935  
Distribución: Cosmopolita.
- ♣ **Perschelorbates** Hammer, 1973  
(= *Ischelorbates* Corpuz-Raros, 1980)

- (=*Schelorbitatella* Mahunka, 1984)  
Especie tipo: *Perscheloribates clavatus* Hammer, 1973  
Distribución: Pantropical y subtropical.
- *Perscheloribates algarvensis* (Weigmann, 2009) (*Schelorbitates* (*Euscheloribates*))  
Distribución: Portugal.
  - *Perscheloribates monodactylus* (Morell, 1987) (*Schelorbitates*)  
(?=*Schelorbitates elongatus* Mihelčič, 1963 “*sp. inq.*”)  
Distribución: España.
- ♣ *Schelorbitates* Berlese, 1908  
(=*Megaschelorbitates* Lee y Pajak, 1990)  
(=*Paraschelobates* Jacot, 1934)  
(=*Protoschelobates* Jacot, 1934)  
(=*Semischeloribates* Hammer, 1973)  
(=*Storkania* Jacot, 1929)  
Especie tipo: (*Zetes latipes* Koch, 1844)  
=*Zetes pallidulus* Koch, 1841  
Distribución: Cosmopolita.
- *Schelorbitates aethiopicus* Mahunka, 1982  
Distribución: Etiópica (Etiopía y Congo) e I. Canarias.
  - *Schelorbitates agilis* (Nicolet, 1855) (*Oribata*) “*sp. inq.*”  
Distribución: Mediterránea (Francia y Egipto).
  - *Schelorbitates alexandrinae* Vasiliu e Ivan, 1995  
Distribución: Egipto.
  - *Schelorbitates barbatulus* Mihelčič, 1956  
(=*Schelorbitates penicillatus* Mihelčič, 1957)  
(=*Schelorbitates subsimilis* Mihelčič, 1956)  
Distribución: Paleártica meridional y Méjico.
  - *Schelorbitates bicornis* Mahunka, 1991  
Distribución: Macaronésica (Cabo Verde).
  - *Schelorbitates caprai* Bernini, 1973  
(=*Schelorbitates baloghi* Pérez-Iñigo, 1982, “*nom. praeoc.*” por Kardar, 1976)  
(=*Schelorbitates subsimilis* Balogh, 1962, “*nom. praeoc.*” por Mihelčič, 1956)  
Distribución: Mediterránea occidental, Etiópica (Tanzania) y Oriental (India: Tripura).
  - *Schelorbitates crimicus* Subbotina, 1989  
Distribución: Ucrania (Crimea).
  - *Schelorbitates dimentmani* (Vasiliu e Ivan, 1995) (*Hemileius*)  
Distribución: Israel.
  - *Schelorbitates distinctus* Mihelčič, 1964  
Distribución: Paleártica meridional (Europa meridional y Asia centrooccidental).
- Schelorbitates fimbriatus* Thor, 1930
- *Schelorbitates fimbriatus fimbriatus* Thor, 1930  
(?=*Protoribates* (*Schelorbitates*) *artifex* Berlese, 1916 “*sp. inq.*”)  
(?=*Oribata helvina* Ewing, 1909 “*sp. inq.*”)  
(?=*Protoribates* (*Schelorbitates*) *lanceoliger* Berlese, 1908 “*sp. inq.*”)  
(?=*Galumna sylvicola* Banks, 1909 “*sp. inq.*”)  
Distribución: Cosmopolita (Paleártica meridional: frecuente, Neártica y Pantropical).
- *Schelorbitates fimbriatus africanus* Wallwork, 1964  
Distribución: Tchad y Arabia Saudita.
  - *Schelorbitates ibericus* Weigmann, 2010  
Distribución: Portugal.
  - *Schelorbitates kargilensis* Kardar y Mattu, 1999  
Distribución: Arabia Saudita.
- Schelorbitates labyrinthicus* Jeleva, 1962
- *Schelorbitates labyrinthicus labyrinthicus* Jeleva, 1962  
Distribución: Mediterránea.
  - *Schelorbitates labyrinthicus oscensis* Pérez-Iñigo jr., Herrero y Pérez-Iñigo, 1987  
Distribución: España.
- Schelorbitates laevigatus* (Koch, 1835) (*Zetes*)
- *Schelorbitates laevigatus laevigatus* (Koch, 1835)  
(=*Oribata lucasi* Nicolet, 1855)  
(=*Oribata michaeli* Hull, 1914)  
(=*Schelorbitates robustus* Mihelčič, 1969, “*nom. praeoc.*” por Pletzen, 1963)  
Distribución: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, y Paleotropical).
  - *Schelorbitates laevigatus angustirostris* Mihelčič, 1957 (*S. a.*)  
(=*Schelorbitates quintus* Wunderle, Beck y Woas, 1990)  
(=*Schelorbitates sine* Kulijev, 1979)  
Distribución: Europa centromeridional.
  - *Schelorbitates longus* Kulijev, 1968  
(=*Schelorbitates lencoranicus* Subbotina, 1981)  
Distribución: Paleártica: Mediterránea oriental y Paleártica oriental (excepto Oeste).
  - *Schelorbitates litoralis* Weigmann, 2010  
Distribución: Portugal.
  - *Schelorbitates magnus* Abdel-Hamid, Al-Assiuty y Trrad, 1983  
Distribución: Egipto.
  - *Schelorbitates minifimbriatus* Mínguez, Subías y Ruiz, 1986  
(?=*Protoribates* (*Schelorbitates*) *exilior* Berlese, 1916 “*sp. inq.*”)  
Distribución: Holártica meridional (Mediterránea y U.S.A.: Carolina del Norte), Guinea Ecuatorial y Panamá.
- Schelorbitates pallidulus* (Koch, 1841) (*Zetes*)
- *Schelorbitates pallidulus pallidulus* (Koch, 1841)  
(=*Protoribates* (*Schelorbitates*) *frigidus* Berlese, 1908)  
(=*Zetes fuscomaculatus* Koch, 1841)  
(=*Schelorbitates ponticus* Subbotina, 1989)  
Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica; frecuente en Holártica).
  - *Schelorbitates pallidulus latipes* (Koch, 1844) (*Zetes l.*)  
(=*Schelorbitates campestris* Mihelčič, 1966)  
(=*Schelorbitates grandis* Subbotina, 1979)  
Distribución: Holártica (frecuente en Paleártica) y Oriental.
  - *Schelorbitates pilosus* Sellnick, 1943 “*sp. inq.*”  
Distribución: Italia.
  - *Schelorbitates praeincisus* (Berlese, 1910)



*(Protoribates (S.))*

(=*Murcia insularis* Oudemans, 1915)

(=*Scheloribates zaherii* Abdel-Hamid, Al-Assiuty y Trrad, 1983)

Distribución: Tropical (Oriental: frecuente, Islas del Pacífico: frecuente, y Neotropical: Panamá e I. Galápagos) y Holártica meridional (Egipto, Irán y U.S.A.: Tejas).

• *Scheloribates repetitus* Subías, 2004  
(=*Scheloribates crassus* Kulijev, 1979, “*nom. praeoc.*” por Hammer, 1967)

Distribución: Cáucaso.

• *Scheloribates riyadhiensis* Kardar, 1988

Distribución: Arabia Saudita.

• *Scheloribates salebrosus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2008

Distribución: Albania.

• *Scheloribates saudicus* Bayoumi y Al-Khalifa, 1985

Distribución: Arabia Saudita.

• *Scheloribates saudiensis* Kardar, 1988

Distribución: Arabia Saudita.

• *Scheloribates semidesertus* Bulanova-Zachvatkina y Mahmudova, 1991

Distribución: Sureste de Europa.

• *Scheloribates sergienkoi* Subbotina, 1987

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Scheloribates teldanicus* Vasiliu e Ivan, 1995

Distribución: Israel.

• *Scheloribates transplicatus* Abdel-Hamid, Al-Assiuty y Trrad, 1983

Distribución: Egipto.

• *Scheloribates tuberculatus* Pérez-Íñigo jr., Herrero y Pérez-Íñigo, 1987

Distribución: España.

• *Scheloribates tubuaiensis* Sellnick, 1959

Distribución: Polinesia y Paleártica occidental (Cáucaso).

• *Scheloribates xylobatoides* Mahunka, 1977

Distribución: Sureste de Europa.

♣ *Topobates* Grandjean, 1958

(=*Berndia* Mahunka, 1988)

(=*Flagellobates* Mahunka, 1978)

(=*Setobates* Balogh, 1961)

Especie tipo: *Topobates granifer* Grandjean, 1958

Distribución: Cosmopolita (excepto Neotropical y Antártica).

• *Topobates alvaradoi* (Pérez-Íñigo, 1969)

(*Scheloribates*)

Distribución: Mediterránea occidental.

• *Topobates circumcarinatus* (Weigmann y Miko, 1998) (*Scheloribates (T.)*)

Distribución: Europa centromeridional.

• *Topobates comatus* (Pérez-Íñigo jr., Herrero y Pérez-Íñigo, 1987) (*Setobates*)

Distribución: Suroeste de Europa.

• *Topobates granifer* Grandjean, 1958

Distribución: Francia e “India”.

• *Topobates holsaticus* Weigmann, 1969

Distribución: Europa centromeridional.

• *Topobates magnus* (Balogh, 1962) (*Setobates*)

Distribución: Tanzania y Egipto.

♦ **Oripodidae** Jacot, 1925

Distribución: Cosmopolita.

♣ **Truncopes** Grandjean, 1956

(=*Huarpescopes* Fernández, Monetti y Martínez, 1995)

Especie tipo: *Truncopes optatus* Grandjean, 1956

Distribución: Paleártica meridional, Oriental y Neotropical.

• *Truncopes optatus* Grandjean, 1956

Distribución: Mediterránea occidental e I. Kuriles.

♦ **Pirnodidae** Grandjean, 1956

Distribución: Tropical (Australiana y Neotropical) y subtropical.

♣ **Pirnodus** Grandjean, 1956

Especie tipo: *Pirnodus detectidens* Grandjean, 1956

Distribución: Paleártica meridional y Neotropical.

• *Pirnodus detectidens* Grandjean, 1956

Distribución: Suroeste de Europa.

• *Pirnodus soyeri* Travé, 1969

Distribución: Macaronésica (I. Salvajes).

♦ **Protoribatidae** J. y P. Balogh, 1984

Distribución: Cosmopolita.

♣ **Perxylobates** Hammer, 1972

(=*Octodurozetes* Mahunka, 1993)

Especie tipo: *Xylobates vermiseta* Balogh y Mahunka, 1968

Distribución: Pantropical y subtropical.

• *Perxylobates mahunkai* Bayoumi, 1980

Distribución: Egipto.

• *Perxylobates obesus* Bayoumi, 1977

Distribución: Egipto.

♣ **Protoribates** Berlese, 1908

Especie tipo: *Oribata dentata* Berlese, 1883

**Protoribates (Protoribates)** Berlese, 1908

(=*Alloribates* Banks, 1947)

(=*Propeschelobates* Jacot, 1936)

(=*Styloribates* Jacot, 1934)

(=*Xylobates* Jacot, 1929)

Distribución: Cosmopolita.

• *Protoribates (P.) capucinus* Berlese, 1908

(=*Xylobates capucinus angustior* Jacot, 1937)

(?=*Oribata monodactyla* Haller, 1884 “*sp. inq.*”)

(=*Alloribates singularis* Banks, 1947)

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica): frecuente en tropical (excepto Etiópica) y subtropical.

• *Protoribates (P.) dentatus* (Berlese, 1883)

(*Oribata*)

(=*Peloribates vastus* Mihelčič, 1956)

Distribución: Holártica, Oriental (Filipinas y Vietnam) y Melanesia (I. Fiji).

- *Protoribates (P.) lophothrichus* (Berlese, 1904) (*Oribata*) (= *Styloribates pectinatus* Jacot, 1934) (= *Xylobates prionotus* Woolley, 1968)

Distribución: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Etiópica: Senegal e I. Santa Helena, Oriental: Vietnam y China suroriental, y Hawai).

- *Protoribates (P.) souchnaiensis* Abdel-Hamid, 1964

Distribución: Egipto.

- *Protoribates (Triaungius)* Kulijev, 1978 (= *Brasilobates* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980) (= *Glaberoribates* Tseng, 1984)

Especie tipo: *Scheloribates fallax* Kulijev, 1968

Distribución: Pantropical y subtropical.

- *Protoribates (Triaungius) obtusus* (Mihelčič, 1956) (*Peloribates*) (= *Scheloribates fallax* Kulijev, 1968)

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).

- ♣ *Transoribates* Pérez-Íñigo, 1992 (= *Edaphoribates* Nakamura y Nakai, 2009)
- Especie tipo: *Protoribates latus* Mihelčič, 1965

Distribución: Paleártica meridional.

- *Transoribates latus* (Mihelčič, 1965) (*Protoribates*)

Distribución: Mediterránea occidental.

- ♦ **Haplozetidae** Grandjean, 1936
- Distribución: Cosmopolita.

- ♣ *Indoribates* Jacot, 1929
- *Indoribates (Haplozetes)* Willmann, 1935 (= *Mixobates* Subías y Gil-Martín, 1993) (= *Triungulozetes* Subías, 2001)

Especie tipo: *Peloribates vindobonensis* Willmann, 1935

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Indoribates (Haplozetes) differens* (Weigmann, 2010) (*H.*)

Distribución: Portugal.

- *Indoribates (Haplozetes) fusifer* (Berlese, 1908) (*Protoribates (Scheloribates)*) (= *Haplozetes (Mixobates) insularis* Pérez-Íñigo y Peña, 1996)

Distribución: Mediterránea e India (Tripura).

- *Indoribates (Haplozetes) vindobonensis* (Willmann, 1935) (*Peloribates*)

Distribución: Paleártica (frecuente), Península Arábiga y Méjico.

- ♣ *Lauritzenia* Hammer, 1958
  - *Lauritzenia (Incabates)* Hammer, 1961 (= *Canaribates* Pérez-Íñigo y Peña, 1994)
- Especie tipo: *Incabates nudus* Hammer, 1961
- Distribución: Pantropical (excepto Etiópica)

y subtropical.

- *Lauritzenia (Incabates) atlantica* Pérez-Íñigo y Peña, 1996

Distribución: I. Canarias.

- *Lauritzenia (Incabates) canariensis* Pérez-Íñigo y Peña, 1997

Distribución: I. Canarias.

- *Lauritzenia (Incabates) depilis* Pérez-Íñigo y Peña, 1996

Distribución: I. Canarias.

- *Lauritzenia (Incabates) elegans* (Kunst, 1977) (*Haplozetes*) (?= *Scheloribates longiporosus* Kulijev, 1968 “*sp. inq.*”)

Distribución: Holártica meridional (Europa centromeridional y U.S.A. suroriental).

- *Lauritzenia (Incabates) hispanica* Morell, 1991 (*L.*)

Distribución: Ibérica.

- *Lauritzenia (Incabates) pallida* (Mihelčič, 1956) (*Peloribates*)

(= *Protoribates meridionalis* Mihelčič, 1965)

Distribución: Mediterránea.

- *Lauritzenia (Incabates) similis* Subías y Gil-Martín, 1995

Distribución: Portugal.

- *Lauritzenia (Incabates) sinuata* (Pérez-Íñigo jr., 1990) (*Haplozetes*)

Distribución: España.

- *Lauritzenia (Incabates) tenuifusus* (Berlese, 1916) (*Protoribates (Scheloribates)*) (= *Canaribates chamobatooides* Pérez-Íñigo y Peña, 1994)

Distribución: Mediterránea.

- ♣ *Peloribates* Berlese, 1908 (= *Capillozetes* Balogh, 1943) (= *Euryparazetes* Radford, 1950) (= *Indobates* Pandit y Bhattacharya, 1999) (= *Parazetes* Willmann, 1930, “*nom. praeoc.*” por Sclater, 1879)

Especie tipo: *Oribata peloptoides* Berlese, 1888

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Peloribates europaeus* Willmann, 1935

Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Nuevo Méjico) y Méjico.

- *Peloribates glaber* Mihelčič, 1956 (= *Peloribates alatus* Mihelčič, 1957)

Distribución: Mediterránea.

- *Peloribates longipilosus* Csiszár, 1962

Distribución: Paleártica meridional.

- *Peloribates perezinigo* Shtanchaeva, Grikurova y Subías, 2011

Distribución: Mediterránea.

- *Peloribates pilosus* Hammer, 1952

Distribución: Holártica (menos frecuente en el Sur).

- *Peloribates tunisiensis* Mahunka, 1980

Distribución: Mediterránea occidental.

- ♣ *Pilobates* Balogh, 1960

Especie tipo: *Protoribates pilosellus* Balogh, 1958

Distribución: Etiópica y Paleártica meridional.

• *Pilobates carpetanus* Pérez-Íñigo, 1969 (?=*Protoribates elongatus* Mihelčič, 1956 “*sp. inq.*”)

(?=*Protoribates longior* Mihelčič, 1957 “*sp. inq.*”)

Distribución: Mediterránea.

• *Pilobates pilosellus* (Balogh, 1958) (*Protoribates*)

Distribución: Angola y Cáucaso.

♣ *Trachyoribates* Berlese, 1908

*Trachyoribates (Rostrozetes)* Sellnick, 1925

(=*Carabozetes* Mihelčič, 1957)

(=*Zaherizetes* Yousef y Nasr, 1976)

Especie tipo: (*Rostrozetes foveolatus* Sellnick, 1925) =*Trachyoribates ovulum* Berlese, 1908

Distribución: Pantropical y subtropical.

• *Trachyoribates (Rostrozetes) aegypticus* (Yousef y Nasr, 1976) (*Zaherizetes*)

Distribución: Egipto.

• *Trachyoribates (Rostrozetes) africanus* (Yousef y Nasr, 1976) (*Zaherizetes*)

Distribución: Egipto.

• *Trachyoribates (Rostrozetes) ovulum* Berlese, 1908 (*T.*)

(=*Peloribates areolatus* Balogh, 1958)

(=*Trachyoribates dorsalis* Balogh, 1958)

(=*Rostrozetes flavus* Woodring, 1965)

(=*Rostrozetes foveolatus* Sellnick, 1925)

(=*Rostrozetes geneuxi* Mahunka, 1985)

(=*Trachyoribates nodosus* Hammer, 1958)

(=*Rostrozetes pulcherrimus* Balogh, 1961)

(=*Peloribates punctulatus* Balogh, 1958)

(=*Rostrozetes punctulifer* Balogh y Mahunka, 1979)

(=*Rostrozetes trimorphus* Balogh y Mahunka, 1979)

Distribución: Pantropical (frecuente) y subtropical.

▲ *Galumnoidea* Jacot, 1925

◆ *Parakalummidae* Grandjean, 1936

Distribución: Cosmopolita.

♣ *Neoribates* Berlese, 1914

Especie tipo: *Oribata roubali* Berlese, 1910

Distribución: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

• *Neoribates aurantiacus* (Oudemans, 1914) (*Galumna*)

Distribución: Holártica (menos frecuente en el Sur) y Vietnam.

• *Neoribates bulanovae* Grishina y Vladimirova, 2009

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Neoribates gracilis* Travé, 1972

Distribución: Europa meridional.

• *Neoribates krivolutskyi* Grishina y Vladimirova, 2009

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Neoribates roubali* (Berlese, 1910) (*Oribata*)

Distribución: Paleártica y Noreste de Oriental.

◆ *Galumnidae* Jacot, 1925

Distribución: Cosmopolita.

♣ *Acrogalumna* Grandjean, 1956

Especie tipo: *Oribata elimata longipluma* Berlese, 1904

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

*Acrogalumna longipluma* (Berlese, 1904)

(*Oribata elimata* l.)

• *Acrogalumna longipluma longipluma* (Berlese, 1904)

(=*Galumna filata* Oudemans, 1914)

(=*Galumna latipluma* Mihelčič, 1952)

(=*Galumna longiporus* Mihelčič, 1952)

(=*Oribata setiformis* Hall, 1911)

Distribución: Semicosmopolita: Holártica (frecuente en Europa), Etiópica (Sudáfrica e I. Santa Helena), Oriental (India: Kerala y China suroriental), y Nueva Zelanda.

• *Acrogalumna longipluma adjarica* Murvanidze y Weigmann, 2003

Distribución: Cáucaso.

♣ *Aegyptogalumna* Al-Assiuty, Abdel-Hamid, Seif y El-Deeb, 1985

Especie tipo: *Aegyptogalumna*

*mastigophora* Al-Assiuty, Abdel-Hamid, Seif y El-Deeb, 1985

Distribución: Paleártica.

• *Aegyptogalumna mastigophora* Al-Assiuty, Abdel-Hamid, Seif y El-Deeb, 1985

Distribución: Egipto.

♣ *Allogalumna* Grandjean, 1936

(=*Ctenogalumna* Balogh, 1961)

Especie tipo: *Galumna alamellae* Jacot, 1935

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

• *Allogalumna exigua* Popp, 1960

Distribución: Egipto.

• *Allogalumna integer* (Berlese, 1904) (*Oribata alata* i.)

(=*Allogalumna alata transversa* Mihelčič, 1957)

(=*Galumna (Pergalumna) diversiareata* Mihelčič, 1956)

(=*Allogalumna neerlandica* Hammer, 1952)

Distribución: Europa centromeridional.

• *Allogalumna parva* (Berlese, 1916) (*Oribata*)

(=*Galumna alamellae* Jacot, 1935)

(=*Galumna alamellae italicum* Jacot, 1935)

Distribución: Mediterránea.

• *Allogalumna turkeyensis* Grobler, Bayram y Cobanoglu, 2004

Distribución: Turquía.

♣ **Centroribates** Berlese, 1914

Especie tipo: *Oribata mucronata* G. y R. Canestrini, 1882

Distribución: Paleártica.

• *Centroribates mucronatus* (G. y R. Canestrini, 1882) (*Oribata*)

Distribución: Suroeste de Europa.

♣ **Cryptogalumna** Grandjean, 1957

Especie tipo: *Cryptogalumna cryptodonta* Grandjean, 1957

Distribución: Paleártica meridional y Oriental.

• *Cryptogalumna cryptodonta* Grandjean, 1957  
Distribución: Mediterránea occidental.

♣ **Dicatozetes** Grandjean, 1956

Especie tipo: *Centroribates uropygium* Grandjean, 1928

Distribución: Paleártica meridional.

• *Dicatozetes numidicus* Bernini, 1984

Distribución: Argelia.

• *Dicatozetes uropygium* (Grandjean, 1928) (*Centroribates*)

Distribución: Mediterránea occidental.

♣ **Galumna** Heyden, 1826

Especie tipo: *Notaspis alatus* Hermann, 1804

**Galumna** (*Galumna*) Heyden, 1826

(=*Holokalumna* Jacot, 1929)

(=*Holozetes* Jacot, 1929)

(=*Kinezogalumna* Aoki y Hu, 1993)

(=*Zetes* Koch, 1836)

Distribución: Cosmopolita.

• *Galumna* (*G.*) *aegyptica* Abdel-Hamid, Al-Assiuty y Trrad, 1982

Distribución: Egipto.

*Galumna* (*G.*) *alata* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)

• *Galumna* (*G.*) *alata alata* (Hermann, 1804)

(=*Galumna coleoptratum occidentale* Jacot, 1929)

(=*Oribata octopunctata* Ewing, 1909)

(=*Zetes satellitius* Koch, 1841)

Distribución: Semicosmopolita (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte,

Mongolia, U.S.A.: frecuente, I.

Seychelles, Hawai, Argentina y Antártica:

I. Georgia del Sur)

• *Galumna* (*G.*) *alata multiiterata* Subías, 2004

(=*Galumna maxima* Willmann, 1939, "nom. praec." por Berlese, 1916)

Distribución: Macaronésica (Madeira).

• *Galumna* (*G.*) *arabica* Bayoumi y Al-Khalifa, 1984

Distribución: Arabia Saudita.

• *Galumna* (*G.*) *azoreana* Pérez-Íñigo, 1992

Distribución: I. Azores.

• *Galumna* (*G.*) *berlesei* Oudemans, 1919

Distribución: Europa centromeridional.

• *Galumna* (*G.*) *betzaida* Mahunka, 1992

Distribución: Israel.

• *Galumna* (*G.*) *dimorpha* Krivolutskaja, 1952

Distribución: Paleártica centromeridional (excepto Este).

• *Galumna* (*G.*) *elimata* (Koch, 1841) (*Oribata*)

Distribución: Europea.

• *Galumna* (*G.*) *europaea* (Berlese, 1914)

(*Oribata emarginatus* e.)

Distribución: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Asia centrooccidental).

• *Galumna* (*G.*) *flabellifera* Hammer, 1958

(=*Pergalumna pyri* Elbadry y Nasr, 1975)

Distribución: Pantropical (frecuente) y subtropical.

• *Galumna* (*G.*) *flagellata* Willmann, 1925

Distribución: Paleártica centromeridional (excepto Este).

• *Galumna* (*G.*) *gharbiensis* Bayoumi, Al-Assiuty, Abdel-Hamid y El-Shereef, 1983

Distribución: Egipto.

• *Galumna* (*G.*) *gibbula* Grandjean, 1956 (*G. tarsipennata* g.)

Distribución: Mediterránea.

• *Galumna* (*G.*) *kazakhstani* Krivolutskaja, 1952

Distribución: Paleártica meridional

(Mediterránea oriental y Sur de Rusia asiática).

• *Galumna* (*G.*) *lanceata* (Oudemans, 1900) (*Notaspis*)

(=*Galumna maxima* Mihelčič, 1956)

Distribución: Paleártica (frecuente) y Vietnam.

• *Galumna* (*G.*) *mariae* Balogh, 1961

Distribución: Etiópica (Tanzania y Congo) y Macaronésica (Cabo Verde).

• *Galumna* (*G.*) *mollis* Kunst, 1958

Distribución: Mediterránea oriental.

• *Galumna* (*G.*) *niliaca* Al-Assiuty, Abdel-Hamid, Seif y El-Deeb, 1985

Distribución: Egipto.

• *Galumna* (*G.*) *obvia* (Berlese, 1914) (*Oribata*)

(=*Galumna longior* Willmann, 1928)

(=*Oribata obvius norvegicus* Berlese, 1914)

(=*Dimidiogalumna wallworki* J. y P. Balogh, 2002)

Distribución: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, U.S.A.: California, Sudáfrica, I. Santa Helena, Vietnam, Hawai y Neotropical).

• *Galumna* (*G.*) *paragibbula* Weigmann, 2011

Distribución: Portugal.

• *Galumna* (*G.*) *rossica* Sellnick, 1926

Distribución: Paleártica (excepto Oeste): frecuente.

• *Galumna* (*G.*) *setigera* Mihelčič, 1956

(=*Galumna* (*Pergalumna*) *crassicostata* Mihelčič, 1956)

(=*Galumna distincta* Mihelčič, 1956)

(=*Galumna* (*Pergalumna*) *fusigera* Mihelčič, 1956)

(=*Galumna sicca* Mihelčič, 1957)

Distribución: Mediterránea.

• *Galumna* (*G.*) *tarsipennata* Oudemans, 1914

(=*Galumna* (*Pergalumna*) *lata* Mihelčič, 1956)

(=*Galumna nova* Mihelčič, 1957)

(=*Galumna parvula* Mihelčič, 1956)

Distribución: Paleártica meridional (Paleártica occidental: frecuente en el Sur, y Asia centrooccidental) y Brasil.

- *Galumna (G.) zachvatkini* Grishina, 1982

Distribución: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional).

***Galumna (Indogalumna)*** Balakrishnan, 1985

Especie tipo: *Indogalumna microsulcata* Balakrishnan, 1985

Distribución: Pantropical y subtropical (Paleártica meridional).

- *Galumna (Indogalumna) rasilis* Pérez-Íñigo, 1987 (G.)

(=*Galumna rugosa* Wallwork, 1977, “*nom. praeoc.*” por Hammer, 1968)

(=*Galumna sanctaehelena* J. y P. Balogh, 2002)

Distribución: I. Azores e I. Santa Helena.

***Galumna (Kabylogalumna)*** Bernini, 1984

Especie tipo: *Kabylogalumna rhinoceros* Bernini, 1984

Distribución: Paleártica.

- *Galumna (Kabylogalumna) rhinoceros* (Bernini, 1984) (K.)

Distribución: Argelia.

♠ ***Pergalumna*** Grandjean, 1936

(?= *Neorizetes* Jacot, 1933 “*gen. inq.*”)

Especie tipo: *Oribata nervosa* Berlese, 1914

Distribución: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Pergalumna altera* (Oudemans, 1915) (*Galumna*)

(=*Galumna (Pergalumna) diversa* Mihelčič, 1956)

(=*Pergalumna harunaensis* Aoki, 1961)

Distribución: Semicosmopolita (Holártica: frecuente en Europa, Sudáfrica, Oriental: Vietnam y China suroriental, y Micronesia: I. Marianas).

- *Pergalumna curva* (Ewing, 1907) (*Oribata*) (= *Oribata tantillus* Berlese, 1908)

Distribución: Holártica (U.S.A. centrooriental: frecuente, y Paleártica: Mediterránea oriental y Este de Paleártica oriental) y Oriental (Java y China suroriental).

- *Pergalumna formicaria* (Berlese, 1914) (*Oribata*)

Distribución: Holártica (Paleártica occidental y Neártica septentrional).

- *Pergalumna intermedia* Aoki, 1963

Distribución: Paleártica meridional (Grecia y Paleártica oriental meridional) y Noreste de Oriental.

- *Pergalumna minor* (Willmann, 1928) (*Galumna*)

Distribución: Holártica (Europa centromeridional y U.S.A.: Nueva York).

- *Pergalumna minoricana* Pérez-Íñigo jr., 1991

Distribución: España (I. Baleares).

- *Pergalumna myrmophila* (Berlese, 1914) (*Oribata longiplumus m.*)

(=*Galumna linata* Oudemans, 1914)

(=*Galumna sexareata* Mihelčič, 1956)

(=*Allogalumna subaequalis* Mihelčič, 1956)

(=*Allogalumna subaequalis fusca* Mihelčič, 1956)

Distribución: Paleártica meridional (Paleártica occidental: frecuente en Mediterránea, y Paquistán) y Etiópica: Guinea Ecuatorial: Bioco [Fernando Poo] y Tanzania (Zanzíbar).

*Pergalumna nervosa* (Berlese, 1914) (*Oribata*)

- *Pergalumna nervosa nervosa* (Berlese, 1914)

Distribución: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.) y Sudáfrica.

- *Pergalumna nervosa retalata* (Oudemans, 1915) (*Galumna r.*)

(=*Galumna (Pergalumna) nervosa punctata* Mihelčič, 1957)

Distribución: Oeste de Europa.

*Pergalumna semistriata* Pérez-Íñigo jr., 1990

- *Pergalumna semistriata semistriata* Pérez-Íñigo jr., 1990

Distribución: España.

- *Pergalumna semistriata matritensis* Arillo y Subías, 1993

Distribución: España.

- *Pergalumna willmanni* (Zachvatkin, 1953) (*Galumna*)

Distribución: Paleártica (Europa centromeridional y Suroeste de Siberia).

♠ ***Pilogalumna*** Grandjean, 1956

Especie tipo: *Pilogalumna ornatula* Grandjean, 1956

Distribución: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).

- *Pilogalumna arabica* Bayoumi y Al-Khalifa, 1986

Distribución: Península Arábiga.

*Pilogalumna crassiclava* (Berlese, 1914) (*Allogalumna*)

- *Pilogalumna crassiclava crassiclava* (Berlese, 1914)

(=*Galumna allifera* Oudemans, 1915)

Distribución: Paleártica centromeridional (frecuente).

- *Pilogalumna crassiclava longiareata* Pérez-Íñigo, 1976 (*P. allifera l.*)

Distribución: Mediterránea occidental.

*Pilogalumna ornatula* Grandjean, 1956

- *Pilogalumna ornatula ornatula* Grandjean, 1956

(=*Galumna adareata* Mihelčič, 1957)

(=*Galumna decipiens* Mihelčič, 1956)

(=*Allogalumna molensis* Mihelčič, 1957)

(=*Allogalumna pterata* Mihelčič, 1957)

Distribución: Mediterránea y Méjico.

- *Pilogalumna ornatula fayoumensis* Abdel-Hamid, 1964

Distribución: Egipto.

- *Pilogalumna recta* (Mihelčič, 1957) (*Allogalumna*)

Distribución: España.

- *Pilogalumna tenuiclava* (Berlese, 1908) (*Oribata*)

(?= *Acarus alatus* Schrank, 1803 “*sp. inq.*”)  
 (?= *Acarus aquaticus marginatus* De Geer, 1778  
 “*sp. inq.*”)

(= *Galumna areolata* Willmann, 1923)  
 (= *Allogalumna atra* Mihelčič, 1957)  
 (= *Allogalumna boevi* Krivolutskaja, 1952)  
 (= *Galumna radiata* Sellnick, 1928)

Distribución: Holártica (frecuente en Europa).

♣ ***Psammogalumna*** Balogh, 1943

Especie tipo: *Stictozetes hungaricus* Sellnick, 1925

Distribución: Paleártica.

• *Psammogalumna hungarica* (Sellnick, 1925) (*Stictozetes*)

Distribución: Paleártica meridional (excepto extremos Este y Oeste).

♣ ***Setogalumna*** P. Balogh, 1985

Especie tipo: *Setogalumna excellens* P. Balogh, 1985

Distribución: Australiana y Paleártica meridional.

• *Setogalumna diminuta* Arillo y Subías, 1993  
 Distribución: España.

♣ ***Trichogalumna*** Balogh, 1960

Especie tipo: *Pilogalumna lunai* Balogh, 1958

Distribución: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical.

• *Trichogalumna nipponica* (Aoki, 1966) (*Pergalumna duplicata* n.)

Distribución: Paleártica meridional: Cáucaso y Sureste de Paleártica oriental (frecuente), y Noreste de Oriental.

♣ ***Vaghia*** Oudemans, 1919

Especie tipo: *Oribata (Stictozetes) stupendus* Berlese, 1916

Distribución: Paleártica, Oriental y Neotropical.

• *Vaghia carinata* (Travé, 1956) (*Galumna*)  
 Distribución: Suroeste de Europa y Méjico.

• *Vaghia simplex* Travé, 1957

Distribución: Mediterránea occidental.

• *Vaghia stupenda* (Berlese, 1916) (*Oribata (Stictozetes)*)

Distribución: Suroeste de Europa.

• *Vaghia uniporosa* Arillo y Subías, 1993  
 Distribución: España.

♦ ***Galumnellidae*** Piff, 1970

Distribución: Pantropical y subtropical.

♣ ***Iberogalumnella*** Arillo y Subías, 1993

Especie tipo: *Iberogalumnella alandalusica* Arillo y Subías, 1993

Distribución: Paleártica meridional.

• *Iberogalumnella alandalusica* Arillo y Subías, 1993

Distribución: Mediterránea occidental.

## 4. CONCLUSIONES

La Región Mediterránea es de gran riqueza oribatológica puesto que las 1937 especies y subespecies recopiladas suponen más de las mitad de todas las especies Paleárticas conocidas, 3.641, y un número muy similar al de todas las Neotropicales y Orientales conocidas (2023 y 1990 respectivamente), siendo superior al de las Etiópica y Australianas (1628 y 1325 respectivamente) y prácticamente el doble que el de las Neárticas (1058) (Subías, 2011), y aunque todavía queda mucho por hacer para conocer en su totalidad dicha fauna, estos resultados ponen de manifiesto que se trata de una Región relativamente bien conocida, sobre todo si se compara con las regiones extrapaleárticas, y la necesidad de continuar sus estudios para conocer cada vez mejor la biodiversidad de oribátidos existente.

## AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado gracias al Program of Basic Research of the Presidius RAS “Biodiversity and Dynamics of Genetic Funds” y a la Universidad Complutense de Madrid (SAB, 2005-0021 UCM).

## BIBLIOGRAFÍA

- ABD-EL-HAMID M.E., AL-ASSIUTY A.I.M. & TRRAD A.M., 1983. Ecology and taxonomy of genus *Schelolibates* Berlese (1908) in Egypt (Acari: Oribatei) with description of two new species. *Delta Journal Science*, **7**(1): 228-247.
- ABD-EL-HAMID M.E., BAYOUMI B.M. & MOHAMAD A.I., 1980. Check-list of the oribatid mites (Acari: Oribatei) of Egypt. *Bulletin Faculty Science, Assiut University*, **9**(1): 139-157.
- AL-ASSIUTY A.I.M. & EL-DEEB S.I.K., 1983. *Amerioppia hamidi* and *Multioppia bayoumii* two new oribatid mite species (Acari: Cryptostigmata) from egyptian soil samples. *Delta Journal Science*, **7**(1): 277-291.
- AVANZATI A.M., SALOMONE N., BARATTI M. & BERNINI F., 2003. Taxonomic revision of *Amerus troisi* (Berlese, 1883) (Acari, Oribatida, Ameridae) using morphological and biochemical characters. *Journal of Natural History*, **37**: 797-819.
- AYYILDIZ N., 1988a. Systematic investigations on the oribatid mites (Acari: Oribatida) of the Erzurum Plain. IIa. Higher Oribatids. (En turco). *Doğa TU Zoologi D.*, **12**(2): 131-144.
- 1988b. Systematic investigations on the oribatid mites (Acari: Oribatida) of the Erzurum Plain. III. Higher Oribatids. (En turco). *Doğa TU Zoologi D.*, **12**(2): 145-155.
- AYYILDIZ N. & LUXTON M., 1989. Epimerellidae (Acari, Oribatida), a new mite family. *Journal of Natural History*, **23**: 1381-1386.

- AYYILDIZ N. & ÖZKAN M., 1988. Systematic investigations on the oribatid mites (Acari: Oribatida) of the Erzurum Plain. I. Primitivi Oribatids. (En turco). *Doğa TU Zoologi D.*, **12**(2): 115-130.
- AYYILDIZ N., TOLUK A. & TASKIRAN M., 2010. Two new species of oppiid mites (Acari: Oribatida) from Turkey. *Acarologia*, **50**(1): 13-20.
- BÁEZ M., MARTÍN E. & ZURITA N., 2004. Acari. En I. Izquierdo *et al.*: *Lista de especies silvestres de Canarias. Hongos, Plantas y Animales Terrestres 2004*: 155-163.
- BARAN Ş., 2010. Two new species of *Ramusella* (Acari, Oribatida) from Turkey. *Entomological News*, **120**(5): 488-495.
- BARAN Ş. & AYYILDIZ N., 2007. Two new species of soil mites (Acari, Oribatida, Oppiidae and Machuelliidae) from Turkey. *Zootaxa*, **1445**: 57-64.
- BARAN Ş., TOLUK A. & AYYILDIZ N., 2009. Mites of the genus *Quadroppia* Jacot, 1939 (Acari: Oribatida: Quadropiidae) from Turkey, with zoogeographical remarks. *Entomological Review*, **120**(3): 240-252.
- BAYARTOGTOKH B., 1998. A new species of oribatid mite (Acari: Banksinomidae) from Mongolia. *International Journal Acarology*, **24**(2): 125-129.
- BAYARTOGTOKH B. & AOKI J-I., 1997. New species of oribatid mites (Acari: Oribatei) from Mongolia. I. *Journal. Acarology Societe Japon*, **6**(2): 123-132.
- BAYOUMI B.M., 1979. Some new oribatid mites from Hungary (Acari: Oribatida). *Folia Entomologica Hungarica*, **32**: 11-14.
- BAYOUMI B.M. & AL-KHALIFA M.S., 1985. Oribatid mites (Acari) of Saudi Arabia. *Fauna of Saudi Arabia*, **7**: 66-92.
- BERNINI F., CASTAGNOLI M. & NANNELLI R., 1995. 24. Arachnida Acari. In A. Minelli *et al.*: *Checklist delle specie della Fauna Italiana*: 131 págs.
- BORGES P.A.V., CARDOSO P. & DINIS F., 2005. Acari (Astigmata; Oribatida; Prostigmata; Ixodida; Mesostigmata). In P.A.V. Borges *et al.*: *Listagem da Fauna e Flora Terrestres dos Açores*: 173-178.
- CSISZÁR J. & JELEVA M., 1962. Oribatid mites (Acari) from bulgarian soils. *Acta Zoologica*, **8**(3-4): 273-301.
- DJAPARIDZE N.I., 1985. Neue Hornmilbenfunde (Acariformes, Oribatei) aus Grusii. (En ruso). *Fauna und Ökologie einiger Insekten- und Milbengruppen von Gruzii (Tbilisi)*: 57-81.
- 1986. Die Hornmilben der Gattung *Amazoppia* Balogh et Mahunka, 1969 in Gruzien. (En ruso). *Soobsc. AN GSSR*, **121**(3): 629-632.
- FISHER B.M., PFALLER K. & SCHATZ H., 2009. Die Hornmilbenfamilie Quadropiidae Balogh, 1983 (Acari: Oribatida) im Schlerengebiet (Südtirol, Italien). *Gredleriana*, **9**: 171-186.
- FISHER B.M. & SCHATZ H., 2010. Hornmilbenarten (Acari: Oribatida) in Feuchtgebieten Südtirols (Italien). *Gredleriana*, **10**: 209-226.
- FLOGAITIS E., 1992. Catalogue of oribatid mites of Greece (Acari: Oribatida). *Biologia Gallo-Hellenica*, **19**(1): 29-54.
- GORDEEVA E., 2004. *Suctobelbilla popovi*, a new species of the family Suctobelbidae (Oribatei, Acariiformes) from Karadag Reserve (Crimea, Ukraine). *Vestnik zoologii*, **38**(6): 65-68.
- GORDEEVA E., PENTTINEN R., SUBIAS, L.S. & PETROVA A., 2007. A new species, *Krivolutskiella pennata* sp. n., from the Eastern Mediterranean and new data for *Krivolutskiella pubescens* Gordeeva, 1080 (Cosmochthoniidae, Acarina, Oribatida). *Acarologia*, **47**(3-4): 165-171.
- GROBLER L., BAYRAM S. & COBANOGU S., 2004. Two new species and new records of oribatid mites from Turkey. *Internationa Journal Acarology*, **30**(4): 351-358.
- GROBLER L., OZMAN S.K. & COBANOGU S., 2003. The genera *Liacarus*, *Stenoxenillus* and *Xenillus* (Oribatida: Gustavoioidea) from Turkey. *Acarologia*, **43**(1): 133-149.
- GRISHINA L.G. & VLADIMIROVA N.V., 2009. New species of the genus *Neoribates* (Berlese, 1914) (Acariformes: Oribatida) from Russia and adjacent Countries. *Acarina*, **17**(2): 211-222.
- JELEVA M., 1966. Oribatid mites (Acarina, Oribatida) from Thrace. (En búlgaro). *Fauna na Trakiya*, **3**: 77-136.
- KARPPINEN E., KRIVOLUTSKY D.A., TARBA Z.M., SHTANCHAEVA U.YA. & GORDEEVA E.W., 1987. List of oribatid mites (Acarina, Oribatei) of northern palaeartic region IV. Caucasus and Crimea. *Annales Entomologica Fennici*, **53**: 119-137.
- KRIVOLUTSKY D.A., 1995. (Ed.). *Oribatid mites. Morphology, development, phylogeny, ecology, methods of study, model species* *Nothrus palustris* C.L. Koch, 1839. (En ruso). Moscow. Nauka Publishers: 224 págs.
- KUNST M., 1958a. Bulgarische Oribatiden (Acarina) I. *Universitas Carolina, Biologica*, (1957) **3**(2): 133-165.
- KUNST M., 1958b. Bulgarische Oribatiden (Acarina) II. *Acta Universitatis Carolinae*, **5**(1): 13-31.
- 1959. Bulgarische Oribatiden (Acarina) III. *Acta Universitatis Carolinae*, **1**: 51-74.
- 1961. Bulgarische Oribatiden (Acarina) IV. *Acta Universitatis Carolinae*, **2**: 151-163.
- MAHUNKA S., 1998. Oribatid mites (Acari: Oribatida) from Uganda, III. Microzetid species. *Folia Entomologica Hungarica*, **59**: 257-262.
- 2001. Cave-dwelling oribatid mites from Greece (Acari: Oribatida). (Neue und interessante Milben aus dem Genfer Museum XLIX). *Revue suisse de Zoologie*, **108**(1): 165-188.
- 2008. *Dissorhina cretensis* n. sp. and some other remarkable oribatid mites (Acari: Oribatida) from Crete, Greece. *Opuscula Zoologica Budapest*, **39**: 43-51.
- 2009. Oribatid mites from the Arabian Peninsula, including further records from Socotra (Acari: Oribatida). (Acarologica Genavensia CXII). *Revue suisse de Zoologie*, **116**(2): 257-274.
- MAHUNKA S. & MAHUNKA-PAPP L., 2007. Contribution to the knowledge of the Hungarian Oribatida fauna (Acari) II. *Opuscula Zoologica Budapest*, (2005) **36**: 69-77.
- 2010. New and little known oribatid mites from the Carpathian Basin and the Balkan Peninsula (Acari: Oribatida). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **56**(3): 211-234.
- MAHUNKA S. & MIKO L., 1989. Soma *Steganacarus* Ewing, 1917 species (Acari: Oribatida) from Turkey. *Acta Zoologica Hungarica*, **35**(3-4): 221-234.
- MURVANIDZE M. & BEHAN-PELLETIER V.M., 2011. A new species of *Striatoppia* (Acari: Oribatida) from the Caucasus region, with remarks on the familial

- placement of the genus. *International Journal of Acarology*, **37**(1): 53-59.
- NIEDBALA W., 2006a. New species of palaeartic Euphthiracaridae (Acari, Oribatida). *Zootaxa*, **1175**: 43-54.
- 2006b. New species of palaeartic Oribotritiidae (Acari, Oribatida). *Zootaxa*, **1175**: 55-68.
- NIEDBALA W. & STARY J., 2011. Three new species of ptyctimous mites (Acari: Oribatida: Phthiracaroida) from Spain. *Zootaxa*, **2966**: 58-64.
- NIEMI R. GORDEEVA E. & AYYILDIZ N., 2002. *Cosmochthonius taurus* n. sp. (Acari: Oribatida: Cosmochthoniidae) from Turkey. *Acarologia*, **42**(3): 283-285.
- PAULITSHENKO P.G., 1994. *A Guide to the Ceratozetoid Mites (Oribatei, Ceratozetoidea) of Ukraine*. (En ucraniano). Academia Nacional de Ciencias de Ucrania: 144 págs.
- SERGIENKO G.D., 1994. Oribátidos Primitivos. *Fauna de Ucrania*. 25 (21). (En ucraniano). Memorias Científicas de Kiev: 204 págs.
- SHTANCHAEVA U.YA., GRIKUROVA A.A. & SUBÍAS, L.S., 2011. Oribatid mites (Acariformes) of the Caspian Sea Coast and Islands. (En ruso). *Zoologicheskii Zhurnal*, **90**(10): 1-5.
- SHTANCHAEVA U.YA. & SUBÍAS L.S., 2010a. *Catalogue of oribatid mites of the Caucasus*. (En ruso). Instituto de Recursos Biológicos del Cáucaso. Centro Científico de Daguestán. Academia de Ciencias de Rusia: 276 págs.
- 2010b. A new genus and species of oribatid mites *Scarabacarus longisensillus* gen. et sp. n. (Acariformes, Liacaridae) from the Caucasus. *Entomological Review*, **90**(8): 1111-1114.
- SUBÍAS L.S., 2004. Listado sistemático, sinonímico y biogeográfico de los ácaros oribátidos (Acariformes, Oribatida) del mundo (1758-2002). *Graellsia*, **60**. Número extraordinario: 3-305.
- 2011. Listado sistemático, sinonímico y biogeográfico de los ácaros oribátidos (Acariformes, Oribatida) del mundo. (Excepto fósiles). <http://www.ucm.es/info/zoo/Artropodos/Catalogo.pdf>
- SUBÍAS L.S. & GIL-MARTÍN J., 1997. Systematic and biogeographic checklist of oribatids from Western Mediterranean (Acari, Oribatida). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo. Doria"*, **91**: 459-538.
- SUBÍAS L.S. & SHTANCHAEVA U., 2011a. Listado sistemático de los ácaros oribátidos (Acari: Oribatida) iberocaucásicos. *Revista Ibérica de Arachnología*, **19**: 55-132.
- 2011b. Un nuevo subgénero, seis nuevas especies y dos nuevas subespecies del género *Rhinoppia* Balogh, 1983 (Acari, Oribatida, Oppiidae, Medioppiinae) de la Península Ibérica y Marruecos. *Boletín Real Sociedad Española Historia Natural Sección Biológica*, **105**(1-4):1-10.
- 2011c. Ácaros oribátidos de medios endogeos del Este de España: un nuevo género y dos nuevas especies de Multioppiinae (Acari, Oribatida, Oppiidae) y dos primeras citas ibéricas. *Graellsia*, **67** (2): 127-134.
- 2011d. Descripción de *Hispanozetes* n. gen. y cinco nuevas especies suyas (Acari, Oribatida, Ceratozetidae). *Revista Ibérica de Arachnología*, **20** [en prensa]
- 2011e. Descripción de *Oxymystroppia phylloseta* n. gen., n. sp. de Marruecos y *Corynoppia hispanica* n. sp. del sur de España (Acari, Oribatida, Oppiidae). *Boletín de la Asociación española de Entomología*, **35** (4): 315-323.
- TARMAN K., 1983. Catalogus faunae Jugoslaviae III/4. Acarina, Oribatei. *Slovenian Akademij (Ljubljana)*: 61 págs.
- TOLUK A. & AYYILDIZ N., 2009. Two new species of the genus *Quadroppia* (Acari: Oribatida: Quadropiidae) from Turkey. *Versita, Biologia, Section Zoology*, **64**(5): 930-936.
- TOLUK A., AYYILDIZ N. & BARAN Ş., 2008. Two new species of *Epimerella* Kulijev, 1967 (Acari, Oribatida, Epimerellidae) from Turkey. *Journal of Natural History*, **42**(39-40): 2537-2546.
- TOLUK A., AYYILDIZ N. & SUBÍAS, L.S., 2007. Two new species of oppioid mites from Turkey (Acari: Oribatida). *Zootaxa*, **1551**: 61-68.
- 2009. Three new species of the family Oppiidae (Acari, Oribatida) from Turkey. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **55**(1): 11-21.
- VASILIU N. & IVAN O., 1995. Oribatid mites from Israel. *Soil Fauna of Israel*. Editura Academiei Române: 69-86.
- WEIGMANN G., 2009a. Oribatid mites (Acari: Oribatida) from the coastal region of Portugal. II. The genera *Zachvatkinibates* and *Punctoribates* (Mycobatidae). *Soil Organisms*, **81**(1): 85-105.
- 2009b. Oribatid mites (Acari: Oribatida) from the coastal region of Portugal. III. New species of Scutoverticidae and Schelorbitidae. *Soil Organisms*, **81**(1): 107-127.
- 2010. Oribatid mites (Acari: Oribatida) from the coastal region of Portugal. IV. The genera *Coronoquadroppia*, *Schelorbitates*, *Haplozetes* and *Pilobates*. *Soil Organisms*, **82**(3): 383-406.
- 2011. Oribatid mites (Acari: Oribatida) from the coastal region of Portugal. V. *Xenillus*, *Oribatella*, *Galumna*, *Eupelops* and *Lucoppia*. *Soil Organisms*, **83**(2): 287-306.